

1) Mi a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott 6 jegyű szám jegyei mind különbözőek?

$$\frac{9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{9 \cdot 10^5}$$

2) Hányféleképpen lehet 8 bástyát letenni egy sakktáblára, hogy ne üssék egymást?

$$8!$$

3) 2 számozott érmével dobunk, majd még annyi érmével, ahány fejet az első két érmével kaptunk. Mik lesznek az eseménytér elemei?

$$\Omega = \{\{I, I\}, \{F, I, I\}, \{F, I, F\}, \{I, F, I\}, \{I, F, F\}, \{F, F, I, I\}, \{F, F, I, F\}, \{F, F, F, I\}, \{F, F, F, F\}\}$$

4) Legyen A,B,C három esemény. Írjuk fel annak az eseménynek a valószínűségét, hogy közülük

a.) pontosan k

$$P(\text{pontosan } 1) = P((A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap B \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C))$$

$$P(\text{pontosan } 2) = P((A \cap B \cap \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (\bar{A} \cap B \cap C))$$

$$P(\text{pontosan } 3) = P(A \cap B \cap C)$$

altalanosan:

legyen  $A_1, \dots, A_n$  esemenyek

$$P(\text{pontosan } k) = P\left(\bigcup_{i_1, \dots, i_k} \left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right)\right) - \left(\bigcup_{l \notin \{i_1, \dots, i_k\}} A_l\right)$$

b.) legfeljebb k esemény következik be ( $k = 1, 2, 3$ ).

$$P(\text{legfeljebb } 1) = P(\text{pontosan } 0 \text{ vagy } 1) =$$

$$= P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup P((A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap B \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C))$$

⋮

5) A német labdarúgó válogatott edzésének megkezdése előtt, az edzésen résztvevő 20 mezőnyjátékost két csoportba osztják. Mi annak a valószínűsége, ha találmra történik a szétosztás a két 10-es csoportba, hogy Schweinsteiger és Özil egymás ellen játszik?

$$P = \frac{\binom{18}{9}}{\binom{20}{10}}$$

## 6) De Méré problémája, 1654.

**De Méré lovag nagy szerencsejátékos volt, az alábbi két kérdéssel fordult Pascal-hoz:**

- Ha egy kockát 4-szer feldobunk, akkor mi annak a valószínűsége, hogy legalább egy hatos dobás lesz?
- Ha két kockát 24-szer feldobunk, mi annak a valószínűsége, hogy legalább egy dupla hatos lesz?

**a.) Számítsuk ki a két valószínűség pontos értékét!**

$$P(\text{első}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 0,5177469136$$

$$P(\text{második}) = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} = 0,4914038761$$

**b.) A két valószínűség miért van közel egymáshoz?**

$$\begin{aligned} 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 &= 1 - \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{\frac{2}{3} \cdot 6} \\ 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} &= 1 - \left(1 - \frac{1}{36}\right)^{\frac{2}{1} \cdot 36} \\ \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{\frac{2}{2} \cdot n} &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{\frac{2}{2}}} \end{aligned}$$

## 7) Mintavétel: Adott N különböző termék, amik között van M selejtes. Vesszünk n elemű mintát

Mennyi a valószínűsége, hogy az n termékből pontosan k selejtest sikerült kiválasztanunk?

**a.) visszatevés nélkül;**

$$P = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

**b.) visszatevéssel.**

$$P = \frac{\binom{n}{k} M^k (N-M)^{n-k}}{N^n}$$

## 8) A $(0, 1)$ intervallumot felosztjuk két véletlenül rádobott pont segítségével 3 részre. Mennyi a valószínűsége, hogy

**a.) mindhárom szakasz hossza rövidebb  $\frac{1}{2}$ -nél;**

$$P = \frac{1}{4}$$

**b.) a 3 szakaszból háromszög alkotható;**

$$P = \frac{1}{4}$$

**c.) a legrövidebb szakasz hossza rövidebb  $\frac{1}{5}$ -nél?**

...

**9) Ha egy magyarkártya-csomagból visszatevés nélkül húzunk 3 lapot, akkor mi annak a valószínűsége, hogy**

**a.) pontosan**

$$P(\text{pontosan 1 piros}) = \frac{\binom{8}{1} \binom{24}{2}}{\binom{32}{3}}$$

**b.) legalább egy piros színű lapot húzunk? És mi a helyzet visszatevéses esetben?**

$$P(\text{legalább 1 piros}) = \sum_{i=1}^3 \frac{\binom{8}{i} \binom{24}{3-i}}{\binom{32}{3}}$$

**c.) visszatevéssel**

$$P(\text{pontosan 1 visszatevéssel}) = \frac{\binom{3}{1} 8^1 (32-8)^{3-2}}{32^3} = \frac{\binom{3}{1} 8 \cdot 24^2}{32^3}$$

$$P(\text{legalább 1 visszatevéssel}) = \sum_{i=1}^3 \frac{\binom{3}{i} 8^i 24^{3-i}}{32^3}$$