

## Definiálja a primitív függvényt!

Legyen  $I \in \mathbb{R}$  nyílt intervallum és  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  egy adott függvény.

AMH a  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  függvény  $f$  primitív függvénye, ha

$$F \in D(I) \quad \text{és} \quad F'(x) = f(x) \quad (\forall x \in I)$$

## Adjon meg olyan függvényt, amelyiknek nincs primitív függvénye!

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \leq 0 \\ 1, & \text{ha } x > 0 \end{cases}$$

## Mit jelent egy függvény határozatlan integrálja?

Az  $I$  intervallumon értelmezett  $f$  függvény primitív függvényeinek a halmazát  $f$  határozatlan integráljának nevezzük.

Jelölés:

$$\int f := \int f(x)dx := \{F : I \rightarrow \mathbb{R} \mid F \in D \text{ és } F' = f\}$$

## Mit ért a határozatlan integrál linearitásán?

Legyen  $I$  nyílt intervallum. Ha az  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  függvényeknek létezik primitív függvénye, akkor tetszőleges  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  mellett  $(\alpha f + \beta g)$ -nek is létezik primitív függvénye és

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int f(x)dx + \beta \int g(x)dx \quad (x \in I)$$

## Mit mond ki a primitív függvényekkel kapcsolatos parciális integrálás tétele?

Legyen  $I$  nyílt intervallum.

TFH  $f, g \in D(I)$  és az  $f'g$  függvénynek létezik primitív függvénye  $I$ -n.

Ekkor az  $fg'$  függvénynek is van primitív függvénye és

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx \quad (x \in I)$$

## Hogyan szól a primitív függvényekkel kapcsolatos első helyettesítési szabály?

Legyenek adottak  $I, J$  nyílt intervallumok és a  $g : I \rightarrow \mathbb{R}, f : J \rightarrow \mathbb{R}$  függvények.

TFH  $g \in D(I), \mathcal{R}_g \subset J$  és az  $f$  függvénynek van primitív függvénye.

Ekkor az  $(f \circ g) \cdot g'$  függvénynek is van primitív függvénye és

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x)dx = F(g(x)) + c \quad (x \in I)$$

ahol  $F$  az  $f$  egy primitív függvénye.

**Adja meg a következő függvények egy primitív függvényét:**

$\exp$

$$\int \exp dx = \exp + C$$

$x^a \quad (x > 0, a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$

$$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C$$

$\frac{1}{x} \quad (x > 0)$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$$

$\sin$

$$\int \sin dx = -\cos x + C$$

$\cos$

$$\int \cos dx = \sin x + C$$

$\frac{1}{1+x^2} \quad (x \in \mathbb{R})$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$