

Vektorit

Juulia Lahdenperä ja Lotta Oinonen

9. marraskuuta 2015


Sisältö

1	Vektori	1
1.1	Vektorit ja xy -koordinaatisto	1
1.2	Kahden pisteen välinen vektori	5
2	Vektoriin laskutoimituksia	7
2.1	Summa	7
2.2	Vektorin kertominen reaaliluvulla	10
2.3	Erotus	14
2.4	Vektorin pituus	15
2.5	Vektoriin välinen kulma ja pistetulo	18

1 Vektori


1.1 Vektorit ja xy -koordinaatisto

Kuvassa 1.1 on koordinaatisto, johon on piirretty x - ja y -akselit. Koordinaattiakselit jakavat tason neljään osaan. Osat nimetään yleensä järjestysnumeroilla I, II, III ja IV kuvan 1.1 mukaisesti. Koordinaattiakselien leikkauskohtaa kutsutaan **origoksi**. Origoa merkitään yleensä kirjaimella O .



Kuva 1.1: Koordinaatiston neljännekset.

Tehtävä 1.1.1. Tutki alla olevaa kuvaa 1.2.



Kuva 1.2: Pisteitä koordinaatistossa.

- Kuinka monta yhden ruudun mittaista askelta pitää siirtyä x -akselin suunnassa, jotta päästään origosta pisteeseen S ?
- Kuinka monta yhden ruudun mittaista askelta pitää siirtyä y -akselin suunnassa, jotta päästään origosta pisteeseen S ?

- (c) Kuinka monta yhden ruudun mittaista askelta pitää siirtyä x -akselin suunnassa, jotta päästään origosta pisteeseen Q ?
- (d) Kuinka monta yhden ruudun mittaista askelta pitää siirtyä y -akselin suunnassa, jotta päästään origosta pisteeseen Q ?
- (e) Miten voisit merkitä sitä, että pisteen Q tapauksessa siirrytään y -akselin suunnassa alas- eikä ylöspäin, kuten pisteen S tapauksessa?

Tason piste ilmoitetaan lukuparina (x, y) , missä ensimmäinen luku x ilmoittaa x -akselin suuntaisten ja toinen luku y ilmoittaa y -akselin suuntaisten askelten lukumäärän. Näitä lukuja kutsutaan **pisteen koordinaateiksi**. Kuvan 1.2 pisteeseen R päästään siirtymällä origosta viisi askelta x -akselin suuntaan ja kolme askelta y -akselin suuntaan. Näin ollen pistettä R merkitään $R = (5, 3)$. Pistettä P merkitään puolestaan $P = (-3, 1)$.

Tehtävä 1.1.2. Valitse jokaiselta koordinaatiston neljänneksellä jokin piste ja ilmoita sen koordinaatit. Miten eri neljännekset vaikuttavat x - ja y -koordinaattien koordinaattien etumerkkeihin?

Tehtävä 1.1.3. ...


- (a) Piirrä koordinaatisto ja merkitse siihen pisteet $(1, 2)$, $(1, -4)$ ja $(1, 3)$.
- (b) Merkitse piirtämäsi koordinaatistoon kolme uutta pistettä, jotka ovat muotoa $(1, y)$ jollakin kokonaisluvulla y .
- (c) Merkitse piirtämäsi koordinaatistoon kaikki sellaiset tason pisteet, jotka ovat muotoa $(1, y)$ jollakin kokonaisluvulla y .

Tehtävä 1.1.4. ...

- (a) Piirrä koordinaatisto ja merkitse siihen pisteet $(2, 2)$, $(3, 3)$ ja $(-2, -2)$.
- (b) Merkitse piirtämäsi koordinaatistoon kolme uutta pistettä, jotka ovat muotoa (x, x) jollakin reaaliluvulla x .
- (c) Merkitse piirtämäsi koordinaatistoon kaikki sellaiset tason pisteet, jotka ovat muotoa (x, x) jollakin reaaliluvulla x .

Tehtävä 1.1.5. Piirrä koordinaatisto ja merkitse siihen kaikki sellaiset tason pisteet, jotka ovat muotoa $(x, 2/3)$ jollakin reaaliluvulla x .

Tarkastellaan seuraavaksi kuvaa 1.3. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on näkyvissä koordinaattiakselien suuntaiset yhden yksikön mittaiset vektorit \bar{i} ja \bar{j} . Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyvät vektorit \bar{u} , \bar{v} ja \bar{w} .




Kuva 1.3: Vektorit \bar{i} ja \bar{j} , sekä muita vektoreita.

Huomataan, että vektorin \bar{u} alkupisteestä päästään sen kärkipisteeseen ottamalla kaksi x -akselin suuntaista askelta negatiiviseen suuntaan ja neljä y -akselin suuntaista askelta positiiviseen suuntaan. Tällainen vektori \bar{u} voidaan ilmoittaa nuolien \bar{i} ja \bar{j} avulla muodossa $\bar{u} = -2\bar{i} + 4\bar{j}$.

Tehtävä 1.1.6. Ilmoita kuvassa 1.3 oleva vektori \bar{v} vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla.

Koordinaatistossa olevia nuolia kutsutaan siis **vektoreiksi**. Vektorit \bar{i} ja \bar{j} ovat erityisiä, sillä ne ovat koordinaattiakselien suuntaisia ja yhden askeleen pituisia. Niiden avulla voidaan ilmaista kaikki mahdolliset xy -koordinaatiston vektorit.

Tehtävä 1.1.7. Tarkastellaan seuraavaa kuvaa 1.4. Ilmoita kaikki kuvassa olevat vektorit vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla. Mitä huomaat?




Kuva 1.4: Vektoreita.

Määritelmä 1.1.8. Kaksi vektoria ovat samat, jos ne voidaan esittää samalla tavalla vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla.

Samat vektorit

Vektorien samuus tarkoittaa siis sitä, että ne ovat saman pituisia ja osoittavat samaan suuntaan – niiden paikalla koordinaatistossa ei ole merkitystä.

Tehtävä 1.1.9. Tarkastellaan seuraavaa kuvaa 1.5. Ilmoita kaikki kuvan vektorit vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla. Vertaa tuloksia vektoreiden kärkipisteiden koordinaatteihin. Mitä huomaat?




Kuva 1.5: Origosta lähteviä vektoreita.

Paikkavektori

Määritelmä 1.1.10. Vektori, joka lähtee origosta ja jonka kärki on pisteessä P , on pisteen P paikkavektori.

Kuvassa 1.6 oleva vektori $\bar{v} = 4\bar{i} + 3\bar{j}$ on siis pisteen $(4, 3)$ paikkavektori.



Kuva 1.6: Pisteen $(4, 3)$ paikkavektori \bar{v} .

Tehtävä 1.1.11. Tarkastellaan edelleen kuvaa 1.6.

- (a) Ilmoita vektori \bar{w} vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla. Minkä pisteen paikkavektori se on?

- (b) Ilmoita vektorit \bar{i} ja \bar{j} vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla. Minkä pisteiden paikkavektoreita ne ovat?

Tarkastellaan sitten vektoria $0\bar{i} + 0\bar{j} = \bar{0}$. Tätä vektoria sanotaan nollavektoriksi.


Määritelmä 1.1.12. Vektoria $0\bar{i} + 0\bar{j} = \bar{0}$ sanotaan nollavektoriksi.

Nollavektori

Nollavektori on siis vektori, jonka alkupiste ja kärkipiste ovat samat. Nollavektori on myös origon eli pisteen $(0,0)$ paikkavektori.

1.2 Kahden pisteen välinen vektori

Vektoria pisteestä A pisteeseen B kulkevaa vektoria merkitään \overline{AB} . Vektoria pisteestä B pisteeseen A kulkevaa vektoria merkitään \overline{BA} .



Kuva 1.7: Kahden pisteen väliset vektorit.

Tehtävä 1.2.1. ...

- Piirrä koordinaatisto ja valitse sen ensimmäiseltä neljännekseltä kaksi pistettä. Merkitse näitä pisteitä kirjaimilla P ja Q . Merkitse myös pisteiden koordinaatit näkyviin.
- Piirrä vektori \overline{PQ} .
- Ilmoita vektori \overline{PQ} vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla.

Tehtävä 1.2.2. ...

- Piirrä koordinaatisto ja valitse sen toiselta, kolmannelta tai neljännekseltä neljännekseltä kaksi pistettä. Merkitse näitä pisteitä kirjaimilla R ja S . Merkitse myös pisteiden koordinaatit näkyviin.
- Piirrä vektori \overline{RS} .
- Ilmoita vektori \overline{RS} vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla.

Tehtävä 1.2.3. ...


- (a) Piirrä koordinaatistoon jotkin pisteet A ja B . Merkitse niiden koordinaatit.
- (b) Ilmoita vektori \overline{AB} vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla.
- (c) Ilmoita vektori \overline{BA} vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla.
- (d) Vertaa b- ja c-kohdan tuloksia. Mitä huomaat?

Vektorit \overline{AB} ja \overline{BA} ovat eri vektorit, sillä niitä ei voida esittää samalla tavalla vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla. Vektorin suunnalla on siis merkitystä. Vektorien suuntiin palataan kappaleessa 2.2.

2 Vektorien laskutoimituksia

2.1 Summa

Edellisessä kappaleessa opittiin muodostamaan vektoreita x - ja y -akselien suuntaisten vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla. Esimerkiksi kuvan 2.1 vektori \bar{v} on vektorien $2\bar{i}$ ja $4\bar{j}$ summa.



Kuva 2.1: Vektori $\bar{v} = 2\bar{i} + 4\bar{j}$.

Yhteenlaskettavia $2\bar{i}$ ja $4\bar{j}$ sanotaan vektorin \bar{v} **komponenteiksi**. Esimerkiksi vektorin $\bar{u} = -7\bar{i} - 3\bar{j}$ komponentit ovat vektorit $-7\bar{i}$ ja $-3\bar{j}$. Myöhemmin opitaan jakamaan xy -tason vektoreita myös muihin kuin koordinaattiakselien suuntaisiin komponentteihin.

Seuraavaksi tutkitaan, miten lasketaan yhteen mitä tahansa vektoreita. Yhteenlasku tapahtuu laskemalla vektorit komponenteittain yhteen.

Määritelmä 2.1.1. Vektorien \bar{v} ja \bar{w} summavektori $\bar{v} + \bar{w}$ saadaan laskemalla vektorit komponenteittain yhteen.

Summavektori

Määritelmä tarkoittaa, että esimerkiksi kuvan 2.2 vektorien $\bar{v} = \bar{i} + 2\bar{j}$ ja $\bar{w} = 2\bar{i} - 3\bar{j}$ summa saadaan laskemalla yhteen komponentit \bar{i} ja $2\bar{i}$ sekä komponentit $2\bar{j}$ ja $-3\bar{j}$. Koska


$$\bar{i} + 2\bar{i} = 3\bar{i}$$

ja

$$2\bar{j} + (-3\bar{j}) = 2\bar{j} - 3\bar{j} = -\bar{j},$$

niin vektorien \bar{v} ja \bar{w} summaksi saadaan

$$\bar{v} + \bar{w} = 3\bar{i} - \bar{j}.$$



Kuva 2.2: Vektorit \bar{v} , \bar{w} ja $\bar{v} + \bar{w}$.

Vektorien yhteenlaskun määritelmä voidaan ilmaista myös seuraavasti: vektorien $\bar{v} = x_1\bar{i} + y_1\bar{j}$ ja $\bar{w} = x_2\bar{i} + y_2\bar{j}$ summavektori on vektori


$$\bar{v} + \bar{w} = (x_1 + x_2)\bar{i} + (y_1 + y_2)\bar{j}.$$

Tehtävä 2.1.2. Tutkitaan vektoreita $\bar{v} = 2\bar{i} + 2\bar{j}$ ja $\bar{w} = \bar{i} + 3\bar{j}$.

- Piirrä vektori \bar{v} koordinaatistoon.
- Piirrä vektori \bar{w} koordinaatistoon siten, että se alkaa vektorin \bar{v} kärkipisteestä.
- Laske summavektori $\bar{v} + \bar{w}$, eli ilmoita se vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla.
- Piirrä vektori $\bar{v} + \bar{w}$ koordinaatistoon siten, että se alkaa vektorin \bar{v} alkupisteestä. Mitä huomaat?

Edellisen tehtävän havaintosi pätee yleisesti: vektorien \bar{v} ja \bar{w} summa on vektori $\bar{v} + \bar{w}$, joka alkaa vektorin \bar{v} alkupisteestä ja päättyy vektorin \bar{w} kärkipisteeseen. Esimerkiksi kuvan 2.3 vektorien $\bar{a} = 3\bar{i} + 5\bar{j}$ ja $\bar{b} = 4\bar{i} - 2\bar{j}$ summa on

$$\begin{aligned}\bar{a} + \bar{b} &= (3\bar{i} + 5\bar{j}) + (4\bar{i} - 2\bar{j}) \\ &= (3 + 4)\bar{i} + (5 + (-2))\bar{j} \\ &= 7\bar{i} + 3\bar{j} \\ &= \bar{c}.\end{aligned}$$



Kuva 2.3: Vektorien \bar{a} ja \bar{b} summa on vektori \bar{c} .


Tehtävä 2.1.3. Tutkitaan vektoreita $\bar{v} = -2i + j$ ja $\bar{w} = 4i + 4j$.

- Piirrä summavektori $\bar{v} + \bar{w}$ koordinaatistoon vektorien \bar{v} ja \bar{w} avulla.
- Ilmoita vektori $\bar{v} + \bar{w}$ vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla.
- Tarkista tuloksesi laskemalla yhteen vektorit \bar{v} ja \bar{w} komponenteittain.

Tehtävä 2.1.4. Tutkitaan vektoreita $\bar{u} = i + 2j$, $\bar{v} = -3i + j$ ja $\bar{w} = 3i + -5j$.

- Piirrä vektori $\bar{u} + \bar{v} + \bar{w}$ koordinaatistoon vektorien \bar{u} , \bar{v} ja \bar{w} avulla.
- Piirrä vektori $\bar{v} + \bar{u} + \bar{w}$ koordinaatistoon vektorien \bar{u} , \bar{v} ja \bar{w} avulla.
- Piirrä vektori $\bar{w} + \bar{u} + \bar{v}$ koordinaatistoon vektorien \bar{u} , \bar{v} ja \bar{w} avulla.
- Mitä huomaat?


Edellisen tehtävän tulos tarkoittaa sitä, että vektorien yhteenlaskun järjestyksellä ei ole merkitystä. Vektorien yhteenlasku on siis **vaihdannainen** operaatio. Tämä näkyy selvästi kuvasta 2.4: vektori $4\bar{j} + 2\bar{i}$ on sama kuin vektori $2\bar{i} + 4\bar{j}$.



Kuva 2.4: Vektori $\bar{v} = 2\bar{i} + 4\bar{j} = 4\bar{j} + 2\bar{i}$.

2.2 Vektorin kertominen reaaliluvulla

Tarkastellaan seuraavaa kuvaa 2.5. Kuvassa oleva vektori \bar{a} voidaan ilmaista vektorin \bar{j} avulla muodossa $5\bar{j}$. Vektori \bar{a} saadaan siis kertomalla vektoria \bar{j} luvulla 5.




Kuva 2.5: Vektori $\bar{a} = 5\bar{j}$.

Tehtävä 2.2.1. ...

- (a) Piirrä koordinaatistoon vektorit $\bar{a} = \bar{i} + \bar{j}$ ja $3\bar{a}$.
- (b) Ilmoita vektori $3\bar{a}$ vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla.
- (c) Vertaa vektorien \bar{a} ja $3\bar{a}$ komponenttiesityksiä toisiinsa. Mitä huomaat?

Edellisessä tehtävässä havaittiin, että vektorin kertominen jollakin reaaliluvulla on sama asia, kuin jos samalla reaaliluvulla kerrotaan vektorien \bar{i} ja \bar{j} kertoimet. Kun siis esimerkiksi vektoria $\bar{v} = -4\bar{i} + 3\bar{j}$ kerrotaan luvulla 2, saadaan vektori

$$\begin{aligned} 2\bar{v} &= 2 \cdot (-4\bar{i} + 3\bar{j}) \\ &= 2 \cdot (-4)\bar{i} + 2 \cdot 3\bar{j} \\ &= -8\bar{i} + 6\bar{j}. \end{aligned}$$



Kuva 2.6: Vektorin $\bar{v} = -4\bar{i} + 3\bar{j}$ kertominen luvulla 2.

Määritelmä 2.2.2. Vektorin \bar{v} skalaarimonikerta $r\bar{v}$ saadaan kertomalla vektorin \bar{v} komponentit reaaliluvulla r .

**Vektorin
kertominen
reaaliluvulla**

Kun vektoria $\bar{v} = x\bar{i} + y\bar{j}$ kerrotaan reaaliluvulla r , saadaan siis vektori

$$r\bar{v} = r(x\bar{i} + y\bar{j}) = (rx)\bar{i} + (ry)\bar{j}.$$

Tehtävä 2.2.3. Tutkitaan vektoria $\bar{a} = -\bar{i} + 2\bar{j}$.

- Piirrä vektorit $2\bar{a}$, $3\bar{a}$ ja $5\bar{a}$ koordinaatistoon vektorin \bar{a} avulla.
- Ilmoita vektorit $2\bar{a}$, $3\bar{a}$ ja $5\bar{a}$ vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla.
- Tarkista tuloksesi kertomalla vektoria \bar{v} komponentteittain.

Tehtävä 2.2.4. ...


- Piirrä koordinaatistoon vektorit $\bar{a} = \bar{i} + 2\bar{j}$ ja $\bar{b} = 2\bar{i} + 4\bar{j}$.
- Miten voisit ilmaista vektorin \bar{b} vektorin \bar{a} avulla?

Tehtävä 2.2.5. Tutkitaan vektoria $\bar{a} = -3\bar{i} + 2\bar{j}$.

- Piirrä vektori \bar{a} koordinaatistoon.
- Laske vektorin $-1 \cdot \bar{a}$ komponenttiesitys ja piirrä se koordinaatistoon.
- Vertaa piirtämiäsi vektoreita sekä niiden komponenttiesityksiä keskenään. Mitä huomaat?


Määritelmä 2.2.6. Vektori $-1 \cdot \bar{v}$ on vektorin \bar{v} vastavektori, ja sitä merkitään $-\bar{v}$.

Vastavektorit



Kuva 2.7: Vektori \vec{v} ja sen vastavektori $-\vec{v}$.

Tehtävä 2.2.7. Tarkastellaan alla olevaa kuvaa 2.8.



Kuva 2.8: Vektoreita

- Ilmoita kaikki kuvan vektorit vektorien \vec{i} ja \vec{j} avulla.
- Mitkä vektoreista ovat toistensa vastavektoreita?

Tutkitaan seuraavaksi vektorien suuntia. Esimerkiksi kuvasta 2.6 huomataan, että vektori $2\vec{v}$ kulkee samaan suuntaan vektorin \vec{v} kanssa. Nämä vektorit ovat siis **samansuuntaisia**. Lisäksi kuvasta 2.7 huomataan, että vektori $-\vec{a}$ kulkee vastakkaiseen suuntaan kuin vektori \vec{a} . Tällaisia vektoreita kutsutaan **vastakkais-suuntaisiksi** vektoreiksi.

Tehtävä 2.2.8. ...


- (a) Millaisella luvulla vektoria tulee kertoa, jotta sen suunta muuttuu vastakkaiseksi?
- (b) Millaisella luvulla kertominen säilyttää vektorin suunnan?

Määritelmä 2.2.9. Vektorit \bar{v} ja \bar{w} ovat yhdensuuntaiset, jos $\bar{v} = r\bar{w}$ jollakin reaaliluvulla r .

Yhdensuuntaisuus

Toisin sanoen vektorit ovat yhdensuuntaiset, jos ne ovat joko saman- tai vastakkaisuuntaiset.

Tehtävä 2.2.10. Tarkastellaan alla olevaa kuvaa 2.9



Kuva 2.9: Vektoreita.

- (a) Mitkä kuvan vektoreista ovat samansuuntaisia?
- (b) Mitkä kuvan vektoreista ovat vastakkaisuuntaisia?
- (c) Mitkä kuvan vektoreista ei ole yhdensuuntainen minkään muun kuvan vektorin kanssa?

Tehtävä 2.2.11. Tutkitaan vektoreita $\bar{a} = 2\bar{i} + 3\bar{j}$, $\bar{b} = -3\bar{i} + \bar{j}$ ja $\bar{c} = \bar{i} - 4\bar{j}$.

- (a) Piirrä koordinaatistoon vektori $\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}$.

(b) Mitä huomaat?

Vektoria, joka alkaa ja päättyy samaan pisteeseen, sanotaan nollavektoriksi. Sen komponenttiesitys on muotoa $0 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j}$. Jos mitä tahansa vektoria $\bar{v} = x\bar{i} + y\bar{j}$ kerrotaan luvulla nolla, saadaan nollavektori, sillä

$$\begin{aligned} 0 \cdot \bar{v} &= 0 \cdot (x\bar{i} + y\bar{j}) \\ &= (0 \cdot x)\bar{i} + (0 \cdot y)\bar{j} \\ &= 0 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} \\ &= \bar{0}. \end{aligned}$$

Nollavektori


Määritelmä 2.2.12. Vektoria $0 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} = \bar{0}$ sanotaan **nollavektoriksi**.

2.3 Erotus

Tehtävä 2.3.1. Tutkitaan vektoreita $\bar{v} = -2\bar{i} + 3\bar{j}$ ja $\bar{w} = 2\bar{i} - 3\bar{j}$.

- (a) Määritä summavektori $\bar{v} + \bar{w}$ laskemalla yhteen vektorit \bar{v} ja \bar{w} komponentteittain.
- (b) Piirrä vektori $\bar{v} + \bar{w}$ koordinaatistoon vektorien \bar{v} ja \bar{w} avulla.

Edellisen tehtävän vektorit \bar{v} ja \bar{w} ovat toistensa vastavektoreita. Näin ollen voidaan merkitä $\bar{w} = -\bar{v}$, ja summavektori $\bar{v} + \bar{w}$ saadaan muotoon $\bar{v} + \bar{w} = \bar{v} + (-\bar{v}) = \bar{v} - \bar{v} = \bar{0}$. Tämä pätee kaikille vektoreille: vektori $\bar{v} + (-\bar{w}) = \bar{v} - \bar{w}$. Vektorien \bar{v} ja \bar{w} erotusvektori $\bar{v} - \bar{w}$ saadaan siis lisäämällä vektoriin \bar{v} vektorin \bar{w} vastavektori. Vektoreiden erotusta havainnollistetaan kuvassa 2.10.



Kuva 2.10: Vektorit $\bar{v} + \bar{w}$ ja $\bar{v} - \bar{w}$.

Määritelmä 2.3.2. Vektorien \bar{v} ja \bar{w} erotusvektori $\bar{v} - \bar{w}$ saadaan lisäämällä vektoriin \bar{v} vektorin \bar{w} vastavektori $-\bar{w}$, eli $\bar{v} - \bar{w} = \bar{v} + (-\bar{w})$.

Erotusvektori

Vektorien $\bar{v} = x_1\bar{i} + y_1\bar{j}$ ja $\bar{w} = x_2\bar{i} + y_2\bar{j}$ erotusvektori on siis vektori

$$\bar{v} - \bar{w} = (x_1 - x_2)\bar{i} + (y_1 - y_2)\bar{j}.$$

Tehtävä 2.3.3. Tutkitaan vektoreita $\bar{a} = -3\bar{i} + 4\bar{j}$ ja $\bar{b} = 5\bar{i} + 2\bar{j}$.

- (a) Määritä vektorin \bar{b} vastavektori $-\bar{b}$.
- (b) Piirrä vektori $\bar{a} - \bar{b}$ koordinaatistoon vektorien \bar{a} ja $-\bar{b}$ avulla.
- (c) Ilmoita vektori $\bar{a} - \bar{b}$ vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla.
- (d) Tarkista tuloksesi laskemalla yhteen vektorit \bar{a} ja $-\bar{b}$ komponenteittain.


2.4 Vektorin pituus

Vektorin pituus saadaan laskettua Pythagoraan lauseen avulla. Esimerkiksi kuvan 2.11 vektorin $\bar{a} = -2\bar{i} + 3\bar{j}$ pituus saadaan yhtälöstä

$$|\bar{a}|^2 = 2^2 + 3^2.$$

Vektorin \bar{a} pituudeksi saadaan siis

$$|\bar{a}| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}.$$



Kuva 2.11: Vektori \bar{a} .

Määritelmä 2.4.1. Vektorin $\bar{v} = x\bar{i} + y\bar{j}$ pituus $|\bar{a}|$ saadaan yhtälöstä

$$|\bar{a}| = \sqrt{|x|^2 + |y|^2}.$$

Vektorin pituus

Huomaa, että merkintä $|\bar{a}|$ tarkoittaa vektorin \bar{a} pituutta, kun taas merkinnällä $|x|$ tarkoitetaan luvun x itseisarvoa.

Tehtävä 2.4.2. Tutkitaan vektoria $\bar{b} = 3\bar{i} - 4\bar{j}$.

- Piirrä vektori \bar{b} koordinaatistoon.
- Laske vektorin \bar{b} pituus $|\bar{b}|$ Pythagoraan lauseen avulla.
- Kuinka moneen osaan vektori \bar{b} pitäisi jakaa, jotta yhden osan pituus olisi 1?

Tehtävä 2.4.3. Tutkitaan vektoria $\bar{v} = 6\bar{i} + 3\bar{j}$.


- Muodosta vektorit $5\bar{v}$, $-2\bar{v}$ ja $1/3\bar{v}$.
- Laske vektorien \bar{v} , $5\bar{v}$, $-2\bar{v}$ ja $1/3\bar{v}$ pituudet.
- Vertaa vektorien \bar{v} ja $5\bar{v}$ pituuksia toisiinsa. Mitä huomaat?

Tarkastellaan kuvassa 2.12 olevien vektorien $\bar{a} = 2\bar{i} + \bar{j}$ ja $4\bar{a} = 4(2\bar{i} + \bar{j}) = 8\bar{i} + 4\bar{j}$ pituuksia. Huomataan, että vektorin \bar{a} pituus on

$$|\bar{a}| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$$

ja vektorin $4\bar{a}$ pituus on

$$|4\bar{a}| = \sqrt{8^2 + 4^2} = \sqrt{64 + 16} = \sqrt{80} = \sqrt{16 \cdot 5} = 4\sqrt{5} = 4 \cdot |\bar{a}|.$$



Kuva 2.12: Vektorit \bar{a} ja $4\bar{a}$.

Tämä pätee kaikille vektoreille. Vektorin $t\bar{v}$ pituus $|t\bar{v}|$ saadaan siis kertomalla vektorin \bar{v} pituutta luvulla t . Näin ollen $|t\bar{v}| = t \cdot |\bar{v}|$.

Tehtävä 2.4.4. Millaisella luvulla vektoria tulee kertoa, jotta sen pituus kasvaa? Entä lyhenee?

Tehtävä 2.4.5. Laske vektorien \bar{i} ja \bar{j} pituudet.


Määritelmä 2.4.6. Vektoria, jonka pituus on 1, sanotaan yksikkövektoriksi.

Yksikkövektori

Komponenttivektorit \bar{i} ja \bar{j} ovat siis yksikkövektoreita.

Tarkastellaan sitten kuvassa 2.4 olevaa vektoria $\bar{v} = 8\bar{i} + 6\bar{j}$. Sen pituudeksi saadaan $|\bar{v}| = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10$. Vektorin \bar{v} kanssa samansuuntainen yksikkövektori saadaan ottamalla siitä kymmenesosa, eli

$$\frac{1}{10}\bar{v} = \frac{1}{10}(8\bar{i} + 6\bar{j}) = 0,8\bar{i} + 0,6\bar{j}$$



Kuva 2.13: Vektorin \bar{v} ja sen kanssa samansuuntainen yksikkövektori.

Tehtävä 2.4.7. Jatkoa tehtävään 2.4.2. Tutkitaan edelleen vektoria $\bar{b} = 3\bar{i} - 4\bar{j}$.


- Määritä vektorin \bar{b} kanssa samansuuntainen yksikkövektori eli vektori, joka pituus on 1. Piirrä se koordinaatistoon.
- Määritä vektorin \bar{b} kanssa samansuuntainen vektori, jonka pituus on 10. Piirrä se koordinaatistoon.
- Määritä vektorin \bar{b} kanssa vastakkaissuuntainen yksikkövektori. Piirrä se koordinaatistoon.

Teoreema 2.4.8. *Kaksi vektoria ovat samat, jos ne ovat saman suuntaiset ja yhtä pitkät.*

Todistus. Määritelmän 1.1.8 mukaan vektorit ovat samat, jos ne voidaan esittää samalla tavalla vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla. Jos vektorit voidaan esittää samalla tavalla vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla, ne ovat välttämättä saman suuntaiset ja yhtä pitkät. Jos vektorit ovat saman suuntaiset ja yhtä pitkät, ne voidaan ilmaista samalla tavalla vektorien \bar{i} ja \bar{j} avulla, jolloin ne määritelmän mukaan ovat samat vektorit.

2.5 Vektorien välinen kulma ja pistetulo

Vektorien välisiä kulmia voidaan tarkastella, kun vektorien lähtöpisteet ovat samat. Vektorien välisellä kulmalla tarkoitetaan muodostuvista kulmista pienempää. Esimerkiksi kuvan 2.14 vektorien \vec{v} ja \vec{w} välisellä kulmalla tarkoitetaan kulmaa α .



Kuva 2.14: Vektorien \vec{v} ja \vec{w} välinen kulma α .

Tehtävä 2.5.1. ...

- Kuinka suuri on vektorien \vec{v} ja $3\vec{v}$ välinen kulma?
- Päteekö a-kohdan tulos kaikille samansuuntaisille vektoreille?
- Kuinka suuri on vektorien \vec{v} ja $-\vec{v}$ välinen kulma?
- Päteekö c-kohdan tulos kaikille vastakkaissuuntaisille vektoreille?

Tarkastellaan seuraavaksi vektorien **pistetuloa**. Pistetulon avulla voidaan laskea vektorien välisiä kulmia. Esimerkiksi vektorien $\vec{v} = -2\vec{i} + 4\vec{j}$ ja $\vec{w} = 3\vec{i} - \vec{j}$ pistetulo on

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = (-2\vec{i} + 4\vec{j}) \cdot (3\vec{i} - \vec{j}) = (-2) \cdot 3 + 4 \cdot (-1) = -6 - 4 = -10.$$

Pistetulo

Määritelmä 2.5.2. Vektorien välinen pistetulo saadaan laskemalla yhteen vektorien \vec{i} ja \vec{j} kertoimien tulot.

Vektorien $\vec{v} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j}$ ja $\vec{w} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j}$ pistetulo on siis $\vec{v} \cdot \vec{w} = x_1x_2 + y_1y_2$.

Huomaa, että merkintä $\vec{v} \cdot \vec{w}$ tarkoittaa vektorien \vec{v} ja \vec{w} pistetuloa, kun taas merkintä $3 \cdot 5$ tarkoittaa lukujen 3 ja 5 tuloa. Vektorien pistetulo on aina reaaliluku, joten sitä kutsutaan joskus myös **skalaarituloksi**.

Tehtävä 2.5.3. Tarkastellaan vektoreita $\vec{a} = 7\vec{i} + 2\vec{j}$, $\vec{b} = 3\vec{i} - 5\vec{j}$ ja $\vec{c} = -4\vec{i} - 6\vec{j}$.

- (a) Laske vektoreiden \vec{a} ja \vec{b} välinen pistetulo $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
- (b) Laske vektoreiden \vec{a} ja \vec{c} välinen pistetulo $\vec{a} \cdot \vec{c}$.
- (c) Laske vektoreiden \vec{b} ja \vec{c} välinen pistetulo $\vec{b} \cdot \vec{c}$.

Tehtävä 2.5.4. Tarkastellaan vektoreita $\vec{a} = -2\vec{i} + 3\vec{j}$ ja $\vec{b} = 6\vec{i} + 4\vec{j}$.


- (a) Laske vektoreiden \vec{a} ja \vec{b} välinen pistetulo $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
- (b) Piirrä vektorit \vec{a} ja \vec{b} koordinaatistoon siten, että niillä on sama lähtöpiste.
- (c) Mitä huomaat vektorien välisestä kulmasta?

Edellisessä tehtävässä tehty havainto pitää aina paikkansa. Itse asiassa aina, kun vektorit ovat kohtisuorassa toisiaan vasten, niiden välinen pistetulo on nolla. Toisaalta jos tiedetään, että vektorien välinen pistetulo on nolla, ne ovat välttämättä kohtisuorassa toisiaan vasten. Tämä osoitetaan täsmällisesti seuraavassa teoreemassa 2.5.5.

Teoreema 2.5.5. Vektorit \vec{a} ja \vec{b} ovat toisiaan vastaan kohtisuorassa, jos ja vain jos $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Todistus. Tutkitaan mielivaltaista kolmiota, jonka sivuina on vektorit \vec{a} , \vec{b} ja $\vec{a} - \vec{b}$. Merkitään $\vec{a} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j}$ ja $\vec{b} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j}$. Tällöin

$$\vec{a} - \vec{b} = (x_1\vec{i} + y_1\vec{j}) - (x_2\vec{i} + y_2\vec{j}) = (x_1 - x_2)\vec{i} + (y_1 - y_2)\vec{j}.$$



Kuva 2.15: Kolmio, jonka sivuina on vektorit \vec{a} , \vec{b} ja $\vec{a} - \vec{b}$.

Oletetaan ensin, että vektorit \vec{a} ja \vec{b} ovat kohtisuorassa toisiaan vasten, eli $\angle(\vec{a}, \vec{b}) =$

90°. Tutkitaan sitten kolmion sivun $\bar{a} - \bar{b}$ pituuden neliötä. Sen yhtälöksi saadaan

$$\begin{aligned} |\bar{a} - \bar{b}|^2 &= (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \\ &= (x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2) + (y_1^2 - 2y_1y_2 + y_2^2) \\ &= x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 - 2(x_1x_2 + y_1y_2) \\ &= |\bar{a}|^2 + |\bar{b}|^2 - 2(x_1x_2 + y_1y_2). \end{aligned}$$

Koska kyseessä on suorakulmainen kolmio, niin Pythagoraan lauseen käänteislauseen nojalla tiedetään, että

$$|\bar{a} - \bar{b}|^2 = |\bar{a}|^2 + |\bar{b}|^2.$$

Tästä seuraa, että sivun $|\bar{a} - \bar{b}|$ pituuden neliön yhtälössä olevan termin

$$2(x_1x_2 + y_1y_2)$$

tulee olla nolla. Tämä pätee ainoastaan silloin, kun

$$x_1x_2 + y_1y_2 = 0,$$

eli kun

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = 0.$$

Näin ollen jos vektorit \bar{a} ja \bar{b} ovat kohtisuorassa toisiaan vasten, niin $\bar{a} \cdot \bar{b} = 0$.

Oletetaan sitten, että vektorien \bar{a} ja \bar{b} välinen pistetulo on nolla, eli $\bar{a} \cdot \bar{b} = 0$. Tällöin tiedetään, että

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = x_1x_2 + y_1y_2 = 0.$$

Tällöin kolmion sivun $\bar{a} - \bar{b}$ pituuden neliölle pätee

$$\begin{aligned} |\bar{a} - \bar{b}|^2 &= |\bar{a}|^2 + |\bar{b}|^2 - 2(x_1x_2 + y_1y_2) \\ &= |\bar{a}|^2 + |\bar{b}|^2 - 2 \cdot 0 \\ &= |\bar{a}|^2 + |\bar{b}|^2. \end{aligned}$$

Nyt Pythagoraan lauseen käänteislauseen nojalla kolmio on suorakulmainen. Näin ollen jos $\bar{a} \cdot \bar{b} = 0$, niin vektorit \bar{a} ja \bar{b} ovat kohtisuorassa toisiaan vasten.

Tehtävä 2.5.6. Tutkitaan vektoreita $\bar{a} =$, $\bar{b} =$ ja $\bar{c} =$.

- Laske pistetulot $\bar{a} \cdot \bar{b}$, $\bar{a} \cdot \bar{c}$ ja $\bar{b} \cdot \bar{c}$.
- Mitkä vektoreista ovat kohtisuorassa toisiaan vasten?
- Tarkista edellisen kohdan vastauksesi tarkastelemalla vektorien välisiä kulmia koordinaatistossa.

Tehtävä 2.5.7. Tutkitaan vektoreita $\bar{a} = -2\bar{i} + 3\bar{j}$ ja $\bar{b} = t\bar{i} + 3\bar{j}$, missä t on jokin reaaliluku.

- (a) Muodosta vektorien \bar{a} ja \bar{b} välisen pistetulon $\bar{a} \cdot \bar{b}$ yhtälö.
- (b) Millä muuttujan t arvolla vektorit \bar{a} ja \bar{b} ovat kohtisuorassa toisiaan vasten?

Tehtävä 2.5.8. Tutkitaan vektoreita $\bar{v} =$ ja $\bar{w} =$.

- (a) Laske pistetulo $\bar{v} \cdot \bar{w}$.
- (b) Laske pistetulo $\bar{w} \cdot \bar{v}$.
- (c) Vertaa edellisten kohtien tuloksia keskenään. Mitä huomaat?

Teoreema 2.5.9. $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{b} \cdot \bar{a}$.

Todistus. ...

Aivan kuten vektorien yhteenlaskun tapauksessa, vektorien pistetulokin on siis **vaihdannainen** operaatio.

Tehtävä 2.5.10. Tutkitaan vektoreita $\bar{v} =$, $\bar{w} =$ ja $\bar{u} =$.

- (a) Laske pistetulo $\bar{v} \cdot (\bar{w} + \bar{u})$.
- (b) Laske pistetulo $(\bar{v} \cdot \bar{w}) + (\bar{v} \cdot \bar{u})$.
- (c) Vertaa edellisten kohtien tuloksia keskenään. Mitä huomaat?

Teoreema 2.5.11. $\bar{a} \cdot (\bar{b} + \bar{c}) = (\bar{a} \cdot \bar{b}) + (\bar{a} \cdot \bar{c})$.

Todistus. ...

Teoreema 2.5.12. $(t\bar{a}) \cdot \bar{b} = \bar{a} \cdot (t\bar{b}) = t(\bar{a} \cdot \bar{b})$.

Todistus. ...

Teoreema 2.5.13. $\bar{a} \cdot \bar{a} = |\bar{a}|^2$.

Todistus. ...


Tehtävä 2.5.14. Laske pistetulo $(2\bar{a} + \bar{b}) \cdot (7\bar{a} - 3\bar{b})$, kun $|\bar{a}| = 2$, $|\bar{b}| = 6$ ja $\bar{a} \cdot \bar{b} = -4$. Käytä hyväksesi edellä mainittuja pistetulon ominaisuuksia.

Vektorien välinen kulma voidaan laskea Geometria-kurssista tutun **kosinilauseen** avulla. Kosinilause on Pythagoraan lauseen yleistys. Pythagoraan lause pätee ai-noastaan suorakulmaisille kolmioille, mutta kosinilauseetta voi käyttää kaikille kol-mioille. Kosinilauseen mukaan

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha.$$

Vektoreita hyödyntämällä kosinilause saadaan muotoon

$$|\bar{a} - \bar{b}|^2 = |\bar{a}|^2 + |\bar{b}|^2 - 2|\bar{a}||\bar{b}| \cos \angle(\bar{a}, \bar{b}).$$



Kuva 2.16: Kosinilause.

Kosinilauseen avulla saadaan muodostettua yhteys vektorien välisen kulman ja niiden pistetulon välille. Tämä todistetaan täsmällisesti seuraavassa teoreemassa 2.5.15.

Teoreema 2.5.15. Vektorien \bar{a} ja \bar{b} pistetulo on $\bar{a} \cdot \bar{b} = |\bar{a}||\bar{b}| \cos(\bar{a}, \bar{b})$.

Todistus. Tutkitaan ensin sivun $\bar{a} - \bar{b}$ pituuden neliötä. Pistetulon ominaisuuksia hyväksi käyttäen sen yhtälö saadaan muotoon

$$\begin{aligned} |\bar{a} - \bar{b}|^2 &= (\bar{a} - \bar{b}) \cdot (\bar{a} - \bar{b}) \\ &= \bar{a} \cdot (\bar{a} - \bar{b}) - \bar{b} \cdot (\bar{a} - \bar{b}) \\ &= \bar{a} \cdot \bar{a} - \bar{a} \cdot \bar{b} - \bar{b} \cdot \bar{a} + \bar{b} \cdot \bar{b} \\ &= \bar{a} \cdot \bar{a} - \bar{a} \cdot \bar{b} - \bar{a} \cdot \bar{b} + \bar{b} \cdot \bar{b} \\ &= |\bar{a}|^2 - 2(\bar{a} \cdot \bar{b}) + |\bar{b}|^2 \\ &= |\bar{a}|^2 + |\bar{b}|^2 - 2(\bar{a} \cdot \bar{b}). \end{aligned}$$

Toisaalta kosinilauseen mukaan sivun $\bar{a} - \bar{b}$ pituuden neliölle pätee

$$|\bar{a} - \bar{b}|^2 = |\bar{a}|^2 + |\bar{b}|^2 - 2|\bar{a}||\bar{b}| \cos(\bar{a}, \bar{b}).$$

Näin ollen tiedetään, että

$$\begin{aligned} |\bar{a} - \bar{b}|^2 &= |\bar{a}|^2 + |\bar{b}|^2 - 2(\bar{a} \cdot \bar{b}) \\ &= |\bar{a}|^2 + |\bar{b}|^2 - 2|\bar{a}||\bar{b}|\cos(\bar{a}, \bar{b}), \end{aligned}$$

joten välttämättä on oltava

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = |\bar{a}||\bar{b}|\cos(\bar{a}, \bar{b}).$$

Tehtävä 2.5.16. Vektorin \bar{a} pituus on 3 ja vektorin \bar{b} pituus on 7. Laske vektorien välinen pistetulo $\bar{a} \cdot \bar{b}$, kun

- (a) vektorit \bar{a} ja \bar{b} ovat samansuuntaiset.
- (b) vektorit \bar{a} ja \bar{b} ovat vastakkaissuuntaiset.
- (c) vektorien \bar{a} ja \bar{b} välinen kulma on 43° .

Teoreemasta 2.5.15 saadaan johdettua kaava myös vektorien väliselle kulmalle. Kun yhtälön

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = |\bar{a}||\bar{b}|\cos(\bar{a}, \bar{b})$$

molemmat puolet jaetaan termillä $|\bar{a}||\bar{b}|$, saadaan seuraava tulos:

Teoreema 2.5.17. *Jatkoa teoreemaan 2.5.15. Vektorien \bar{a} ja \bar{b} välinen kulma saadaan kaavasta*

$$\cos(\bar{a}, \bar{b}) = \frac{\bar{a} \cdot \bar{b}}{|\bar{a}||\bar{b}|}.$$

Tehtävä 2.5.18. Tarkastellaan kolmiota ABC , missä $\overline{AB} = 5\bar{i} - 4\bar{j}$ ja $\overline{AC} = 9\bar{i} + 3\bar{j}$. Laske kolmion kulmien suuruudet asteen tarkkuudella.

Tehtävä 2.5.19. Kolmion ABC kärjet ovat pisteissä $A = (-7, 1)$, $B = (4, 9)$ ja $C = (-3, -5)$. Laske kolmion kulmien suuruudet asteen tarkkuudella.