

COURS DE MATHÉMATIQUES

TOME VII

CALCUL DIFFÉRENTIEL

Mathématiques générales

Limoges, France ~ 2024

Écrit et réalisé par Louis Lascaud

Chapitre 1

Différentiabilité

Résumé

Texte.

1.1 Applications différentiables

Dans tout le chapitre, nous considérons :

- \mathbb{K} un corps commutatif dont nous notons les lois comme habituellement ;
- E, F deux espaces vectoriels sur \mathbb{K} . Leurs lois, encore une fois notées comme habituellement, ne sont pourtant pas forcément les mêmes ;
- une norme $\| \cdot \|_E$ sur E et une norme $\| \cdot \|_F$ sur F . Par paresse, nous les notons parfois toutes deux $\| \cdot \|$, mais uniquement lorsque les choses sont claires ;
- un ouvert $U \subseteq E$;
- un point $a \in U$;
- $f : U \longrightarrow F$ une application quelconque.

1.1.1 Rappels sur les applications linéaires continues

1.1.2 Définition

—→ **Notation.** Étant donnée une application linéaire f , x un vecteur de E , on note parfois $f(x) = f \cdot x$, voire $f(x) = fx$.

Exercice 1

Justifier cette notation.

▷ **Éléments de réponse.**

Un mot est plus important que les autres...

Définition.

Soit W un voisinage de 0_E dans E et $\delta : W \rightarrow F$ une application. On dit que δ est un petit o de h au voisinage de 0_E , et on note $\delta(h) = o(h)$, lorsque $\lim_{h \rightarrow 0_E} \frac{\|\delta(h)\|_F}{\|h\|_E} = 0$.

Définition. (Différentiabilité en un point)

On dit que f est *différentiable* en a s'il existe une application linéaire continue φ telle que

$$f(a+h) = f(a) + \varphi(h) + o(h).$$

Cette notation n'est qu'une extension de : $f(a+h) - f(a) - \varphi(h) = o(h)$.

L'application φ est appelée *différentielle de f en a* . On note indifféremment $\varphi = df_a = df(a) = Df_a = Df(a)$.

On peut récrire cette définition de diverses manières. Afin de les couvrir toutes d'un coup, voilà l'autre façon la plus courante :

Définition. (Différentiabilité en un point)

On dit que f est *différentiable* en a s'il existe une application linéaire continue L telle que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\|f(x) - f(a) - L(x) + L(a)\|_F}{\|x - a\|_E} = 0.$$

On a déjà le résultat suivant :

Propriété. (Unicité de la différentielle)

Si f est différentiable en a , alors sa différentielle est unique.

▷ Soient $L_1, L_2 \in \mathcal{L}_c(E, F)$ deux différentielles de f en a . Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $h \in E$ vérifiant $\|h\| < \delta$, on ait

$$\|f(a+h) - f(a) - L_1(h)\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \|h\| \text{ et } \|f(a+h) - f(a) - L_2(h)\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \|h\|$$

(il suffit de prendre le plus petit des deux δ pour L_1 et L_2). Grâce à l'inégalité triangulaire, on obtient $\|(L_1 - L_2)(h)\| \leq \varepsilon \|h\|$ pour tout $h \in B_E(0, \delta)$. L'homogénéité de $L_1 - L_2$ donne qu'en fait cette inégalité est vérifiée pour tout $h \in E$, en l'appliquant à $h' = \frac{\delta}{2\|h\|} h$. En faisant tendre ε vers zéro, $L_1(h) = L_2(h)$ pour tout h soit $L_1 = L_2$. ■

Remarque. Ceci justifie l'usage de la notation $\varphi = df_a$.

1.1.3 Classes de régularité

Définition. (Fonction lisse)

Une fonction f est dite *lisse* si elle est C^∞ .

1.2 Grands théorèmes du calcul différentiel

1.2.1 Lemmes

Théorème. (Lemme d'Hadamard)

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^p avec $p \geq 1$ et U un ouvert étoilé en $a = (a_1, \dots, a_n) \in U$. Alors il existe des fonctions g_1, \dots, g_n de classe C^{p-1} telles que pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $f(x) = f(a) + \sum_{i=1}^n (x_i - a_i)g_i(x)$.

▷ D'après le second théorème fondamental de l'analyse, $f(x) - f(a) = \int_0^1 \frac{d}{dt} f(a + t(x - a)) dt$.

Mais par dérivation des fonctions composées, $\frac{d}{dt} f(a + t(x - a)) = \sum_{i=1}^n (x_i - a_i) \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + t(x - a))$. Le résultat s'ensuit, avec $g_i(x) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + t(x - a)) dt$, qui est C^{p-1} en vertu de la règle de Leibniz. ■

Remarques.

1. On a nécessairement $g_i(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ en observant la preuve.
2. Les fonctions g_i ne sont pas uniques.

Propriété. (Régularité des fonctions d'accroissement)

Pour toute fonction lisse f telle que $f(0) = 0$, $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ est bien définie et lisse.

▷ Il suffit d'appliquer le lemme d'Hadamard en 0 pour une fonction de \mathbb{R} dans \mathbb{R} au rang $n + 1$, pour montrer que f est C^n pour tout $n \in \mathbb{N}$. ■

1.2.2 Théorème d'inversion locale, théorème d'inversion globale

1.2.3 Théorèmes des fonctions implicites

1.2.4 Théorème du rang constant

Soient $n, m \in \mathbb{N}$ et U un ouvert de \mathbb{R}^n .

Définition. (Rang d'une application en un point)

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ différentiable. Le *rang* de f en $a \in U$ (f n'a aucune raison d'être linéaire!) est le rang de l'application linéaire $(df(a)) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$.

Remarquons que le rang ne peut qu'augmenter au voisinage d'un point.

Propriété

Si f est C^1 et $a \in U$, alors il existe un voisinage ouvert V de a , $V \subseteq U$ tel que $\forall x \in V$, $\text{rg}(df(x)) \geq \text{rg}(df(a))$.

▷ En effet, le rang d'une matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ est la taille maximale des sous-matrices carrées extraites de A qui sont inversibles. Ici $J(f)(a) \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. Il existe donc une sous-matrice de taille r inversible $B(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{i \in I_r \subseteq \{1, \dots, m\}, j \in J_r \subseteq \{1, \dots, n\}}$. L'application $U \rightarrow \mathcal{M}_r(\mathbb{R})$ est

$$x \mapsto B(x)$$

continue et donc son déterminant est continu. Donc il existe $U' \subseteq U$ contenant a tel que pour tout $x \in U'$, $\det(B(x)) \neq 0$, i. e. $Jf(x)$ est de rang $\geq r$. ■

On rappelle ce théorème d'algèbre linéaire : si $C \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ est de rang r , il y a $P \in GL_m(\mathbb{R})$, $Q \in GL_n(\mathbb{R})$ tel que $PCQ = J_r$ la matrice $\text{Diag}(1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ où 1 a la multiplicité r . On essaie de raffiner ce théorème dans le cas d'une application différentiable, grâce à la définition précédente de rang, en imposant que *le changement de base soit un difféomorphisme*.

Théorème. (Théorème du rang constant)

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application de classe C^k , $k \in \mathbb{N}^*$. On suppose que pour tout $x \in U$, $\text{rg}(df(x)) = r$. Alors pour tout $x_0 \in U$, il existe un voisinage $U_{x_0} \subseteq U$ de x_0 et un voisinage $V_{f(x_0)} \subseteq \mathbb{R}^m$ un voisinage de $f(x_0)$, il existe U' un ouvert de \mathbb{R}^n et $\phi : U' \rightarrow U_{x_0}$ un C^k -difféomorphisme, il existe V' un ouvert de \mathbb{R}^m et $\psi : V_{f(x_0)} \rightarrow V'$ un C^k -difféomorphisme tel que :

$$\psi \circ f \circ \phi(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0)$$

avec les notations évidentes.

Certains auteurs par de *subimmersion* (en fait, d'immersion lorsque la différentielle est injective, de submersion lorsqu'elle est surjective, d'où le terme).

▷ On considère $J(f)(x_0)$ de rang r . Quitte à considérer $P_1.f.P_2$ où P_1, P_2 sont des matrices de permutations. On peut supposer que $A = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x_0) \right)_{1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq r}$ soit inversible. On considère l'application $H : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ définie par $x \mapsto (f^1(x), \dots, f^r(x), x_{r+1}, \dots, x_n)$. Alors H est C^k . On a $J(H)(x_0) = \begin{pmatrix} A & * \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix}$ où A est une matrice carré de taille r . Or $J(H)(x_0)$ est inversible. On

peut donc appliquer le théorème d'inversion locale, donc il existe $U_{x_0} \subseteq U$ un voisinage de x_0 tel que $H|_{U_{x_0}} : U_{x_0} \rightarrow H(U_{x_0}) = U'$ est un C^k -difféomorphisme. Soit $\phi = (H|_{U_{x_0}})^{-1}$. Alors $\phi : U' \rightarrow U_{x_0}$ est un C^k -difféomorphisme tel que $f \circ \phi(x_1, \dots, x_n) = (f^1 \circ \phi, \dots, f^r \circ \phi, f^{r+1} \circ \phi, \dots, f^n \circ \phi)$. Ainsi $H \circ \phi(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n) = (f^1 \circ \phi(x), \dots, f^r \circ \phi(x), \phi^{r+1}(x), \dots, \phi^n(x))$ puis $f \circ \phi(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_r, g_{r+1}(x), \dots, g_n(x))$, d'où $J(f \circ \phi)(x) = J(f)(\phi(x)) \cdot J(\phi)(x)$ pour tout $x \in U'$, où $J(f)(\phi(x))$ est de rang r et $J(\phi)(x)$ est inversible.

Ainsi pour tout $x \in U'$, $\text{rg}(J(f \circ \phi)) = r$. Donc $J(f \circ \phi) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ \star & \frac{\partial g_i}{\partial x_j} \end{pmatrix}_{i \geq r+1, j \geq r+1}$. Alors $\forall i \geq$

$r+1, \forall j \geq r+1, \frac{\partial g_i}{\partial x_j} = 0$ pour tout $x \in U'$ (c'est là que l'hypothèse sur le rang est cruciale). Par suite, g_{r+1}, \dots, g_n ne dépendent pas de x_{r+1}, \dots, x_n .

Soit pour (z_1, \dots, z_m) au voisinage de $f(x_0)$, la fonction $\psi(z_1, \dots, z_m) = (z_1, \dots, z_r, z_{r+1} - g_{r+1}(z_1, \dots, z_r), \dots, z_m - g_m(z_1, \dots, z_r))$. On a alors $J(\psi)(z) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ \star & I_{n-r} \end{pmatrix}$, donc $J(\psi)(z)$ est inversible en $z = f(x_0)$. On applique encore le théorème d'inversion locale à ψ , donc il existe un ouvert $V_{f(x_0)}$ contenant $f(x_0)$ tel que $\psi|_{V_{f(x_0)}} : V_{f(x_0)} \rightarrow V'$ est un difféomorphisme, et d'après les formules précédentes, $\psi \circ f \circ \phi(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0)$. ■

Ce théorème est remarquable; c'est un théorème de normalisation. En effet, à changement de variables près, les applications de rang r sont de la forme précédente : $x \mapsto (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0)$.

On signale des cas particuliers qui seront largement utiles dans la suite, et notamment en géométrie différentielle.

1.2.4.1 Immersions, submersions

Définition. (Immersion)

Soit U un ouvert de \mathbb{R}^n , et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^k . On dit que c'est une *immersion* en $x_0 \in U$ si $df(x_0) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ est injective. Il faut en particulier $n \leq m$.

Remarque. Si $df(x_0)$ est injective, alors il y a un voisinage de x_0 sur lequel $df(x)$ est injective, *i. e.* sur lequel f est de rang constant, égal à n par le théorème du rang.

Dans le cas des immersions, on a une version légèrement plus forte que le théorème du rang constant, en cela que l'on a besoin d'un changement de variables qu'à l'arrivée.

Théorème. (Forme canonique des immersions)

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^k , avec $0 \in U$ (on peut énoncer une version largement plus générale, mais paraphrasée). On suppose $df(0)$ injective. Alors il existe $U' \subseteq U$

un ouvert, $0 \in U'$ et $V \subseteq \mathbb{R}^m$ un ouvert contenant $f(0)$ et $\psi : V \rightarrow \psi(V)$ un C^k -difféomorphisme tel que $\psi \circ f(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)$ pour tous $(x_1, \dots, x_n) \in U'$.

▷ On reprend la preuve du théorème du rang constant. Ici $r = n$ et $H(x_1, \dots, x_n) = (f^1(x), \dots, f^n(x))$ (H est une partie de f) de \mathbb{R}^n dans \mathbb{R}^m . On a introduit $\phi = (H|_{U_{x_0}})^{-1}$. Alors $f \circ \phi(y_1, \dots, y_n) = (y_1, \dots, y_n, g_{n+1}(y), \dots, g_m(y))$ et $\psi \circ f \circ \phi(y_1, \dots, y_n) = (y_1, \dots, y_n, 0, \dots, 0)$. Ceci donne $\psi \circ f(z_1, \dots, z_n) = (f^1(z_1, \dots, z_n), \dots, f^n(z_1, \dots, z_n), 0, \dots, 0)$. On compose à gauche par $\phi \times \text{id}_{\mathbb{R}^{m-n}}$. Alors $\phi \times \text{id}_{\mathbb{R}^{m-n}} \circ f(z_1, \dots, z_n) = (z_1, \dots, z_n, 0, \dots, 0)$. ■

On énonce le résultat analogue pour les submersions.

Définition. (Submersion)

Soit U un ouvert de \mathbb{R}^n , et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^k . On dit que c'est une *submersion* en $x_0 \in U$ si $df(x_0) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ est surjective. Il faut en particulier $m \leq n$.

Remarque. Si f est une submersion en $x_0 \in U$, il y a un voisinage V de x_0 contenu dans U tel que pour tout $x \in V$, f est une submersion en x . Ainsi f est de rang constant sur V , égal à m par définition du rang.

Théorème. (Forme canonique des submersions)

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^k . On suppose que f est une submersion en x_0 . Alors il existe un voisinage ouvert $U_{x_0} \subseteq U$, un ouvert $U' \subseteq \mathbb{R}^n$ et $\phi : U' \rightarrow U_{x_0}$ un C^k -difféomorphisme tel que $\forall x \in U'$, $f \circ \phi(x) = (x_1, \dots, x_m)$.

▷ (C'est beaucoup plus rapide.) C'est le cas $r = m$ du théorème du rang constant, où alors $\psi = \text{id}_{\mathbb{R}^m}$. ■

On remarquera le lien heuristique avec ces propositions à la caractérisation de l'injectivité et de la surjectivité par inversibilités latérales, pour des applications quelconques.

Chapitre 2

Géométrie différentielle

Résumé

La géométrie différentielle explique comment faire du calcul différentiel sur des variétés abstraites sur des espaces topologiques *a priori* qui ne se plongent pas dans l'espace euclidien. Une fois cette description faite, on dispose des outils du calcul différentiel dans ces espaces, notamment la recherche d'extrema ou les équations différentielles.



2.1 Sous-variétés de l'espace euclidien

Soit n un entier naturel.

2.1.1 Définitions

Définition-propriété. (Sous-variétés de \mathbb{R}^n)

Soit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ une partie de l'espace euclidien canonique de dimension n . Les quatre conditions suivantes sont équivalentes :

1. (Submersion/par équation) Pour tout $x \in M$, il existe un voisinage ouvert U de x dans \mathbb{R}^n et une application $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ une application de classe C^p , $p \in \mathbb{N}^*$ telle que $df(x) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^{n-k})$ est surjective, i. e. f est une submersion

en x , et $U \cap M = f^{-1}(f(x))$ (autrement dit, $U \cap M$ est donné par $n - k$ équations indépendantes). Il faut et suffit en fait de trouver f une C^k -submersion en x telle que $M \cap U = f^{-1}(0)$, ou $M \cap U = f^{-1}(a)$ pour n'importe quel a fixé.

2. (*Grappe*) Pour tout $x \in M$, quitte à faire une permutation des coordonnées, il y a une décomposition dite *identification linéaire* $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{n-k}$ et si $x = (x_1, x_2)$, $U_1 \subseteq \mathbb{R}^k$, $x_1 \in U_1$ un ouvert et $U_2 \subseteq \mathbb{R}^{n-k}$, $x_2 \in U_2$ un ouvert et $\varphi_x : U_1 \rightarrow U_2$ de classe C^p est tel que $M \cap (U_1 \times U_2) = \text{Grappe}(\varphi_x) = \{(y_1, y_2) \in U_1 \times U_2, y_2 = \varphi_x(y_1)\}$.
3. (*Redressement local/par coordonnée rectifiante*) Pour tout $x \in M$, il existe un voisinage ouvert U_x de x dans \mathbb{R}^n et un voisinage ouvert V de 0 dans \mathbb{R}^n et $\psi : U_x \rightarrow V$ un C^p -difféomorphisme tel que $\psi(x) = 0$ et $\psi(U_x \cap M) = V \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$. ψ est alors appelé *redressement local* en x , voire *carte locale* en x . De même que précédemment, on peut remplacer 0 par un a fixé sans problème par translation.
4. (*Paramétrisation locale, immersion*) Pour tout $x \in M$, il existe un voisinage ouvert U de x dans \mathbb{R}^n , un ouvert Ω de \mathbb{R}^k , $0 \in \Omega$ et $g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe C^p tels que $g(0) = x$, g est un homéomorphisme de Ω sur $M \cap U$ et $dg(0)$ est injective, i. e. g est une immersion en 0 ; même remarque pour changer 0 en a .

Lorsqu'elles sont satisfaites, on dit de M que c'est une *sous-variété* de \mathbb{R}^n , de dimension k , et de classe C^p , où $k \leq n$ et $p \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

On dit aussi qu'un point $x \in M$ partie de \mathbb{R}^n est *lisse* s'il vérifie l'une des conditions précédentes; dans ce cas, une sous-variété est un ensemble lisse.

On dit que la sous-variété est *lisse* si elle est de classe C^∞ (des conventions qui, parfois, se recoupent peu fortuitement).

$\triangleright (2) \Rightarrow (1)$: soient U_1 un ouvert de \mathbb{R}^k , U_2 un ouvert de \mathbb{R}^{n-k} et $\varphi : U_1 \rightarrow U_2$ de classe C^p . On note $\text{Gr}(\varphi) = \{(y_1, y_2), y_2 = \varphi(y_1)\}$. Soit $f : U_1 \times U_2 \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ définie par $(x_1, x_2) \mapsto x_2 - \varphi(x_1)$ de classe C^p également, où alors $f^{-1}(0) = \text{Gr}(\varphi)$. On a bien : $df(x)(h_1, h_2) = h_2 - d\varphi(x_1)(h_1)$ surjectif.

$(1) \Rightarrow (2)$: pour $x \in M$, prenons $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ avec $df(x)$ de rang $n - k$. Quitte à faire une permutation sur les coordonnées, on peut supposer que les $n - k$ dernières colonnes de $J(f)(x)$ sont indépendantes. On a alors une décomposition $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{n-k}$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ avec $\partial_2 f(x)$ inversible. Le théorème des fonctions implicites dit pour $x = (x_1, x_2)$ et $f(x) = 0$ que $f^{-1}(0)$ est au voisinage de x le graphe d'une application C^p .

$(3) \Rightarrow (1)$: soit $\phi : U \rightarrow V$ un redressement local difféomorphique, $\phi = (\phi^1, \dots, \phi^n)$. On a $\phi(U \cap M) = V \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ définie par $x \mapsto (\phi^{k+1}(x), \dots, \phi^n(x))$ de classe C^p . Alors $M \cap U = f^{-1}(0)$. Alors $Jf(x)$ est une matrice extraite (en prenant les dernières colonnes) de $J\phi(x)$, qui est inversible : ces dernières colonnes sont linéaires indépendantes. D'où $J(f)(x)$ surjective.

$(2) \Rightarrow (4)$: lorsqu'on a un graphe, on a une paramétrisation sous-jacente. On suppose que $M \cap U$ est un graphe de $\varphi : U_1 \rightarrow U_2$ de classe C^p et $U = U_1 \times U_2$. On considère $g : U_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ définie par $x \mapsto (x, \varphi(x))$ de classe C^p . Alors g une immersion, g est bijection sur $\text{Gr}(\varphi)$ est c'est bien un homéomorphisme car g est la première projection.

(4) \Rightarrow (3) : soit $g : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ une paramétrisation locale, avec $dg(0)$ injective. On a $g(\Omega) = U \cap M$ où g est un homéomorphisme. On veut un redressement. On peut penser à la forme canonique des immersions. Il existe un ouvert $\Omega' \subseteq \Omega$, $0 \in \Omega'$ et $\psi : U_x \rightarrow \psi(U_x)$ un C^p -difféomorphisme tel que $\psi \circ g(x) = (x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)$. Or $g(\Omega')$ est un ouvert de $U \cap M$ dont de la forme $U' \cap M$. Posons $V' = \psi(U')$. On a $\psi(U' \cap M) = \psi \circ g(\Omega') = \Omega' \times \{0\} \subseteq V' \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$. Pour avoir une égalité comme dans la formulation attendue, on va « réduire » V' . Soit $W = V' \cap (\Omega' \times \mathbb{R}^{n-k})$ un voisinage ouvert de 0. On a $\Omega' \times \{0\} \subseteq W \subseteq \Omega' \times \mathbb{R}^{n-k}$ et $\Omega' \times \{0\} \subseteq W \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\}) \subseteq \Omega' \times \{0\}$. D'où $W \cap \mathbb{R}^k \times \{0\} = \Omega' \times \{0\}$. On prend finalement $\phi^{-1}(W) = U''$ et $\phi(U'' \cap M) = W \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$. ■




FIGURE 2.1.1 : Définition par submersion, illustration. —
Sur le dessin, l'entier p correspond à l'entier k de la preuve !




FIGURE 2.1.2 : Définition par graphe, illustration. —
Sur le dessin, l'entier p correspond à l'entier k de la preuve, et $U_1 = V$, $U_2 = U$.

Exemples. (Sous-variétés de l'espace euclidien)

1. (Sphère) Prenons $S^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n$ la sphère de rayon 1. Elle est définie par la fonction $f(x) = \sum x_i^2$ clairement de classe C^∞ . De plus, $df(x)(h) = 2\langle x, h \rangle$. Si $x \neq 0$, $df(x)$ est une forme linéaire non nulle, donc surjective. Ainsi $S^{n-1} = f^{-1}(1)$. Donc la sphère est une sous-variété de \mathbb{R}^n .




FIGURE 2.1.3 : Définition par redressement, illustration. —
Sur le dessin, l'entier p correspond à l'entier k de la preuve !




FIGURE 2.1.4 : Définition par paramétrage, illustration. —
Sur le dessin, l'entier p correspond à l'entier k de la preuve !

Plus généralement, soit A une partie de l'espace euclidien définie par une équation $f(x_1, \dots, x_n) = a$ où $a \in \mathbb{R}$ et f est C^p , alors pour tout $x \in A$, df_x est une forme linéaire. Elle est surjective si et seulement si elle est non nulle. Il s'agit donc de chercher les points critiques de f . Ainsi, si a n'est pas valeur critique (c'est-à-dire, valeur de f en un point critique), $f^{-1}(a) = A$ est une sous-variété de \mathbb{R}^n . Si a est valeur critique, on ne peut pas conclure.

2. Un singleton, un ouvert est une sous-variété de \mathbb{R}^n (voir remarque ci-dessous).
3. Tout sous-espace affine de \mathbb{R}^n est trivialement une sous-variété de \mathbb{R}^n , grâce à ses équations paramétriques qui sont linéaires.
4. Un cercle, un ellipse, une parabole, une hyperbole du plan, sont toutes des sous-variétés différentielles de l'espace euclidien.
5. La réunion d'un plan et d'une droite de l'espace se coupant en un seul point n'est pas une sous-variété de \mathbb{R}^3 . La réunion de deux droites sécantes, un serpent qui se mord la queue, le graphe de la valeur absolue... ne sont pas des sous-variétés de l'espace. Ceci vient de problèmes topologiques dus à la présence de points multiples au voisinage desquels l'espace n'a pas le même groupe fondamental qu'une boule de \mathbb{R}^n .
6. Le groupe orthogonal est un ensemble défini par une équation globale. On

a $\mathcal{O}(n) = \{M \in GL_n(\mathbb{R}), M^T \cdot M = \text{Id}\}$. Soit f l'application $M \mapsto M^T M$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans lui-même. On peut la co-restreindre à $S_n(\mathbb{R})$; montrons que c'est une submersion. La différentielle de cette application est $df(M)(H) = M^T H + H^T M = M^T H + (M^T H)^T$. Calculons le rang de $df(M)$ si $M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. On a $\text{Ker}(df(M)) = \{H, M^T H \in A_n(\mathbb{R})\}$. Comme $M^T = M^{-1}$ est inversible, ce noyau a la dimension de $A_n(\mathbb{R})$. Par le théorème du rang, f ainsi corestreinte est une submersion.

Les définitions que nous avons donné de sous-variété en font une *notion locale*.

Remarques.

1. Les sous-variétés de dimension n dans \mathbb{R}^n , ou, autrement dit, de codimension nulle, sont les ouverts de \mathbb{R}^n .
2. Les sous-variétés de dimension 0 sont les points, on les appelle *points isolés*.
3. On appelle *courbes* les sous-variétés de dimension 1; *surfaces*, les sous-variétés de dimension 2.
4. Il y a unicité de la dimension et de la régularité maximale en un point. La deuxième vient immédiatement; pour l'unicité de la dimension, il faudra se rendre compte (cf section suivante) que k est égal à la dimension de l'espace tangent $T_a M$ en n'importe quel point $a \in M$. Si M est connexe non vide, alors il y a unicité de la dimension de M .

▷ Soit $x \in M$. On utilise la définition par redressement local et quitte à prendre l'intersection de deux ouverts, on considère les difféomorphismes φ_1, φ_2 associés aux pseudo-dimensions k_1, k_2 . Alors $d_x(\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1})$ induit un isomorphisme linéaire entre \mathbb{R}^{k_1} et \mathbb{R}^{k_2} , d'où l'égalité par le théorème de Brouwer.

Soit x un point de M de dimension k . On introduit l'ensemble D_k des points de M de dimension k . C'est un ouvert de M , puisque si φ est un redressement local en x défini sur l'ouvert U , alors $\varphi - \varphi(x')$ est un redressement local en tout point x' de U . De plus, D_k est fermé puisque $D_k = M \setminus \bigcup_{j \neq k} D_j$. Par connexité, $D_k = M$. ■

Propriété. (Produit de sous-variétés)

Soient M_1, M_2 sous-variétés de classe C^p de \mathbb{R}^{n_1} et \mathbb{R}^{n_2} , de dimensions k_1 et k_2 . Alors $M_1 \times M_2$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^{n_1+n_2}$ de classe C^p . De plus, $\dim(M_1 \times M_2) = \dim(M_1) + \dim(M_2)$.

▷ Par submersion. Soit $(a, b) \in M_1 \times M_2$. Il existe un ouvert U de \mathbb{R}^{n_1} contenant a , $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n_1-k_1}$ de classe C^p une submersion en a telle que $M_1 \cap U = f^{-1}(f(a))$. De même, il existe V de \mathbb{R}^{n_2} contenant b et $g : V \rightarrow \mathbb{R}^{n_2-k_2}$ C^p avec $M_2 \cap V = g^{-1}(g(b))$. Soit $F : U \times V \rightarrow \mathbb{R}^{n_1-k_1} \times \mathbb{R}^{n_2-k_2}$

de classe C^p définie par $(x, y) \mapsto (f(x), g(y))$. On a $(M_1 \times M_2) \cap (U \times V) = (M_1 \cap U) \times (M_2 \cap V) = f^{-1}(f(a)) \times g^{-1}(g(b)) = F^{-1}(f(a), g(b))$. Vérifions que F est une submersion en (a, b) . Sa jacobienne s'écrit de façon diagonale par blocs par $JF(a, b) = \text{Diag}(Jf(a), Jg(b))$. Elle est de rang $n_1 - k_1 + n_2 - k_2$. Ceci conclut la preuve de la propriété. ■

2.1.2 Espace tangent en un point d'une sous-variété

Définition. (Courbe tracée sur une surface)

Soit M une partie de \mathbb{R}^n , $a \in M$. Une courbe de classe C^p passant par a , tracée sur M (ou le long de M) est une application $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe C^p tel que $\gamma(0) = a$ et $\forall t \in]-\varepsilon, \varepsilon[, \gamma(t) \in M$.

Définition. (Vecteur tangent à une partie en un point)

Soit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ une sous-variété de dimension k . Soit $a \in M$. Un vecteur $v \in \mathbb{R}^n$ est tangent à M au point a s'il existe une courbe γ tracée sur M , passant par a , dérivable en 0, telle que $\gamma'(0) = v$.

Pour une variété de classe C^p , on impose que γ soit C^1 sur son ensemble de définition.

Cette définition diffère très légèrement de la notion de vecteur tangent à un autre en un point du calcul différentiel général.

Définition. (Espace tangent à une sous-variété en un point)

Soit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ une sous-variété. On appelle *espace tangent* à M au point a , et l'on note $T_a M$, l'ensemble des vecteurs $v \in \mathbb{R}^n$ tangents à M en a .

Théorème. (Structure de l'espace tangent à une sous-variété en un point)

Soit M une sous-variété de \mathbb{R}^n de dimension k en $a \in M$, $T_a M$ est un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^n , de dimension $k = \dim_a(M)$.

En bonus : pour chaque façon de définir M au voisinage de a , il est caractérisé ainsi :

1. (Submersion) Pour U ouvert de \mathbb{R}^n , $a \in U$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ une submersion en a avec $M \cap U = f^{-1}(f(a))$, alors $T_a M = \ker(df(a))$.
2. (Redressement local) Pour U ouvert de \mathbb{R}^n , $a \in U$, $\psi : U \rightarrow V$ ouvert de \mathbb{R}^n , C^p difféomorphisme avec $\psi(U \cap M) = V \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$. On a $T_a M = d\psi(a)^{-1}(\mathbb{R}^k \times \{0\})$.
3. (Paramétrisation locale) Pour Ω ouvert de \mathbb{R}^k , $0 \in \Omega$, $g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ avec $g(0) = a$ une immersion en 0 et un homéomorphisme sur un voisinage de a dans \mathbb{R}^n , on a : $T_a M = dg(0)(\mathbb{R}^k) = \text{Im}(dg(0))$.
4. (Graphe) Pour $M \cap (U_1 \times U_2) = \text{Graphe}(\varphi)$, $\varphi : U_1 \rightarrow U_2$ C^p , $a = (a_1, a_2) \in U_1 \times U_2$, alors $T_a M = \text{Graphe}(d\varphi(a_1))$.

▷ On se place dans le deuxième cadre, plus commode. Soit γ une courbe C^1 tracée sur M passant par a . Alors pour $|t|$ assez petit, $\gamma(t) \in U \cap M$, et l'on peut poser $\tilde{\gamma}(t) = \psi \circ \gamma(t)$ de $] -\varepsilon', \varepsilon' [$ dans $V \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$. Alors $\tilde{\gamma}$ est différentiable en 0 et $\tilde{\gamma}'(0) = d\psi(\gamma'(0)) = d\psi(a)(\gamma'(0)) \in \mathbb{R}^k \times \{0\}$. Ainsi, pour tout $v \in T_a M$, $d\psi(a)(v) \in \mathbb{R}^k \times \{0\}$, soit $v \in d\psi(a)^{-1}(\mathbb{R}^k \times \{0\})$. Montrons que $T_a M = d\psi(a)^{-1}(\mathbb{R}^k \times \{0\})$; il suffit d'avoir l'inclusion réciproque. Soit $w \in \mathbb{R}^k \times \{0\}$, et $c(t) = tw$. Pour $|t|$ assez petit, $c(t) \in V(\mathbb{R}^k \times \{0\})$ ouvert, donc $\psi(c(t)) = \gamma(t)$ est une courbe de classe C^p , passant par a tracée sur M . De plus, $\gamma'(0) = d\psi^{-1}(c'(0))(c'(0)) = d\psi^{-1}(0)(w)$. Or $\psi^{-1} \circ \psi = \text{id}$ et $\psi(a) = 0$, d'où $d\psi^{-1}(\psi(a)).d\psi(a) = \text{id}$, d'où $d\psi^{-1}(0) = d\psi(a)^{-1}$, soit $\gamma'(0) = d\psi(a)^{-1}(w)$, d'où le résultat par image réciproque d'une application linéaire. La dimension vient immédiatement par cette caractérisation.

Montrons la première caractérisation. Soit $\gamma :] -\varepsilon, \varepsilon [\rightarrow M$ tracée sur M passant par a , avec $M \cap U = f^{-1}(f(a))$. Alors pour tout t , $f(\gamma(t)) = f(a)$ est constante. La fonction $f \circ \gamma :] -\varepsilon, \varepsilon [\rightarrow \mathbb{R}^n$ est différentiable en 0, avec $df(a)(\gamma'(0)) = 0$. Ainsi, pour tout $v \in T_a M$, $df(a)(v) = 0$. Ainsi $T_a M \subseteq \ker(df(a))$, tous deux de dimension k , d'où l'égalité.

Soit $\omega \in \mathbb{R}^k$, pour $|t|$ assez petit, $t\omega \in \Omega$. Posons $\gamma(t) = g(t\omega) \in M \cap U$ avec $\gamma(0) = g(0) = a$. Alors $\gamma'(0) = dg(0)(\omega) \in T_a M$ existe, ainsi $\text{Im}(dg(0)) \subseteq T_a M$ d'où l'égalité par égalité des dimensions.

Pour la caractérisation avec le graphe local, c'est laissé en exercice. ■

Exercice 2

Retrouver à la main que tout vecteur de \mathbb{R}^n est tangent à tout point d'un ouvert fixé de \mathbb{R}^n .

▷ Éléments de réponse.

On le sait, car un ouvert est de codimension nulle. Retrouvons-le. Soit U un ouvert de \mathbb{R}^n , $u \in U$ et $w \in \mathbb{R}^n$. Montrons que w est tangent à U en u . Il suffit de considérer le chemin $c(t) = wt + u$ qui vérifie : $c(0) = u$, $c'(0) = w$, et dans U pour t assez petit (car u est intérieur à U).

2.1.3 Fibré tangent

Définition. (Fibré tangent à une sous-variété)

Soit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ une sous-variété de dimension k , de classe C^p . On note $TM = \bigcup_{a \in M} \{a\} \times T_a M = \{(a, v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, a \in M, v \in T_a M\}$ réunion disjointe, le *fibré tangent* à M . On introduit alors l'application $M : TM \rightarrow M$ définie par $(a, v) \mapsto a$.

Théorème. (Structure du fibré tangent)

Sous les hypothèses précédentes, TM est une sous-variété de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ de classe C^{p-1} et de dimension $2k$.

▷ Soit $(a, v) \in TM$. On utilise la définition par submersion. Il existe un ouvert U de \mathbb{R}^n contenant a , $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ une submersion en a telle que $U \cap M = f^{-1}(f(a))$. Alors $TM \cap (U \times \mathbb{R}^n) =$

$\{(b, w) \in U \times \mathbb{R}^n, f(b) = f(a), w \in T_b M = \ker(df(b))\}$. On considère l'application de $U \times \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^{n-k} \times \mathbb{R}^{n-k}$, notons là F , qui à (x, w) fait correspondre $(f(x), df(x)(w))$, de classe C^{p-1} . Alors $F^{-1}(f(a), 0) = \{(b, w) \in U \times \mathbb{R}^n, b \in M \cap U, w \in T_b M\} = TM \cap (U \times \mathbb{R}^n)$. Montrons que F est une submersion en (x, v) (en fait, en tout point par linéarité). Alors la matrice triangulaire par blocs $JF(a, 0) = (Jf(a), 0; *, Jf(a))$ est de rang $n - k + n - k = 2n - 2k$. ■

Remarque. On a introduit l'application $\Pi : TM \rightarrow M$ qui à $(a, v) \mapsto a$. C'est la restriction à TM de l'application première projection de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Elle est donc C^p .

2.1.4 Fibré co-tangent

2.1.5 Notion de transversalité

Définition. (Sous-variétés transverses)

Soient M_1, M_2 des sous-variétés de \mathbb{R}^n , $x \in M_1 \cap M_2$. On dit que M_1 et M_2 sont *transverses* en x si :

$$T_x M_1 + T_x M_2 = \mathbb{R}^n.$$

Exemple. (Sous-variétés transverses)

Deux courbes sécantes sont transverses dans le plan.

Théorème. (Intersection de sous-variétés transverses)

Soient M_1, M_2 deux sous-variétés de \mathbb{R}^n , de classe C^p . On suppose que M_1 et M_2 sont transverses en tout point $x \in M_1 \cap M_2$. Alors $M_1 \cap M_2$ est une sous-variété de \mathbb{R}^n de classe C^p , de dimension $\dim(M_1) + \dim(M_2) - n$. De plus pour tout $x \in M_1 \cap M_2$, $T_x(M_1 \cap M_2) = (T_x M_1) \cap (T_x M_2)$.

▷ On utilise la définition par submersion. Moralement, $U_1 \cap U_2$ sera définie par la réunion des équations définissant les deux sous-variétés. Soit $x \in M_1 \cap M_2$. Il existe un ouvert de \mathbb{R}^n , U_i pour $i = 1, 2$ tel que $U_i \cap M_i = f_i^{-1}(f_i(x))$ où $f_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^{n-k_i}$, $k_i = \dim(M_i)$, est une submersion en x . Soit $F : U_1 \cap U_2 \rightarrow \mathbb{R}^{n-k_1} \times \mathbb{R}^{n-k_2}$ qui à $y \mapsto (f_1(y), f_2(y))$. Alors F est de classe C^p , et $F^{-1}(f_1(x), f_2(x)) = f_1^{-1}(f_1(x)) \cap f_2^{-1}(f_2(x)) = M_1 \cap M_2 \cap U_1 \cap U_2$. Montrons que F est submersion en x . On calcule : $dF(y)(h) = (df_1(y)(h), df_2(y)(h))$, d'où $\ker(dF(y)) = \ker(df_1(y)) \cap \ker(df_2(y))$, d'où $\text{rg}(dF(y)) = n - \dim(\ker(df_1(y)) \cap \ker(df_2(y)))$. D'après la formule de Grassmann, puisqu'ici $\ker(df_i(y)) = T_y M_i$, on a $\text{rg}(dF(y)) = n - (\dim(T_y M_1) + \dim(T_y M_2) - \dim(T_y M_1 + T_y M_2)) = (n - \dim(T_y M_1)) + (n - \dim(T_y M_2)) = n - k_1 + n - k_2$ par hypothèse, ce dernier terme étant n . D'où F submersion. La propriété pour l'intersection vient de la preuve. ■

2.1.6 Applications différentiables sur des sous-variétés

Définition. (Application différentiable sur une sous-variété)

Soient $N \subseteq \mathbb{R}^n$ et $M \subseteq \mathbb{R}^m$ des sous-variétés de classe C^k . Soit $f : M \rightarrow N \subseteq \mathbb{R}^n$. On dit que f est *différentiable* (resp. *de classe C^p , $p \leq k$*) en $a \in M$ s'il existe un ouvert U de \mathbb{R}^m , $a \in U$, $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ différentiable (resp. de classe C^p) telle que $f|_{U \cap M} = F|_{U \cap M}$ avec $F(U \cap M) \subseteq N$; on dit alors que F est un *prolongement local* au voisinage de a de l'application f .

On dit que f est *différentiable* (resp. *de classe C^p*) si elle l'est en tout point.



La fonction F peut changer selon le point! (Mais ce n'est pas obligatoire bien sûr.)

→ **Convention.** Dans la suite, on énoncera systématiquement les résultats pour la classe C^p pour $p \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Il va de soi qu'ils restent vrai en remplaçant toujours cette condition par *différentiable*, si tant est que l'on change partout.

Définition. (Différentielle d'une application sur une sous-variété)

Soit $f : M_1 \rightarrow M_2$ de classe C^p en $a \in M_1$, M_1 une sous-variété de \mathbb{R}^{n_1} , M_2 une sous-variété de \mathbb{R}^{n_2} . On appelle *différentielle de f en a* , et l'on note $df(a)$, ou comme d'habitude, l'application $T_a M_1 \rightarrow T_{f(a)} M_2$ définie ainsi : si $v \in T_a M_1$, $v = \gamma'(0)$ où $\gamma(0) = a$, γ une courbe tracée sur M passant par a , alors $f \circ \gamma$ est une courbe tracée sur M_2 passant par $f(a)$ et l'on pose $df(a)(v) = (f \circ \gamma)'(0)$, autrement dit $df(a) = dF(a)|_{T_a M_1}$.



Ceci a un sens et se vérifie. En effet, le fait que f soit C^p en a signifie qu'il existe un prolongement local F de f sur un ouvert U de \mathbb{R}^{n_1} contenant a , avec donc : $F|_{U \cap M_1} = f|_{U \cap M_1}$. Ainsi $F \circ \gamma = f \circ \gamma$ sur un intervalle $] - \varepsilon', \varepsilon[$ assez petit car par continuité de γ en zéro, $\gamma(] - \varepsilon', \varepsilon[) \in U$ pour tout $\varepsilon < \varepsilon'$ certain.

Mais $F \circ \gamma$ est dérivable au sens usuel en zéro, avec par dérivation des fonctions composées $(F \circ \gamma)'(0) = dF(\gamma(0))(\gamma'(0)) = dF(a)(v) = dF_{T_a M_1}(a)(v) =: df(a)(v)$ et ceci ne dépend que de $v = \gamma'(0)$ et non du chemin γ . De plus, cela ne dépend pas du choix du prolongement local F , car si G est un autre prolongement local sur un ouvert V contenant a sur $U \cap V$, $F = G = f$ pour $|t|$ assez petit, d'où $F(\gamma(t)) = f(\gamma(t)) = G(\gamma(t))$, donc les dérivées au voisinage de zéro de $t \mapsto F(\gamma(t))$ et $t \mapsto G(\gamma(t))$ seront toutes deux les dérivées de la même fonction $t \mapsto f(\gamma(t))$ donnée par $df(a)(\gamma'(0)) = dF(a)(\gamma'(0)) = dG(a)(\gamma'(0))$ où $df(a) \in \mathcal{L}(T_a M_1, T_{f(a)} M_2)$, où $dF(a), dG(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{n_1}, \mathbb{R}^{n_2})$.



La notion de caractère C^p , C^∞ est **locale**!

On dispose de la propriété suivante qui permet le calcul des différentielles comme on aime.

Théorème. (Composition des différentielles sur une sous-variété)

Soient $f : M_1 \rightarrow M_2$, $g : M_2 \rightarrow M_3$, M_1, M_2, M_3 des sous-variétés d'espaces euclidiens. On suppose f différentiable en a (resp. C^p), g différentiable en $f(a)$ (resp. C^p), alors $g \circ f : M_1 \rightarrow M_3$ est différentiable en a (resp. C^p), et

$$d(g \circ f)(a) = dg(f(a)) \circ df(a) : T_a M_1 \rightarrow T_{g \circ f(a)} M_3.$$

▷ On prend F un prolongement local de f sur $U \ni a$ et G un prolongement local de g sur $V \ni f(a)$, quitte à restreindre à $F(U) \subseteq V$. ■

2.1.7 Calcul d'extrema

Définition. (Extremum local)

Soit M un espace topologique, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ a un *maximum* (resp. un *minimum*) local en un point $a \in M$ tel qu'il existe U un voisinage ouvert de a tel que $f|_U$ possède en a un maximum (resp. un minimum).

Un extrémum local est un maximum local ou un minimum local.

Théorème. (Théorème de Fermat sur les sous-variétés)

Soit M une sous-variété de \mathbb{R}^n et $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable. Si en $a \in M$, f possède un extrémum local, alors $df(a) = 0$ où l'on rappelle $df(a) : T_a M \rightarrow \mathbb{R}$.

▷ Soit $v \in T_a M$. Il existe $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow M \subseteq \mathbb{R}^n$ une courbe passant par a telle que $\gamma'(0) = v$. Alors $df(a)(v) = \frac{d}{dt} f \circ \gamma(t)|_{t=0}$. On considère $f \circ \gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow \mathbb{R}$. Si a est un extrémum local, il existe un ouvert U de M tel que $f|_U$ a un extrémum en a . On peut prendre ε assez petit pour que $\gamma(]-\varepsilon, \varepsilon[) \subseteq U$. Alors $f \circ \gamma$ possède un extrémum en $t = 0$. Le théorème de Rolle dit : $(f \circ \gamma)'(0) = 0$, i.e. $df(a)(\gamma'(0)) = df(a)(v) = 0$. Si on pense en terme d'un prolongement local de F au voisinage V de a dans \mathbb{R}^n , $df(a) = dF(a)_{T_a M} = 0$. ■

Notons que ce théorème, contrairement à la définition ci-dessus, n'aurait aucun sens si l'on ne se plaçait pas sur une sous-variété de l'espace \mathbb{R}^n , et seulement sur une partie.

On peut également faire de l'optimisation sous contraintes.

Théorème. (Généralisation du théorème des extrema liés)

Soit M une sous-variété de \mathbb{R}^n , $U = V \cap M$ un ouvert de M , où V est un ouvert de \mathbb{R}^n . Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ C^1 , $a \in U$. On suppose que sur U , M est donnée par une submersion

$g = (g_1, \dots, g_{n-k}) \in C^p$ de $g : V \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ avec $M \cap V = g^{-1}(0)$ et que sur U , f est la restriction d'une application $F : V \rightarrow \mathbb{R} \in C^1$. Si a est un extremum local pour f , alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-k} \in \mathbb{R}$ telle que $dF(a) = \lambda_1 dg_1(a) + \dots + \lambda_{n-k} dg_{n-k}(a)$. Les λ_i correspondent aux *multiplicateurs de Lagrange*.

▷ Si a est un extrémum local, soit $df(a) = 0$, soit $dF(a)|_{T_a M} = 0$, on a vu que $T_a M = \ker(dg(a)) = \bigcap_{i=1}^{n-k} \ker(dg_i(a))$. Or $dg(a) = (dg_1(a), \dots, dg_{n-k}(a))$ et l'on sait ici que les $dg_i(a)$ sont indépendantes. Ainsi $\bigcap_{i=1}^{n-k} \ker(dg_i(a)) \subseteq \ker(dF(a))$, d'où par un résultat classique d'algèbre linéaire : $dF(a) \in \text{Vect}(dg_i(a))$. ■

Application. (Réduction des matrices symétriques)

On considère $M = S^{n-1}$ la sphère unité dans l'espace euclidien \mathbb{R}^n ; c'est une sous-variété donnée par la submersion $g(x) = \sum x_i^2 = \langle x, x \rangle$. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$, symétrique. On introduit la fonction $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \in C^\infty$ qui à $x \mapsto \langle Ax, x \rangle$; $f = F|_{S^{n-1}} : S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}, C^\infty$. Par compacité de S^{n-1} , f possède des extrémums. Soit $a \in S^{n-1}$ extremum. Il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $dF(a) = \lambda dg(a)$. Or $dg(a)(h) = 2\langle a, h \rangle$, d'où $dF(a)(h) = 2\langle Aa, h \rangle$, d'où $Aa = \lambda a$ d'où l'existence d'un vecteur propre pour A . Le reste suit avec la preuve usuelle.

2.1.8 Difféomorphismes entre sous-variétés

Définition. (Difféomorphismes entre sous-variétés)

Avec les notations évidentes :

1. $f : M_1 \rightarrow M_2$ est un C^p -difféomorphisme si f est C^p , bijective et f^{-1} est C^p .
2. f est un C^p -difféomorphisme local en $a \in M$, il existe U un voisinage ouvert de a dans M_1 tel que $f(U)$ soit un voisinage ouvert de $f(a)$ dans M_2 et $f : U \rightarrow f(U)$ soit un C^p -difféomorphisme.
3. f est un *difféomorphisme local* si c'est un difféomorphisme local en chaque point.

On voit que tout difféomorphisme est un homéomorphisme.

Propriétés

Si $f : M_1 \rightarrow M_2$ est un difféomorphisme local en a , alors $df(a) : T_a M_1 \rightarrow T_{f(a)} M_2$ est un isomorphisme d'espace vectoriel et $df(a)^{-1} = df^{-1}(f(a))$. En particulier $\dim M_1 = \dim M_2$.

Théorème. (Image par un difféomorphisme d'une sous-variété)

Soit M une sous-variété de \mathbb{R}^n , U, V des ouverts de \mathbb{R}^n et $\phi : U \rightarrow V$ un difféomorphisme. On suppose $U \cap M \neq \emptyset$. Alors $\phi(U \cap M)$ est une sous-variété de \mathbb{R}^n et si $a \in U \cap M$, $T_{\phi(a)}(\phi(U \cap M)) = d\phi(a)(T_a M)$.

▷ On utilise la caractérisation par paramétrisation locale pour avoir directement l'identité sur les espaces tangents. Si $a \in U \cap M$, $b = \phi(a)$, on veut une paramétrisation locale de $\phi(U \cap M)$ au voisinage de b . Pour a dans M , il existe W un voisinage ouvert de a dans \mathbb{R}^n et Ω un voisinage ouvert de 0 dans \mathbb{R}^k , où $k = \dim(M)$ par la remarque précédente, et $g : \Omega \rightarrow W$ une immersion, avec $g(0) = a$ telle que g induit un homéomorphisme de Ω sur $g(\Omega) = W \cap M$. Pour $\phi : U \rightarrow V$, on regarde $\phi|_{U \cap W}$: c'est un difféomorphisme sur un ouvert V' de \mathbb{R}^n . Alors $\Omega' = g^{-1}(U \cap W)$ est un ouvert $\subseteq \Omega$. On regarde $\phi \circ g : \Omega' \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\phi \circ g(0) = \phi(a) = b$; c'est une immersion. C'est un homéomorphisme sur son image. $\phi \circ g(\Omega') = \phi(U \cap W \cap M)$, $g(\Omega') = U \cap W \cap M$. Ainsi $\phi \circ g(\Omega') = \phi(U \cap W \cap (U \cap M)) = \phi(U \cap M) \cap V'$, i. e. $\phi \circ g$ est une paramétrisation de $\phi(U \cap M)$ et le théorème est démontré. ■

2.1.9 Cartes locales, atlas

Cette section permet de cerner mieux la nature abstraite des objets que l'on manipule. On introduit la notion de carte.

Définition. (Carte locale)

Soit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ une sous-variété C^p et $\dim(M) = k$, soit $a \in M$. Une *carte locale* de M au voisinage de a est un couple (U, ϕ) avec U ouvert de M contenant a et $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}^k$ un difféomorphisme sur un ouvert de \mathbb{R}^k . On dit de plus que la carte est *centrée* en a si $\phi(a) = 0$.

L'idée fondamentale est qu'**au voisinage de chaque point, une variété ressemble à un ouvert de l'espace euclidien**, au sens des difféomorphismes. En effet, la propriété suivante assure que les cartes locales existent toujours pour les sous-variétés.

Propriété. (Construction de cartes locales sur des sous-variétés)

On reprend les notations précédentes.

1. Supposons que M est donnée au voisinage de a par redressement local : il y a U ouvert de \mathbb{R}^n , $a \in U$, V un ouvert de \mathbb{R}^n , $0 \in V$, $\phi : U \rightarrow V$ un C^p -difféomorphisme tel que $\phi(U \cap M) = V \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$. Soit $\Pi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ la projection sur le premier facteur de la décomposition $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{n-k}$. Alors $\psi = \Pi \circ \phi : U \cap M \rightarrow \mathbb{R}^k$ de classe C^p et $\psi|_{U \cap M}$ est une carte locale.
2. Supposons M donnée par paramétrisation locale au voisinage de a . On a Ω un

ouvert de \mathbb{R}^k , $0 \in \Omega$, U un ouvert de \mathbb{R}^n , $a \in U$ et $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ une immersion avec $\phi(0) = a$ un homéomorphisme de Ω sur $\phi(\Omega) = U \cap M$. Alors il existe $U' \subseteq U$ ouvert contenant a tel que $\phi^{-1} : U' \cap M \rightarrow \mathbb{R}^k$ est une carte locale.

En particulier, toute variété admet des cartes locales en tout point, en particulier, un atlas. (C'est ce qui permet de définir la notion générale de variété en mathématiques.)

▷ L'application $\Pi_{|\mathbb{R}^k \times \{0\}} : \mathbb{R}^k \times \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^k$ est bijective, d'inverse $i : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$ donnée par $(x_1, \dots, x_k) \mapsto (x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)$. Alors $\phi^{-1} \circ i$ est l'inverse de ψ .

Il faut que quitte à restreindre ϕ^{-1} à un sous-ouvert de $U \cap M$, elle soit C^p . Puisque ϕ est une immersion, on utilise sa forme canonique. Il existe $\Omega' \subseteq \Omega$ un ouvert, $U' \subseteq U$ un ouvert et $\theta : \Omega' \rightarrow V$ un difféomorphisme tel que $\theta \circ \phi(x) = (x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)$, $x \in \Omega'$. Soit $\Pi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ la projection sur les k premières coordonnées. Alors $\Pi \circ \theta \circ \phi(x) = x$ pour tout $x \in \Omega'$. Ainsi $\phi^{-1} = \Pi \circ \theta$ sur $\phi(\Omega')$ ouvert de $U \cap M$, donc de la forme $U' \cap M$ donc de classe C^p car θ est C^p . ■

Seulement, il n'est pas toujours aisé de les construire.

Exemple fondamental. (Cartes locales : cas de la sphère. Projections stéréographiques)

Soit $S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ la sphère unité. On considère les projections stéréographiques sur le plan équatorial par rapport respectivement aux pôles nord et sud : $\phi_N(M) = \mathbb{R}^n \cap (NM)$ de $S^n \setminus \{N\}$ dans \mathbb{R}^n , donnée par

$$\phi_N(x_1, \dots, x_{n+1}) = \left(\frac{x_1}{1-x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1-x_{n+1}} \right),$$

et $\phi_S(M) = \mathbb{R}^n \cap (SM)$ de $S^n \setminus \{S\}$ dans \mathbb{R}^n , donnée par

$$\phi_S(x_1, \dots, x_{n+1}) = \left(\frac{x_1}{1+x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1+x_{n+1}} \right).$$

Alors ϕ_N, ϕ_S sont des cartes locales : elles sont C^∞ , bijectives, de réciproques :

$$\phi_N^{-1}(x_1, \dots, x_n) = \left(\frac{2x_1}{\|x\|^2+1}, \dots, \frac{2x_n}{\|x\|^2+1}, \frac{\|x\|^2-1}{\|x\|^2+1} \right)$$

et

$$\phi_S^{-1}(x_1, \dots, x_n) = \left(\frac{2x_1}{\|x\|^2+1}, \dots, \frac{2x_n}{\|x\|^2+1}, -\frac{\|x\|^2-1}{\|x\|^2+1} = \frac{1-\|x\|^2}{\|x\|^2+1} \right).$$

On peut lire la régularité sur les cartes locales.

Théorème. (Caractérisation de la différentiabilité par les cartes locales)

Soit $M_i \subseteq \mathbb{R}^{n_i}$ une sous-variété C^p de dimension k_i pour $i = 1, 2$. On suppose que l'application $f : M_1 \rightarrow M_2$ est différentiable (resp. C^p) en $a \in M$. S'il existe une carte locale (U, ϕ) en a ($\phi(U) \subseteq \mathbb{R}^{k_1}$) et $q = f \circ \phi^{-1} : \phi(U) \rightarrow \mathbb{R}^{n_2}$ est différentiable en $\phi(a)$ (resp. C^p au voisinage de $\phi(a)$), alors pour toute autre carte locale (U', ϕ') ,

$f \circ \varphi'^{-1} : \varphi'(U) \longrightarrow \mathbb{R}^{n_2}$ différentiable en a .

Définition. (Atlas)

Soit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ une sous-variété. Un *atlas* de M est une famille $(U_i, \varphi_i)_{i \in I}$ de cartes locales telles que $M = \bigcup_{i \in I} U_i$.

Exemple. (Atlas : cas de la sphère)

L'exemple précédent convient.

On peut reformuler le théorème suivant en termes d'atlas.

Théorème. (Caractérisation de la différentiabilité grâce à un atlas)

Soit M_i une sous-variété de \mathbb{R}^{n_i} , pour $i = 1, 2$ et $(U_j, \varphi_j)_{j \in J}$ un atlas de M_1 . Alors $f : M_1 \longrightarrow M_2$ est différentiable (resp. C^p) ssi pour tout j , $f \circ \varphi_j^{-1} : \varphi_j(U_j) \longrightarrow \mathbb{R}^{n_2}$ est différentiable (resp. C^p) (au sens connu).

Exemple. (Prolongement C^∞ d'un polynôme au compactifié d'Alexandrov)

Soit $P : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ une application polynomiale explicitement donnée par $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$.

On a $\hat{\mathbb{C}} = S^2$. On veut prolonger P à S^2 en utilisant les projections stéréographiques. On identifie $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$ le plan équatorial.

Ici, $\phi_N(z, t) = \frac{z}{1-t}$, $\phi_S(z, t) = \frac{z}{1+t}$ et $\phi_N^{-1}(z) = \left(\frac{2z}{|z|^2+1}, \frac{|z|^2-1}{|z|^2+1} \right)$, $\phi_S^{-1}(z) = \left(\frac{2z}{|z|^2+1}, \frac{1-|z|^2}{1+|z|^2} \right)$.
Remarquons que $\phi_N \circ \phi_S^{-1}(z) = \frac{1}{z}$.

On définit l'application $f : S^2 \longrightarrow S^2$ sur $S^2 \setminus \{N\}$ définie par $f = \phi_N^{-1} \circ P \circ \phi_N$ et $f(N) = N$. Cette application f est C^∞ : il suffit de voir que $f \circ \phi_N^{-1}$ et $f \circ \phi_S^{-1}$ sont C^∞ , ce qui est donc clair d'après le remarque.

2.1.10 Généralisation des théorèmes fondamentaux

On peut généraliser aux sous-variétés les théorèmes d'inversion locale et globale.

Théorème. (Inversion locale, inversion globale)

Soit $M_1 \subseteq \mathbb{R}^{n_1}$, $\dim(M_1) = k$; $M_2 \subseteq \mathbb{R}^{n_2}$, $\dim(M_2) = k$. Soit $f : M_1 \longrightarrow M_2$ C^p .

1. Soit $a \in M_1$, tel que $df(a) : T_a M_1 \longrightarrow T_{f(a)} M_2$ soit un isomorphisme linéaire. Alors f est un difféomorphisme local au voisinage de a .
2. Si pour tout $a \in M_1$, $df(a) : T_a M_1 \longrightarrow T_{f(a)} M_2$ est un isomorphisme, alors f est un C^p -difféomorphisme local, et si de plus f est injective, f est un C^p -

difféomorphisme de M_1 sur son image.

▷ On utilise des cartes locales et on se ramène au résultat classique entre ouverts de \mathbb{R}^k . ■

2.2 Variétés différentielles

Nous allons maintenant généraliser la notion de variété en topologie qui ne se plonge pas dans l'espace euclidien. L'idée est de reprendre la notion de carte locale pour paramétrer l'espace topologique localement et faire du calcul différentiel sur l'image.

2.2.1 Notion de variété topologique

Définition. (Variété topologique)

Une *variété topologique (sans bord)* de dimension k est un espace topologique séparé, à base dénombrable, tel que tout point possède un voisinage homéomorphe à un ouvert de \mathbb{R}^k .

Remarques.

1. Toute variété topologique est donc localement compacte, localement connexe par arcs, et donc connexe si et seulement si elle est connexe par arcs. Elle est aussi localement métrisable et donc à base dénombrable de voisinages.
2. On peut montrer (mais c'est dur) que toute variété topologique paracompacte est métrisable. Ainsi, on s'autorise à démontrer la séparabilité au lieu de l'existence d'une base dénombrable dans la pratique.
3. De même que pour les sous-variétés, il y a unicité de la dimension en un point pour une variété topologique générale grâce au théorème de Brouwer : quitte à considérer l'intersection de deux voisinages, on obtiendrait un homéomorphisme entre la boule unité de \mathbb{R}^{k_1} et la boule unité de \mathbb{R}^{k_2} .

Si de plus l'espace topologique est connexe, il y a unicité de la dimension de la variété topologique (la preuve est la même que dans le cas différentiel : on considère pour voisinage du point a , la restriction du voisinage de la définition à un ouvert contenant ce point qui est alors voisinage de chacun de ses points). En particulier, la dimension est constante sur chaque composante connexe.

Exemples. (Variétés topologiques)

1. Une sous-variété de \mathbb{R}^n de dimension k est une variété topologique.

▷ Cela vient des cartes locales qui sont des difféomorphismes \mathbb{C}^p , donc a fortiori bicontinues. ■

2. L'espace projectif $\mathbb{P}^n(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^{n+1}/(u \sim v \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}^* v = \lambda u)$ est une variété topologique.

▷ On sait en effet que $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$, muni de la topologie quotient, est compact donc séparé. Prenons pour $i \in \{1, \dots, n+1\}$, $V_i = \{v = (v_1, \dots, v_{n+1}), v_i \neq 0\}$ ouvert de $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, et $U_i = p(V_i)$ où p est la projection canonique. Alors l'application de U_i dans \mathbb{R}^n qui à $[v_1, \dots, v_{n+1}] \mapsto (\frac{v_1}{v_i}, \dots, \frac{v_{i-1}}{v_i}, \dots, \frac{v_{n+1}}{v_i})$ est un homéomorphisme, en effet, sa réciproque est $(t_1, \dots, t_n) \mapsto [t_1, \dots, t_{i-1}, 1, \dots, t_n]$. Les V_i recouvrent $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$. Ainsi $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ est une variété topologique de dimension n . On conseille au lecteur de montrer l'injectivité et la surjectivité de ces applications indépendamment de ce qu'elles sont réciproques afin de se refamiliariser avec l'espace projectif. ■

Comme on sait, pour $n \geq 2$, l'espace projectif ne se plonge pas dans aucun espace euclidien. Pourtant, c'est une variété topologique, et l'on va pouvoir y faire du calcul différentiel.

Propriété. (Stabilité topologique de la notion de variété)

Soient X, Y deux espaces topologiques homéomorphes. Alors X est une variété topologique si et seulement si Y est une variété topologique. De plus, ils ont la même dimension.

Définition. (Carte locale sur une variété topologique)

Soit M une variété topologique de dimension k . Une *carte locale* est un couple (U, φ) où U est un ouvert de M et φ un homéomorphisme de U sur un ouvert de \mathbb{R}^k .

Définition. (Atlas d'une variété topologique)

Soit M une variété topologique de dimension k . Un *atlas* de M est une famille $(U_i, \varphi_i)_{i \in I}$ de cartes locales de M telles que $\bigcup_{i \in I} U_i = M$.

Définition. (Changement de cartes)

Soit M une variété topologique de dimension k et $(U, \varphi), (V, \psi)$ deux cartes locales avec $U \cap V \neq \emptyset$. L'application $\psi \circ \varphi^{-1}_{|_{\varphi(U \cap V)}} : \varphi(U \cap V) \longrightarrow \psi(U \cap V)$ est appelée *application de changement de cartes*.

Il est clair que c'est un homéomorphisme.

Exemples. (Cartes locales, atlas topologiques)

1. Les projections stéréographiques φ_N, φ_S de S^n définissent des cartes locales.

2. Dans $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$, les (U_i, φ_i) pour $1 \leq i \leq n + 1$ comme définies précédemment forment un atlas.

Définition. (Atlas, cartes compatibles)

Soit M une variété topologique de dimension k .

1. Deux cartes $(U, \varphi), (V, \psi)$ sont dites C^p -compatibles si soit $U \cap V = \emptyset$, soit l'application de changement de cartes $\psi \circ \varphi^{-1}$ est un C^p -difféomorphisme entre ouverts de \mathbb{R}^k .
2. Un atlas $(U_i, \varphi_i)_{i \in I}$ est dit de classe C^p , ou compatible, si toutes ses cartes sont deux à deux C^p -compatibles. Parfois, on parle simplement d'atlas.

Deux atlas sont dits compatibles s'ils sont tous deux de classe C^p et si toute carte de l'un est compatible avec toute carte de l'autre, autrement dit, si leur réunion est un atlas (de classe C^p , compatible).

À partir de maintenant, on dira atlas pour atlas compatible (avec lui-même), ou encore atlas de classe C^p .

Définition. (Atlas maximal)

Soit M une variété topologique de dimension k . Un atlas de classe C^p est dit maximal si toute carte C^p -compatible avec toutes les (U_i, φ_i) est déjà dans l'atlas.

Remarques.

1. Comme dit plus haut, si l'on a deux atlas de classe C^p tel que toute carte de l'un est C^p -compatible avec toute carte de l'autre, alors leur réunion est un atlas de classe C^p .
2. On peut définir une relation d'équivalence, définie par la compatibilité, sur l'ensemble des atlas d'une variété différentielle. Il n'est pas tout à fait évident que cette relation est transitive, et l'on pousse le lecteur à l'écrire proprement par clarté d'esprit.
3. Dans chaque classe d'équivalence, on peut privilégier un représentant donné par un atlas maximal, comme le précise le corollaire suivant du fait initial.

Corollaire

Tout atlas est contenu dans un unique atlas maximal.

▷ Il suffit de prendre la réunion de tous les atlas compatibles avec lui. Cet ensemble d'atlas est bien sûr un ensemble. ■

Remarque. Si (U, φ) est une carte de M et $V \subseteq U$ un ouvert alors $(V, \varphi|_V)$ est une carte C^p -compatible avec.

Ces définitions permettent d'introduire la notion suivante.

2.2.2 Notion de variété différentielle et applications différentiables sur des variétés différentielles

Définition. (Variété différentielle)

Soit M une variété topologique de dimension k . Une structure de *variété différentielle* de classe C^p sur M est la donnée d'un atlas maximal de cartes C^p -compatibles. On dit que la variété topologique a une structure différentielle.

Remarque importante. Pour se donner une telle structure, il suffit de se donner un atlas (pas nécessairement maximal) de cartes C^p -compatibles.

Exemples. (Cartes locales, atlas topologiques)

1. Les sous-variétés de \mathbb{R}^n , grâce aux cartes locales via paramétrage ou redressement, sont des variétés différentielles.
2. En particulier, la sphère S^n avec $(S^n \setminus \{N\}, \varphi_N)$, $(S^n \setminus \{S\}, \varphi_S)$ les projections stéréo admet une structure C^∞ , car $\varphi_N \circ \varphi_S^{-1}(y) = \frac{y}{\|y\|^2}$.
3. L'espace projectif $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ muni de l'atlas $(U_i, \varphi_i)_{1 \leq i \leq n+1}$ est une variété différentielle : le changement de cartes

$$\begin{aligned} \varphi_i(U_i \cap U_j) &\longrightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j) && \text{est } C^\infty. \\ (y_1, \dots, y_n) &\longmapsto \left(\frac{y_1}{y_j}, \dots, \frac{1}{y_j}, \dots, \frac{y_j}{y_j}, \dots, \frac{y_n}{y_j} \right) \\ &&& \text{i}^{\text{e position}} \end{aligned}$$

Définition. (Application de classe C^p sur une variété différentielle)

Soient M, N variétés différentielles de classe C^p . Une application $f : M \longrightarrow N$ est dite de classe C^p si elle est continue et pour tout $a \in M$, il y a une carte (U, φ) en a , i. e. $a \in U$, une carte (V, ψ) en $f(a)$ telle que l'application $\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap f^{-1}(V)) \longrightarrow \psi(V)$ est de classe C^p .

$$\begin{array}{ccc} a \in U \cap f^{-1}(V) & \xrightarrow{f} & V \ni (f(a)) \\ \varphi \downarrow \uparrow \varphi^{-1} & & \downarrow \psi \\ \varphi(U \cap f^{-1}(V)) & \longrightarrow & \psi(V) \end{array}$$

L'application $\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap f^{-1}(V)) \longrightarrow \psi(V)$ est appelée *application lue dans les cartes*.

Remarques.

1. Quitte à restreindre U , on peut supposer $f : U \rightarrow V$ (on utilise d'ailleurs la continuité de f pour avoir $f^{-1}(V)$ ouvert), et ainsi seulement dire dans la définition : il y a deux cartes [...] avec $f(U) \subseteq V$. Le diagramme devient alors :

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ \varphi(U) & \xrightarrow[\psi \circ f \circ \varphi^{-1}]{} & \psi(U) \end{array}$$

2. Grâce à la définition de variété différentielle (choix d'un atlas (compatible)), ceci ne dépend pas du choix des cartes (U, φ) et a et (V, ψ) en $f(a)$, explicitement : pour d'autres cartes (U', φ') en a et (V', ψ') en $f(a)$, $f(U') \subseteq V'$, $\psi' \circ f \circ \varphi'^{-1} : \varphi'(U') \rightarrow \psi'(V')$ sur $U \cap U'$, $\psi' \circ f \circ \varphi'^{-1} = \psi' \circ \psi'^{-1} \circ (\psi \circ f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \varphi'^{-1})$. Comme $\varphi \circ \varphi'^{-1}$ sur $\varphi'(U \cap U')$ et $\psi' \circ \psi'^{-1}$ sur $\psi(V \cap V')$ sont C^p , alors $\psi' \circ f \circ \varphi'^{-1}$ l'est aussi.

Ainsi, une application continue $f : M \rightarrow N$ est C^p si et seulement si l'application lue dans tous les couples de cartes est C^p (et il n'y a pas besoin d'avoir un atlas maximal).

Propriété. (Composition d'applications entre variétés différentielles)

Soient M, N, P des variétés différentielles de classe C^p . Soient $f : M \rightarrow N$, $g : N \rightarrow P$ des applications de classe C^p . Alors $g \circ f$ est de classe C^p .

▷ Soit $a \in M$, on dispose de $f(a) \in N$, $g \circ f(a) \in P$, (U, φ) carte en a , (V, ψ) carte en $f(a)$, (W, ξ) carte en $g \circ f(a)$, $f(U) \subseteq V$, $g(V) \subseteq W$,

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{f} & V & \xrightarrow{g} & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \varphi(U) & \xrightarrow[\psi \circ f \circ \varphi^{-1}]{} & \psi(V) & \xrightarrow[\xi \circ g \circ \psi^{-1}]{} & \xi(W) \end{array}$$

Ainsi $\xi \circ (g \circ f) \circ \varphi^{-1}$ est C^p par composée. ■

Soit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ une sous-variété C^p de dimension k ; on a vu que c'était une variété différentielle.

On dispose a priori de deux notions d'applications C^p entre sous-variétés de \mathbb{R}^n et \mathbb{R}^m :

- celle ci-dessus,
- celle donnée par l'existence d'un prolongement local.

Proposition

Ces deux notions sont les mêmes.

▷ S'il existe un prolongement local, alors il y a caractère C^p au sens ci-dessus. On peut tracer :

$$\begin{array}{ccc}
 U & \xrightarrow{f} & V \\
 \varphi \downarrow & & \downarrow \psi \\
 \varphi(U) & \longrightarrow & \psi(V)
 \end{array}$$

Mais U est un ouvert de M , donc s'écrit $U = M \cap U'$, avec U' un ouvert de \mathbb{R}^n , et par hypothèse il existe $F : U'' \rightarrow \mathbb{R}^m$ C^p sur l'ouvert de \mathbb{R}^n $U'' \supseteq U$ et $F|_U = f$. Alors $\psi \circ f \circ \varphi^{-1} = \psi \circ F \circ \varphi'$ est donc de caractère C^p au sens des variétés différentielles.

Inversement, si f est C^p au sens ci-dessus. On prend pour carte en a une carte donnée par redressement $\varphi : W \rightarrow \mathbb{R}^n$, W ouvert de \mathbb{R}^n , avec $\varphi(W \cap M) = \varphi(W) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$. On sait $f \circ \varphi^{-1}$ définie sur $\varphi(W) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$ et C^p . Soit $\Pi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k \times \{0\}$ la projection; alors $g = f \circ \varphi^{-1} \circ \Pi$ est définie sur $\varphi(W)$ et est C^p . On considère $F : W \rightarrow \mathbb{R}^m$; alors $F = (f \circ \varphi^{-1} \circ \Pi) \circ \varphi$ est C^p . Pour $x \in W \cap M$, $\varphi(x) \in \mathbb{R}^k \times \{0\}$, $\Pi \circ \varphi(x) = \varphi(x)$, $F(x) = f(x)$. ■



Souvent, on utilise des cartes centrées, i. e. (U, φ) carte en a avec $\varphi(a) = 0$.

Exemples. (Applications entre variétés différentielles)

1. Soit M une variété différentielle de dimension k et de classe C^p . Soit $U \subseteq M$ un ouvert. Alors U est une variété différentielle de dimension k et de classe C^p . En effet, si (U_i, φ_i) est un atlas de M , on prend les $(U \cap U_i, \varphi_i|_{U \cap U_i})$.
2. (Produit de variétés différentielles) Si M, N sont des variétés différentielles de classe C^p et de dimension k et l respectivement. Alors $M \times N$ est une variété différentielle de classe C^p , de dimension $k + l$, et les projections $M \times N \rightarrow M$, $M \times N \rightarrow N$ sont des applications de classe C^p .

En effet, soit (U_i, φ_i) atlas de M et (V_j, ψ_j) atlas de N ; alors $(U_i \times V_j, \varphi_i \times \psi_j)$ est un ouvert de $M \times N$ pour la topologie produit. On introduit $\varphi \times \psi_j : U_i \times V_j \rightarrow \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^l$ qui sont des homéomorphismes sur $\varphi_i(U_i) \times \psi_j(V_j)$. Les changements de carte $(\varphi_i^{-1} \circ \varphi_i) \times (\psi_j^{-1} \circ \psi_j)$ est un C^p difféomorphisme, car les composantes le sont.

Définition. (Difféomorphismes)

Soient M, N deux variétés différentielles de classe C^p . Soit $f : M \rightarrow N$ de classe C^p .

1. On dit que f est un difféomorphisme si f est bijective et $f^{-1} : N \rightarrow M$ est de classe C^p .
2. On dit que f est un difféomorphisme local au voisinage de a s'il existe un ouvert $U \ni a$ tel que $f|_U$ est un difféomorphisme sur son image.
3. Si f est un difféomorphisme local si c'est un difféomorphisme local au voisinage de tout point de M .

2.2.3 Sous-variété d'une variété différentielle

Définition. (Sous-variété différentielle)

Soit M une variété différentielle de classe C^p , de dimension k . On dit que $P \subseteq M$ est une *sous-variété (différentielle)* de M si pour tout $a \in P$, il y a une carte (U, φ) en a telle que $\varphi(U \cap P)$ est une sous-variété de \mathbb{R}^k , i. e. il y a une carte (U, φ) en a telle que $\varphi(U \cap P) = V \times (\mathbb{R}^p \times \{0\}) \subseteq \mathbb{R}^k$ où $\varphi(U) = V$.

Nota bene. Si (U, φ) est une carte $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^k$, et ψ un difféomorphisme, alors $(U, \psi \circ \varphi)$ est une carte.

Proposition

Une sous-variété d'une variété différentielle est une variété est une variété différentielle.

2.2.4 Variétés à bord

Définition. (Variété à bord)

Une *variété à bord* est un espace topologique séparé, à base dénombrable, tel que tout point admette un voisinage homéomorphe à un ouvert du demi-espace $\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, x_n \geq 0\}$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

2.2.5 Points réguliers, points critiques

Définition. (Point régulier, point critique, valeur régulière)

Soient M, N des variétés de classe C^p et de même dimension. Soit $f : M \rightarrow N$.

1. Un point $a \in M$ est dit *régulier*, s'il y a un ouvert $U \ni a$ tel que $f|_U$ est un difféomorphisme sur son image.
2. Un point qui n'est pas régulier est dit *point critique*.
3. Un point $b \in N$ est dit *valeur régulière* si pour tout $a \in f^{-1}(b)$, a est un point régulier. Par convention, si $b \notin f(M)$, on dit bien que c'est une valeur régulière.

Théorème. (Fibres d'une valeur régulière dans le cas compact)

Soient M, N deux variétés différentielles de classe C^p et de même dimension. On suppose M compacte. Soit $f : M \rightarrow N$ de classe C^p . Soit $y \in N$ une valeur régulière. Alors $f^{-1}(y)$ est de cardinal fini et il existe V un voisinage de y dans N tel que pour tout $z \in V$, $\text{card}(f^{-1}(z)) = \text{card}(f^{-1}(y))$.

▷ Si $y \notin f(M)$, $|f^{-1}(y)| = 0$. Or M est compacte, donc $f(M)$ est compacte, donc fermée dans N séparée. Donc $N \setminus f(M)$ est un ouvert qui contient y . Si maintenant y est valeur régulier avec $y \in f(M)$. Pour tout $x \in f^{-1}(y)$, x point régulier, il existe un ouvert U_x contenant x tel que $f|_{U_x} : U_x \rightarrow f(U_x)$

un difféomorphisme qui à $x \mapsto y$. Ceci dit que $f^{-1}(y)$ est un sous-espace topologique de M dont tous les points sont isolés : $U_x \cap f^{-1}(y) = \{x\}$. Mais $f^{-1}(y)$ est fermé, donc compact, car M est compact. Or, un ensemble discret et compact est fini, d'où le premier point.

Montrons que le cardinal de la fibre est localement constant. Quitte à les restreindre, on peut supposer U_{x_1}, \dots, U_{x_p} deux à deux disjoints. Ainsi $f(U_{x_1}), \dots, f(U_{x_p})$ sont des ouverts de N , donc leur intersection est un ouvert de N contenant y . En outre, $M \setminus \bigcup_{i=1}^n U_{x_i}$ est un fermé de M , donc compact. Ainsi $f(M \setminus \bigcup_{i=1}^p U_{x_i})$ est un compact de N , donc fermé. Ainsi, $N \setminus f(M \setminus \bigcup_{i=1}^p U_{x_i})$ est un ouvert de N contenant y . On prend $V = f(U_{x_1}) \cap \dots \cap f(U_{x_p}) \cap (N \setminus f(M \setminus \bigcup_{i=1}^p U_{x_i}))$ ouvert contenant y . Si $z \in V$, alors il n'a pas d'antécédent ailleurs que dans $\bigcup_{i=1}^p U_{x_i}$ et il en a exactement un dans chaque U_{x_i} , d'où $|f^{-1}(z)| = p$. ■

Curiosité. (Application : démonstration du théorème de d'Alembert-Gauss)

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant. Alors il induit une application surjective de $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$.

▷ On veut utiliser le théorème précédent ; pour cela, il faut se ramener au cas compact. Pour cela, on utilise le prolongement de P en une application C^∞ de $S^2 \rightarrow S^2$, notée f , telle que $f(N) = N$ et $f = \varphi_N^{-1} \circ P \circ \varphi_N$, où S^2 est compacte. Soit $a \in S^2$, $a \neq N$. Si $\varphi_N(a)$ n'est pas un zéro de P' , alors a est un point régulier de f . $\varphi_N, \varphi_N^{-1}$ sont des difféomorphismes. Si $P'(z) \neq 0$, $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ et le théorème d'inversion locale dit que c'est un difféomorphisme local en z . On cherche les valeurs critiques de f . Il n'y en a qu'un nombre fini, car P' n'a qu'un nombre fini de zéros : c'est un polynôme non nul. Soit donc C l'ensemble des valeurs critiques de f . On sait que sur $S^2 \setminus C$, $y \mapsto |f^{-1}(y)|$ est localement constante. Mais $S^2 \setminus C$ est connexe par arcs, car C est fini, donc cette application est constante. Donc cette valeur est la même pour toutes les valeurs régulières. En particulier le nombre d'antécédents d'un point de C n'est jamais 0. ■

Et voilà une preuve du théorème fondamental de l'algèbre grâce aux outils de la géométrie différentielle (et une de plus!).

2.2.6 Espace tangent en un point à une variété M

Soit $a \in M$, une variété différentielle de classe C^p . On considère des courbes $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow M$ tracées sur M avec $\gamma(0) = a$ de classe C^1 , i.e. ; il y a une carte (U, φ) en a (avec $\varphi(a) = 0$) tel que $\varphi \circ \gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow \varphi(U)$ soit C^1 au sens usuel.

On introduit une relation d'équivalence sur les courbes tracées sur M et passant par a : on dit que $\gamma_1 \sim \gamma_2$ s'il existe une carte (U, φ) en a (centrée) tel que $(\varphi \circ \gamma_1)'(0) = (\varphi \circ \gamma_2)'(0)$.

Ceci ne dépend pas du choix de la carte (U, φ) en a . Si (V, ψ) est une autre carte $(\psi \circ \gamma_1) = (\psi \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \gamma_1)$, alors $\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V)$ est C^p au sens usuel. Alors $(\psi \circ \gamma_1)'(0) = d(\psi \circ \varphi^{-1})(0) \cdot (\varphi \circ \gamma_1)'(0)$. On a ainsi une relation d'équivalence.

Définition. (Espace tangent à une variété différentielle)

L'espace tangent $T_a M$ est l'ensemble des classes d'équivalence de courbes tangentes en a pour la relation définie ci-dessus.

Théorème. (Structure de l'espace tangent à une variété différentielle)

Pour tout $a \in M$, $T_a M$ est un espace vectoriel de dimension $\dim(T_a M) = k = \dim(M)$.

▷ Munissons $T_a M$ d'une structure d'espace vectoriel. Soit (U, φ) une carte en a . On a une application $\theta_\varphi : T_a M \rightarrow \mathbb{R}^k$ qui à $v \mapsto (\varphi \circ \gamma)'(0)$ avec γ une courbe dont v est la classe. Peu importe φ grâce à la remarque précédente. On a ainsi une application injective. Montrons que θ_φ est bijective. Soit $w \in \mathbb{R}^k$. Alors $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ ouvert qui à $a \mapsto 0$ vérifie, pour ε assez petit, $\forall t \in]-\varepsilon, \varepsilon[$, $tw \in \varphi(U)$ et $\gamma(t) = \varphi^{-1}(tw) \in U \subseteq M$. γ est C^1 , car $\varphi \circ \gamma(t) = tw$ et l'on a $(\varphi \circ \gamma)'(0) = w$. Ainsi, on transporte la structure d'espace vectoriel de \mathbb{R}^k à $T_a M$ ainsi : pour $v, v' \in T_a M$, $\theta_\varphi^{-1}(\theta_\varphi(v) + \theta_\varphi(v')) =: v + v'$. Ceci ne dépend pas du choix de la carte (U, φ) si on prend (V, ψ) et θ_ψ . On a $\theta_\psi = d(\psi \circ \varphi^{-1})(0) \cdot \theta_\varphi$, puis : $\theta_\psi^{-1}(\theta_\psi(v) + \theta_\psi(v')) = \theta_\varphi^{-1}(d(\psi \circ \varphi^{-1})(0))^{-1} d(\psi \circ \varphi^{-1})(0) \cdot (\theta_\varphi(v) + \theta_\varphi(v'))$. Ainsi, cette définition est intrinsèque. ■

Remarques.

1. Soit U un ouvert de M . Alors $T_a U = T_a M$.
2. Soient M, N des variétés et $a \in M, b \in N$. $T_{(a,b)}(M \times N) = T_a M \times T_b N$.

Grâce à la notion d'espace tangent, on peut définir la différentielle d'une application C^p (oui!).

Définition. (Différentielle d'une application sur variété différentielle)

Soient M, N deux variétés de classe C^p et $f : M \rightarrow N$ C^p . On veut définir une application linéaire $T_a f : T_a M \rightarrow T_{f(a)} N$. Soit γ_1 une courbe tracée sur M , passant par a ; alors $f \circ \gamma_1 = c_1$ une courbe tracée sur N passant par $f(a)$. Si (U, φ) est une carte en a , (V, ψ) une carte en $f(a)$ avec $f(U) \subseteq V$. Alors l'application en bas :

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ \varphi(U) & \xrightarrow{\psi \circ f \circ \varphi^{-1}} & \varphi(V) \end{array}$$

est C^p au sens usuel, avec $d(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})(0) : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$.

Par construction, on a $\varphi \circ \varphi_1$ qui est C^1 au sens usuel. Alors $c_1 = f \circ \gamma_1 = (f \circ \varphi^{-1})(\varphi \circ \gamma_1)$.

Dans ce cas $\psi \circ c_1 = (\psi \circ f \circ \varphi^{-1})(\varphi \circ \gamma_1)$ est bien C^1 par composition de classe C^p et

de classe C^1 .

$$\begin{array}{ccc} T_a M & \xrightarrow{\theta_\varphi} & \mathbb{R}^k \\ T_a f \downarrow & & \downarrow \\ T_{f(a)} M & \xrightarrow{\theta_\psi} & \mathbb{R}^l \end{array}$$

On pose : $T_a f = \theta_{\psi^{-1}} \circ d(\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(0)) \circ \theta_\varphi$. On parle aussi d'*application linéaire tangente* en a . Alors $T_a f$ est clairement une application linéaire qui ne dépend pas du choix des cartes effectué pour les calculer.

De plus, cette définition est cohérente, car $(\psi \circ c_1)'(0) = d(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})(0)(\varphi \circ \gamma_1)'(0)$.

Remarque. $T_a f$ sera injective, resp. surjective, resp. bijective, ssi $d(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})(0)$ l'est.

Théorème. (Composition des différentielles sur une variété différentielle)

Soient M, N, P des variétés différentielles et $f : M \rightarrow N$ de classe C^p , $g : N \rightarrow P$ de classe C^p . Soit $a \in M$. Alors $T_a(g \circ f) = T_{f(a)}(g) \circ T_a(f)$.

▷ Soient (U, φ) une carte en a , (V, ψ) une carte en $f(a)$, (W, ξ) en $g(f(a))$. Alors $g \circ f = g \circ \psi^{-1} \circ \varphi \circ f$, et $T_a(g \circ f) \theta_\varphi^{-1} d(\xi \circ g \circ \psi^{-1} \circ \varphi^{-1}(0)) \theta_\varphi = \theta_\xi^{-1} d(\xi \circ g \circ \psi^{-1} \circ \psi \circ f \circ \varphi^{-1})(0) \theta_\varphi$. ■

2.2.7 Difféomorphismes, immersions, submersions sur des variétés différentielles et adaptation des grands théorèmes à leur cas

En se plaçant dans des cartes, on obtient :

Théorème. (Théorèmes fondamentaux sur les variétés différentielles)

Soient M, N des variétés C^p , $\dim(M) = k$, $\dim(N) = l$ et $f : M \rightarrow N$ de classe C^p . Soit $a \in M$.

1. (*Inversion locale*) Si l'application tangente $T_a f : T_a M \rightarrow T_{f(a)} N$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels, alors il existe un ouvert U de M , $a \in U$ tel que $f|_U : U \rightarrow f(U)$ soit un difféomorphisme.
2. (*Immersion*) Si $T_a f : T_a M \rightarrow T_{f(a)} N$ est injective (on dit encore que f est une immersion en a), il existe des cartes (U, φ) en a et (V, ψ) en $f(a)$ telles que si $x = (x_1, \dots, x_k) \in \varphi(U)$, $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x) = (x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)$.
3. (*Submersion*) Si $T_a f$ est surjective (on dit encore que f est une submersion en a), alors il existe des cartes (U, φ) en a et (V, ψ) en $f(a)$ telles que pour tout $x = (x_1, \dots, x_k) \in \varphi(U)$, $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x) = (x_1, \dots, x_l), l \leq k$.

Définition. (Plongement différentiel)

Soit $f : M \rightarrow N$ de classe C^p avec les hypothèses précédentes. On dit que f est un *plongement* si $f(M)$ est une sous-variété de N et si f est un difféomorphisme de M sur $f(M)$.

Définition. (Point critique, valeur critique)

On dit que $a \in M$ est *point critique* de f si $T_a f$ n'est pas surjective, i. e. $\text{rg}(T_a f) < l = \dim(N)$. On dit que $b \in N$ est *valeur critique* si c'est l'image d'un point critique.

Théorème. (Immersion injective sur un compact)

Soient M, N des variétés différentielles de classe C^p , $f : M \rightarrow N$. On suppose M compacte. On suppose que f est une immersion injective. Alors f est un plongement.

▷ Par hypothèse, f est bijective continue donc c'est un homéomorphisme de f sur $f(M)$. Montrons que $f(M)$ est une sous-variété de dimension $k = \dim(M)$ de N . Pour donnée une carte (V, ψ) de N , on veut voir $\psi(V \cap f(M))$ sous-variété de dimension k de \mathbb{R}^l et pour cela obtenir $\varphi(U \cap f(M)) = \varphi(U) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$. Soit $b = f(a)$. Par forme canonique des immersions, il y a une carte (U, φ) en a , (V, ψ) en b avec $f(U) \subseteq V$ telle que pour tout $x(x_1, \dots, x_k) \in \varphi(U)$, $(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})(x) = (x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)$. f étant un homéomorphisme sur $f(M)$, on peut réduire le domaine de carte V pour que $\psi(f(M) \cap V) = \psi(V) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$. ■

Théorème. (Caractérisation des sous-variétés par submersion)

Soit $f : M \rightarrow N$ de classe C^p . Si f est une submersion, alors pour tout $b \in N$, $f^{-1}(b)$ est une sous-variété de M de dimension $k - l$.

2.2.8 Fibré tangent à une variété différentielle**Théorème. (Structure du fibré tangent)**

Soit M une variété de classe C^p , de dimension k . Alors $TM = \bigcup_{a \in M} \{a\} \times T_a M$ est muni d'une structure de variété différentielle.

▷ On veut déjà munir TM d'une structure de variété topologique. Soit (U, φ) une carte de M . Soit $TU = \bigcup_{a \in U} \{a\} \times T_a M$. On a une application bijective $\phi : TU \rightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^k$, qui à $(a, v) \mapsto (\varphi(a), \theta_{\varphi(a)}(v))$, $v \in T_a M$, $\varphi(U) \times \mathbb{R}^k$ ouvert de \mathbb{R}^{2k} . On peut munir TU d'une topologie en décrétant que ϕ doit être un homéomorphisme, i. e. $W \subseteq TU$ ouvert $\Leftrightarrow \phi(W)$ ouvert de $\varphi(U) \times \mathbb{R}^k$. On considère un atlas (U_i, φ_i) de M . Pour tout i , on dispose de TU_i , $\phi_i : TU_i \rightarrow \varphi_i(U_i) \times \mathbb{R}^k$ muni de la topologie ci-dessus. Comme les U_i recouvrent M , les TU_i recouvrent TM . On opère donc un *recollement de topologies* : on munit TM d'une topologie par : $W \subseteq TM$ est ouvert si et seulement si pour

tout i , $W \cap TU_i$ est un ouvert de TU_i , soit pour tout i , $\phi_i(W \cap TU_i)$ ouvert de $\varphi_i(U_i) \times \mathbb{R}^k$. Grâce aux changements de cartes, les topologies sur $TU_i \cap TU_j = T(U_i \cap U_j)$ induites par celles de TU_i et TU_j coïncident.

On dispose de $\varphi_{ij} = \varphi_j \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j)$ un C^p -difféomorphisme et donc de sa différentielle $d\varphi_{ij}(0) : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ un isomorphisme linéaire. On construit : $\phi_{ij} : \varphi_i(U_i \cap U_j) \times \mathbb{R}^k \rightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j) \times \mathbb{R}^k$ qui à $(x, v) \mapsto (\varphi_{ij}(x), d\varphi_{ij}(x)(v))$. En posant $\phi_i : TU_i \rightarrow \varphi_i(U_i) \times \mathbb{R}^k$ qui à $(a, v) \mapsto (\varphi_i(a), \theta_{\varphi_i}(v) = T_x \varphi_i(v))$, on a $\boxed{\phi_j = \phi_{ij} \circ \phi_i}$.

On a donc muni TM d'une structure de variété topologique, avec les cartes (TU_i, ϕ_i) et donc les changements de cartes $\phi_{ij} : \varphi_i(U_i \cap U_j) \times \mathbb{R}^k \rightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j) \times \mathbb{R}^k$ qui à $(x, w) \mapsto (\varphi_{ij}(x), d\varphi_{ij}(x)(w))$.

Montrons que les (TU_i, ϕ_i) forment un atlas de C^{p-1} sur TM , d'où la structure de variété C^{p-1} sur TM , et que de plus $\Pi : TM \rightarrow M$ qui à $(a, v) \mapsto a$ est C^{p-1} . Il s'agit de voir que les changements de cartes ϕ_{ij} sont des C^{p-1} -difféomorphismes. Comme ce sont des homéomorphismes, il suffit de voir

que ce sont des difféomorphismes locaux. Or $J\phi_{ij}(x, w) = \begin{pmatrix} J\varphi_{ij}(x) & 0 \\ * & J\varphi_{ij}(x) \end{pmatrix}$. Comme les φ_{ij} sont des difféomorphismes, $J\phi_{ij}(x, w)$ est inversible. Lue dans les cartes, Π est la première projection. ■

Remarques.

1. (Interprétation de $\theta_\varphi : T_a M \rightarrow \mathbb{R}^k$, $\varphi : U \rightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^k$:) Cette application est C^p car $\varphi \circ \varphi^{-1} = \text{id} : U \rightarrow U$ et $\theta_\varphi = d\varphi(a)$.
2. (Cette topologie est bien séparée.) Soient $(a, v), (b, w) \in TM$, $(a, v) \neq (b, w)$. Si $a = b$, $v \neq w$, si pour i fixé, $a \in U_i$, $\theta_{\varphi_i}(a) \neq \theta_{\varphi_i}(b)$, d'où des ouverts de $\varphi_i(U_i) \times \mathbb{R}^k$ qui séparent $\phi_i(a, v)$ et $\phi_i(b, w)$ et alors ϕ_i^{-1} de ces ouverts séparent.
Si $a \neq b$ mais a et b dans un même U_i , idem.
Si $a \neq b$ dans des U_i disjoints, c'est vite vu.

2.2.9 Fibrations, fibrés vectoriels

Définition. (Fibration, base d'une fibration, espace total et fibre type)

Soient E, B, F des variétés différentielles de classe C^p . Une *fibration* (localement triviale) de base B , espace total E et fibre de type F est la donnée d'un morphisme surjectif $p : E \rightarrow B$ de classe C^p tel que pour tout $b \in B$, il existe un ouvert $U = U_b \ni b$, parfois dit *trivialisant*, tel qu'il y a un C^p -difféomorphisme $\phi : p^{-1}(U) \rightarrow U \times F$ tel que :

$$\begin{array}{ccc} p^{-1}(U) & \xrightarrow{\phi} & U \times F, \\ p \downarrow & \swarrow \text{pr}_1 & \\ U & & \end{array}$$

soit $\text{pr}_1 \circ \phi = p$, autrement dit, p coïncide avec la première coordonnée de ϕ . On dit donc aussi que p est une application *localement triviale*. On note $p : E \xrightarrow{F} B$. Remarquons

que p est une application ouverte.

Remarques.

1. Pour tout $b \in B$, la *fibre* $F_b =: p^{-1}(b)$ (qui parfois partage son nom, avec malheur, avec la fibre type) est diffeomorphe à F . En effet, immédiatement, $\phi|_{p^{-1}(b)} : p^{-1}(b) \simeq \{b\} \times F \simeq F$ (par un diffeomorphisme).
2. Autrement dit, pour tout $e \in E$, $p(e) = \text{pr}_1(\phi(e))$ et $e \in p^{-1}(b) \Leftrightarrow \phi(e) \in \text{pr}_1^{-1}(b) \simeq F$.
3. Remarquons que l'on peut parfois définir la fibration avec une fibre type variant selon l'ouvert trivialisant. Dans ce cas, la remarque précédente vaut (avec $F = F(b)$), et l'on a : $F(b) \simeq F(b')$ au sens des diffeomorphismes dès que b et b' sont dans la même composante connexe de B .
4. L'application p est toujours une submersion. En effet, le fait d'être une submersion est une propriété locale, disons en x ; restreignons p au-dessus d'un ouvert trivialisant contenant $b = p(x)$. Or, en notant $\psi(x) = (b, u)$, le foncteur tangent transforme le diagramme définitionnel en :

$$\begin{array}{ccc} T_x p^{-1}(U) & \xleftarrow{T_x \psi} & T_b U \times T_u F \\ T_x p \downarrow & \nwarrow T_{(b,u)} \text{pr}_1 & \\ T_b U & & \end{array}$$

dont $T_x p$ est surjective.

5. *Les revêtements sont les fibrations à fibres discrètes.* En effet, soit $\pi : E \rightarrow B$ un revêtement. Pour tout $b \in B$, $\pi^{-1}(U_b) = \bigsqcup_{\alpha \in \pi^{-1}(b)} V_\alpha$ tel que $\pi|_{V_\alpha} : V_\alpha \simeq U_b$ et donc $\pi^{-1}(b) = F$ a la topologie discrète. Ainsi $\phi : \pi^{-1}(U_b) \simeq U_b \times F$ par $x \in V_\alpha \mapsto (\pi|_{V_\alpha}, \alpha)$. Réciproquement, si l'on a $E \rightarrow B \supseteq U_b \ni b$ et $\pi^{-1}(U_b) \rightarrow U_b \times F$ via ϕ , F discret, on peut supposer U_b connexe par la connexité locale des variétés topologiques. Ainsi $\pi^{-1}(U_b) \simeq U_b \times F$ par ϕ de sorte que $\pi^{-1}(U_b) = \bigsqcup_{f \in F} \pi^{-1}(U_b \times \{f\})$ et $\pi|_{\pi^{-1}(U_b \times \{f\})} : \pi^{-1}(U_b \times \{f\}) \simeq U_b$.

Définition. (Morphisme de fibrations)

Soient (E, B, F) et (E', B, F') des fibrations de base B . Un *morphisme de fibrations* (de base B) est une application C^p :

$$\begin{array}{ccc} f : E & \xrightarrow{\quad} & E' \\ & \searrow p & \swarrow p' \\ & B & \end{array}$$

telle que $p' \circ f = p$. Ainsi, pour tout $b \in B$, f envoie $p^{-1}(b)$ dans $p'^{-1}(b)$.

Si de plus f est un difféomorphisme, f^{-1} est aussi un morphisme et l'on dit que f est un *isomorphisme de fibrations*.

Exemples. (Fibrations)

1. (Fibration triviale) Soient B, F deux variétés et $E = B \times F$. Alors pour $p = \text{pr}_1 : E \rightarrow B$, pour tout $b \in B$, $\text{pr}_1^{-1}(b) = \{b\} \times F$.

Par définition, une fibration quelconque est localement isomorphe à une fibration triviale.

2. L'application $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ est une fibration de fibre de type \mathbb{R}^\times . En effet, on a introduit les ouverts $V_i \subseteq \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ avec les $U_i = p(V_i)$ formant un atlas.

$$\begin{array}{ccc} V_i = p^{-1}(U_i) : (v_1, \dots, v_{n+1}) = \underline{v} & \xrightarrow{\quad \phi \quad} & U_i \times \mathbb{R}^k : (p(\underline{v}), v_i) \\ & \searrow \quad \quad \quad \swarrow & \\ & U_i : [(v_1, \dots, v_{n+1})] = [(\frac{v_1}{v_i}, \dots, 1, \dots, \frac{v_{n+1}}{v_i})] & \end{array}$$

3. L'application $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ qui à $t \mapsto e^{it}$ est une fibration de type $2\pi\mathbb{Z}$. On constate l'analogie avec la théorie des revêtements topologiques.

Définition. (Fibré vectoriel)

Un *fibré vectoriel* de classe C^p est une fibration (E, B, F) de classe C^p telle que F est un espace vectoriel, les fibres $p^{-1}(b)$ sont des espaces vectoriels et les difféomorphismes ϕ de trivialisation locale

$$\begin{array}{ccc} p^{-1}(U) & \xrightarrow{\quad \phi \quad} & U \times F, \\ p \downarrow & \swarrow \text{pr}_1 & \\ U & & \end{array}$$

induisent des isomorphismes d'espaces vectoriels entre les $p^{-1}(b)$ et F .

Par définition, le *rang* du fibré vectoriel est la dimension de F .

Définition. (Fibré trivialisable)

Un fibré vectoriel est *trivialisable* s'il est isomorphe à un fibré trivial.

Exemples. (Fibrés vectoriels)

1. (Fibré trivial) Donné par $B \times F \xrightarrow{\text{pr}_1} B$.
2. Soit M une variété différentielle de classe C^p . Alors $TM \rightarrow M$ est un fibré vectoriel C^{p-1} , de rang $\dim(M)$.

En effet, on considère l'atlas de TM construit à partir d'un atlas (U_i, φ_i) de M

$$\begin{array}{ccc} TU_i & \xrightarrow{\varphi_i} & \varphi_i(U_i) \times \mathbb{R}^k \\ \downarrow & & \\ U_i & & \end{array}$$

où l'on prend $(\varphi_i^{-1} \times \text{Id}) \circ \varphi_i$.

$$\begin{array}{ccc} TU_i & \xrightarrow{\quad} & U_i \times \mathbb{R}^k \\ \searrow p & & \swarrow pr_1 \\ & U_i & \end{array}$$

3. Soit $G = GL_n(\mathbb{R})$ ou $SL_n(\mathbb{R})$ ou $O_n(\mathbb{R})$. Alors TG est trivialisable : $TG \rightarrow G \times_{T_{\text{Id}}} G$ grâce à $(g, v) \mapsto (g, g^{-1}v)$.

Définition. (Section d'une fibration)

Soit (E, B, F) une fibration selon la définition précédente. Une *section* est une application $s : B \rightarrow E$ de classe C^p telle que $p \circ s = \text{Id}_B$, autrement dit, c'est une section différentielle de la fibration.

Heuristiquement, il s'agit de choisir un élément dans la fibre de façon C^p .

Exemple. (Section d'une fibration triviale)

Pour une fibration triviale, $s(b) = (b, f)$ où $f \in F$ est quelconque ; on obtient $B \rightarrow B \times F$.

Définition. (Champ de vecteurs)

Soit M une variété et TM son fibré tangent. Une section de (TM, M) est appelée *champ de vecteurs*.

Autrement dit, un champ de vecteurs d'une variété différentielle M est une fonction différentiable associant à chaque point x de la variété M un vecteur tangent en ce point : $V : M \rightarrow TM$ qui à $x \mapsto (x, V_x)$ où $V_x \in T_x M$ l'espace tangent à M en x , c'est-à-dire, il existe une courbe $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow M$ tracée sur M avec $\gamma(0) = x$ et C^1 au sens des variétés différentiables ; on prend alors \tilde{V}_x sa classe modulo l'égalité de la dérivée en zéro de l'application lue dans n'importe quelle carte.

Exemple. (Champ de vecteurs)

Soit (E, B, F) un fibré vectoriel trivialisable. Fixons (e_1, \dots, e_n) une base de F . Posons $s_i : B \rightarrow E$ qui à $b \mapsto \phi^{-1}(b, e_i)$. C'est une section, et l'on a pour tout b , $(s_1(b), \dots, s_n(b))$

qui est une base de $p^{-1}(b)$.

Proposition

Soit (E, B, F) un fibré vectoriel, $\dim(F) = n$, tel qu'il existe n sections s_1, \dots, s_n telles que pour tout b , $s_1(b), \dots, s_n(b)$ base de $p^{-1}(b)$. Alors le fibré est trivialisable.

▷ On construit $\psi : B \times F \rightarrow E$. Fixons une base (e_1, \dots, e_n) de F tel que $v \in F, v = \sum v_i e_i$. Alors $\psi : (b, v) \mapsto \sum_{i=1}^n v_i s_i(b)$ est un morphisme de fibrés vectoriels, et un isomorphisme sur les fibres. Comme E est fibré, il est localement trivial. Soit U un ouvert de B , $b \in U$ tel que $\phi_U : p^{-1}(U) \rightarrow U \times F$ avec une section $s_i : U \rightarrow p^{-1}(U)$, d'où $\phi_U \circ s_i : U \rightarrow U \times F$. Ainsi, $\phi_U \circ s_i(b) = (b, S_i^U(b))$ où $S_i^U : U \rightarrow F_i$. Or $(S_1^U(b), \dots, S_n^U(b))$ est une base de F . Soit $S^U(b)$ la matrice dont les colonnes sont les coordonnées de ces vecteurs dans (e_1, \dots, e_n) . Les applications $S^U : U \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ sont C^p , $A \mapsto A^{-1}$ de $GL_n(\mathbb{R})$ dans lui-même est C^∞ donc $S^U(\cdot)^{-1} : U \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ de classe C^p , qui à $b \mapsto S^U(b)^{-1}$ est C^p . On a $(\text{Id} \times S^U(\cdot)^{-1}) \circ \phi_U \circ \psi(b, v) = (b, v)$, car $\phi_U \circ \psi(b, v) = (b, \sum v_i S_i^U(b))$. Ainsi, $(\text{Id} \times S^U(\cdot)^{-1}) \circ \phi_U$ est l'inverse de ψ sur le domaine considéré, donc ψ est un difféomorphisme local. ■

Exemple. (Le fibré vectoriel tautologique sur l'espace projectif)

Soit $E = \{([x], v) \in \mathbb{P}^n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^{n+1}; v \in [x]\}$ et $\Pi : E \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ la restriction de la première projection. Alors E est une sous-variété de $\mathbb{P}^n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^{n+1}$ et $\Pi : E \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ est un fibré vectoriel de fibre type \mathbb{R} . On considère l'atlas (U_i, ϕ_i) de $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ habituel, d'où un atlas $U_i \times \mathbb{R}^{n+1}$ de $\mathbb{P}^n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^{n+1}$ donnée par les $\phi_i \times \text{id}$. On veut voir que $(\phi_i \times \text{id})(U_i \times \mathbb{R}^{n+1}) \cap E \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n+1}$ est une sous-variété. Prenons $[y] = [y_1, \dots, y_{n+1}] \in U_i$, avec $y_i \neq 0$. Alors $\phi_i([y]) = (\frac{y_1}{y_i}, \dots, \frac{y_{n+1}}{y_i})$ sans le i -ième terme. Alors $(\phi_i \times \text{id})(U_i \times \mathbb{R}^{n+1}) \cap E = \{(z, v), v_k = v_i z_k, k \leq i+1, v_k = v_i z_{k-1}, k \geq i+1\}$ avec $z = (z_1, \dots, z_n), v = (v_1, \dots, v_{n+1})$. C'est donné par n équations, i.e. par une application $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$. Comme les différentielles de ces n équations sont linéairement indépendantes, F est une submersion et l'on a donc une sous-variété. Ainsi E est une variété et $\dim(E) = n+1$, avec $\Pi : E \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$. Pour tout $[x]$, $\Pi^{-1}([x]) = \mathbb{R}x$ une droite vectorielle. On obtient une trivialisatation locale sur $\Pi^{-1}(U_i) \rightarrow U_i \times \mathbb{R}$ donnée sur $U_i \times \mathbb{R}$ par $[(u_1, \dots, u_{i-1}, 1, u_{i+1}, \dots, u_{n+1}), t] \mapsto ([u], (tu_1, \dots, t, \dots, tu_{n+1}))$.

2.2.10 Quelques constructions de variétés différentielles : actions de groupe et revêtements

Soit M une variété topologique et différentielle, G un groupe agissant sur M par homéomorphisme ou difféomorphisme, G muni de la topologie discrète. On considère les orbites $G \cdot m = \{g \cdot m, g \in G\}$ pour $m \in M$ et M/G l'ensemble des orbites. On dispose d'une

projection $p : M \longrightarrow M/G$; on munit de M/G de la topologie quotient au sens où Y est un ouvert de M/G si et seulement si $p^{-1}(Y)$ est un ouvert de M . Dans ce cas, $f : M/G \longrightarrow X$ un espace topologique est continue si et seulement si $f \circ p : M \longrightarrow X$ est continue.

Nota bene. Ici, p est une application ouverte. En effet, $p^{-1}(p(U)) = \bigcup_{g \in G} g \cdot U$ est ouvert par action par homéomorphismes.

Dans toute la suite, les espaces topologiques considérés seront séparés, localement compacts (tout point admet une base de voisinage compact ou, ce qui est équivalent, admet un voisinage relativement compact).

Définition. (Action propre)

Supposons M localement compact. L'action de G sur M est *propre* si pour tous K, L compacts de M , il n'y a qu'un nombre fini de $g \in G$ tels que $g \cdot K \cap L \neq \emptyset$.

On rappelle qu'une action est libre, ou sans point fixe, si elle agit sans point fixe autre que le neutre.

Propriété. (Transmission de la locale compacité aux orbites)

Soit M un espace topologique séparé et localement compact, où G agit proprement. Alors M/G est séparé et localement compact.

▷ On considère $p : M \longrightarrow M/G$. Montrons que M/G est séparé. Soient $\alpha \neq \beta$ dans M/G . Soient $a, b \in M$ avec $p(a) = \alpha$ et $p(b) = \beta$, $a \neq b$. M est séparé, soient U, V deux voisinages compacts de a, b les séparant. Il n'y a qu'un nombre fini de $g \in G$ tels que $gV \cap U \neq \emptyset$. Soient g_1, \dots, g_p ces éléments. Alors g_1V, \dots, g_pV sont des voisinages de $g_i b \neq a$. Il existe V_i un voisinage compact de $g_i b$, U_i idem de a tels que $V_i \cap U_i = \emptyset$. Soit $U' = U \cap U_1 \cap \dots \cap U_p$ voisinage de a ; $V' = V \cap g_1^{-1}V_1 \cap \dots \cap g_p^{-1}V_p$ voisinage de b . On a : pour tous $g, g' \in G$, $gU' \cap g'V' = \emptyset$, d'où $p(U') \cap p(V') = \emptyset$. Montrons que M/G est localement compact. Soit $\alpha \in M/G$, et $a \in M$ tel que $p(a) = \alpha$. Soit U un voisinage compact de a . Alors $p(U)$ est compact et un voisinage de α , car p est ouverte. ■

Proposition. (Structure de variété donnée par une action propre)

Soit M un espace topologique séparé et localement compact, où G agit proprement et librement. Alors tout point de M possède un voisinage U tel que les $g \cdot U$ sont deux à deux disjoints.

On introduit la notion de revêtement en topologie différentielle. Elle est semblable à celle de la topologie.

Définition. (Revêtement différentiel)

Soient E, B des variétés de classe C^p . Soit $p : E \rightarrow B$ une application surjective et de classe C^p . On dit que (E, B, p) est un revêtement si pour tout $b \in B$, il y a un ouvert *trivialisant* $U \ni b$ tel que la fibre $p^{-1}(U)$ est une réunion d'ouverts $V_i, i \in I$, les *feuilles*, deux à deux disjoints, et *bien revêtus*, soit tels que $p|_{V_i} : V_i \rightarrow U$ est un C^p -difféomorphisme. En particulier, p est ouverte.

Remarque. Un revêtement est toujours un difféomorphisme local. La réciproque est fausse. Par contre, un difféomorphisme global est un revêtement, à un seul feuillet.

Exemples. (Revêtements différentiels)

1. (*Revêtement trivial*) Soit B un variété et F un ensemble discret. Soit $pr_1 : B \times F \rightarrow B$. Localement, on est dans cette situation avec $F = I$:

$$p^{-1}(U) \simeq U \times I$$

$$V_i \mapsto U \times \{i\}$$

$$x \mapsto (p(x), i).$$

2. Pour $n \geq 1$, $\mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*, z \mapsto z^n$.

On rappelle :

Théorème. (Revêtements par les actions proprement libres)

Soit G un groupe discret agissant librement et proprement par homéomorphismes sur un espace topologique localement compact M . Alors $p : M \rightarrow M/G$ est un revêtement (topologique).

Nous avons maintenant :

Théorème. (Revêtements différentiels par les actions proprement libres)

Soit M un variété de classe C^p et G un groupe discret agissant librement et proprement par homéomorphismes sur M localement compacte. Alors il y a une unique structure de variété sur M/G tel que $p : M \rightarrow M/G$ est un revêtement de classe C^p .

Exemples. (D'autres revêtements différentiels)

1. Pour $M = S^n$ et $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ agissant par $x \mapsto -x$, donc librement. Alors $M/G = \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$. Alors $S^n \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ est un revêtement (à deux feuilles) de classe C^∞ .

▷ Pour la version topologique, on utilise un voisinage V donné par la proposition précédente de $\alpha \in p^{-1}(\alpha)$ pour $\alpha \in M/G$. Alors $U = p(V)$ est un ouvert de M/G . Alors $p^{-1}(U) = \bigcup_{g \in G} g \cdot V$ et $V_g = g \cdot V$. On a bien $p_{g \cdot V} : g \cdot V \rightarrow U$ un homéomorphisme. Traitons le cas qui nous intéresse où M est une variété. Il faut munir M/G d'un atlas de cartes C^p -compatibles. Si on a un ouvert $U \subseteq M/G$, montrons que $p^{-1}(U) = \bigsqcup V_i$, $p|_{V_i} : V_i \rightarrow U$ un difféomorphisme avec $(p|_{V_i})^{-1} : U \rightarrow V_i$. Pour montrer cela, on a deux outils : les cartes locales et les trivialisations locales. On part d'un atlas (W_i, ξ_i) de M . On munit M/G d'un atlas ainsi : pour $\alpha \in M/G$, U ouvert de M/G avec $p^{-1}(U) = \bigsqcup_{i \in I} V_i$ et quitte à restreindre, on peut supposer V_i domaine de carte.

$$\begin{array}{ccc} V_i & \xrightarrow{\phi_i} & \mathbb{R}^k \\ p|_{V_i} \updownarrow & & \\ U & & \end{array}$$

$\phi_U : \phi_i \circ (p|_{V_i})^{-1} : U \rightarrow \mathbb{R}^k$ un homéomorphisme sur son image (on a une variété topologique). On regarde les changements de carte $\phi_U : U \rightarrow \mathbb{R}^k$ définie par $\phi_U = \phi \circ (p|_V)^{-1}$ et $\phi_{U'} : U' \rightarrow \mathbb{R}^k$ définie par $\phi_{U'} = \phi' \circ (p|_{V'})^{-1}$ sur $\phi(U \cap U') \rightarrow \phi'(U \cap U')$: c'est $\phi' \circ \phi^{-1} = \phi' \circ [p|_{V'}^{-1} \circ p|_V] \circ \phi^{-1}$. Tout revient à voir que les $(p|_{V'})^{-1} \circ (p|_V) : V \rightarrow V'$ sont C^p au-dessus de $U \cap U'$. On prend $V_1 \subseteq V$, $p(V_1) = U \cap U'$, $V_2 \subseteq V'$, $p(V_2) = U \cap U'$. Soit $f = (p|_{U'})^{-1} \circ (p|_{V_1}) : V_1 \rightarrow V_2$. C'est l'application qui à tout $m \in V_1$ associe l'unique élément de V_2 qui est dans son orbite, soit $f(m) = h.m$ où h est un unique élément de G vérifiant cette relation.

$$\begin{array}{ccc} V_1 & \xrightarrow{\quad} & V_2 \\ p|_{V_1} \searrow & & \swarrow p|_{V_2} \\ & U \cap U' & \end{array}$$

Les $k.V_2$, $k \in G$ sont deux à deux disjoints donc f envoie un voisinage de m dans ce même V_2 et pas dans $k.V_2$, $k \neq e$ et sur ce voisinage $W : \forall x \in W, f(x) = h.x$. ■

2.2.11 Fonctions plateaux et partitions de l'unité

Définition. (Support d'une fonction sur une variété)

Soient M une variété et $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^p . Le *support* de f est l'adhérence de $\{x \mid f(x) \neq 0\}$.

Définition. (Fonction plateau sur une variété)

Soit M une variété de classe C^∞ . Une *fonction plateau* sur M est une fonction C^∞ $f : M \rightarrow [0, 1]$ tel qu'il existe U, V ouverts de M relativement compacts avec $\overline{V} \subseteq U$, $f|_V = 1$ et $\text{supp}(f) \subseteq U$.

Remarque. Les fonctions plateaux sont utiles pour prolonger à M certaines fonctions à support dans un ouvert.

Proposition. (Prolongement conjoint de fonctions sur des ouverts)

Soient M une variété, U, V des ouverts de M , $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $g : V \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^∞ qui coïncident sur $U \cap V$. Alors elles se prolongent en une fonction C^∞ sur $U \cup V$.

Exemple

Typiquement, si $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ est à support dans un ouvert $V \subseteq U$, sur $W = \text{supp}(f)^c$, f est nulle, donc on peut la prolonger à M .

Théorème. (Existence de fonctions plateaux)

1. (Cas de \mathbb{R}^n) Soient $B_1 \subseteq B_2$ deux boules ouvertes de \mathbb{R}^n , de même centre et de rayons respectifs $r > R$. Alors il y a une fonction plateau $f : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ telle que $\text{supp}(f) \subseteq B_2$ et $f|_{B_1} = 1$.
2. (Cas des variétés) Soit M une variété, U un ouvert de M et $a \in U$. Alors il existe un ouvert V d'adhérence compacte $\bar{V} \subseteq U$ avec $a \in V$ et une fonction plateau f telle que $f|_V = 1$ et $\text{supp}(f) \subseteq U$.
3. (Cas des variétés, cas compact) Soit M une variété, $K \subseteq M$ compact, U ouvert avec $K \subseteq U$. Alors il existe une fonction plateau f sur M telle que $\text{supp}(f) \subseteq U$ et $f|_K = 1$.

▷ Pour le premier point

- a) La fonction de \mathbb{R} dans \mathbb{R} qui à $x \mapsto \exp(-\frac{1}{x})$ pour $x > 0$ et 0 sinon est de classe C^∞ . On le sait depuis les petites classes.
- b) Soit $a > 0$. Alors $g(x) = \exp(\frac{-1}{a^2 - x^2})$ pour $|x| < a$, 0 sinon est C^∞ . Elle est à support compact. La primitive $h_a(t) = \int_{-\infty}^t g_a(x) dx / \int_{-\infty}^{+\infty} g_a(x) dx$ est dans $[0, 1]$, nulle pour $t \leq -a$ et égale à 1 pour $t \geq a$. Pour $b > a$, $h_a(b - t) \in [0, 1]$, $b - t \leq -a$, i. e. $t \geq a + b$ nulle, et $b - t \geq a$, i. e. $t \leq b - a$ qui vaut 1.
- c) On pose, pour $x \in \mathbb{R}^n$, $\phi(x) = h_a(b - \|x\|^2)$ avec $r_1^2 = b - a$ et $r_2^2 = b + a$.

Généralisons maintenant aux variétés. Soit (W, φ) une carte de M en a , $W \subseteq U$, $\varphi(a) = 0$. On a $\varphi(W)$ ouvert de \mathbb{R}^n , on peut donc trouver deux boules $B_1 \subseteq B_2$ centrées en 0 et f une fonction plateau telle que $\text{supp}(f) \subseteq B_2$ avec $f|_{B_1} = 1$. On considère alors $f \circ \varphi : W \rightarrow [0, 1]$. $V = \varphi^{-1}(B_1) \subseteq \varphi^{-1}(B_2) = U$ et $a \in \bar{V} \subseteq U$. C'est une fonction plateau, qui n'est définie que sur W . On peut la prolonger en une fonction C^∞ sur M grâce à la fonction nulle et le tour est joué.

Soit K un compact. Pour tout $a \in K$, on prend une carte en a , d'où comme ci-dessus des voisinages $V_a \subseteq U_a$ avec $\bar{V}_a \subseteq U_a$ et des fonctions plateaux f_a telles que $\text{supp}(f_a) \subseteq U_a$ et $f_a|_{V_a} = 1$. Du recouvrement ouvert $(V_a)_{a \in K}$, on extrait un recouvrement fini d'où a_1, \dots, a_p avec $V_{a_1} \cup \dots \cup V_{a_p} = K$ et f_{a_i} vaut 1 sur a_i . L'idée dès lors est de faire l'analogie avec les fonctions caractéristiques. On écrit $K = \bigcup V_{a_i}$, puis $K^c = \bigcap V_{a_i}^c$ et $\chi_{K^c} = \prod_{i=1}^p \chi_{V_{a_i}^c}$, puis $1 - \chi_K = \prod_{i=1}^p (1 - \chi_{V_{a_i}})$. On pose $f = 1 - \prod_{i=1}^p (1 - f_{a_i})$ qui est C^∞ à valeurs dans $[0, 1]$. Si $x \notin \bigcup U_{a_i}$, $f_{a_i}(x) = 0$ pour tout i d'où $f(x) = 0$. Ainsi $\text{supp}(f) \subseteq \overline{\bigcup U_{a_i}}$ d'où qu'il est compact. Si $x \in K$, il existe i , $f_{a_i}(x) = 1$ et $f(x) = 1$. ■

Définition. (Partition de l'unité)

Soit M une variété différentielle et $(U_i)_{i \in I}$ un recouvrement ouvert de M . Une partition de l'unité subordonnée à ce recouvrement est la donnée de fonctions C^∞ $p_i : M \rightarrow \mathbb{R}^+$ telles que $\text{supp}(p_i) \subseteq U_i$ et $\sum p_i = 1$.

Proposition. (Existence de partitions de l'unité dans le cas compact)

Si M est compacte et I est fini, alors il existe une partition de l'unité subordonnée.

▷ On prend, grâce au lemme de la partie suivante, un recouvrement ouvert $(V_i)_{i \in I}$ avec $\overline{V_i} \subseteq U_i$ et des fonctions plateaux f_i avec $\text{supp}(f_i) \subseteq U_i$ et $f_i|_{V_i} = 1$. On a, si $f(x) = \sum_{i \in I} f_i(x)$, $\forall i, f(x) > 0$, car il existe i_0 tel que $x \in V_{i_0}$ et alors $f_{i_0}(x) = 1$. On prend donc $p_i(x) = \frac{f_i(x)}{f(x)}$. ■

Ces notions permettent le passage du local au global.

2.2.12 Plongement d'une variété compacte dans un \mathbb{R}^n **Lemme. (Recouvrement d'un compact par des fermés sur une variété)**

Soit M une variété compacte, $(U_i)_{i \in I}$ un recouvrement ouvert fini de M . Alors il y a un recouvrement ouvert $(V_i)_{i \in I}$ avec le même ensemble d'indices I avec $\overline{V_i} \subseteq U_i$.

▷ M est localement compacte, donc pour tout $x \in M$, il existe $i(x) \in I$ tel que $x \in U_{i(x)}$ et V_x est ouvert, avec $x \in V_x \subseteq \overline{V_x} \subseteq U_{i(x)}$. Alors $(V_x)_{x \in M}$ est un recouvrement ouvert de M , d'où un sous-recouvrement fini V_{x_1}, \dots, V_{x_p} . Pour $i \in I$, soit $J_i = \{k \in \{1, \dots, p\}, i(x_k) = i\}$ et $V_i = \bigcup_{k \in J_i} V_{x_k}$ fait le job. On a bien $\overline{V_i} \subseteq U_i$. ■

Théorème. (Théorème de plongement des variétés compactes)

Toute variété compacte se plonge dans un espace euclidien.

▷ Soit M une variété différentielle compacte de dimension k . On veut trouver un entier naturel n tel que M se plonge dans \mathbb{R}^n . On a vu que sur une variété compacte, un plongement est exactement une immersion injective. On considère un atlas de M , dont on extrait un sous-recouvrement fini $(U_i, \varphi_i)_{i \in I}$, $I = \llbracket 1, p \rrbracket$ fini. On veut prolonger les φ_i à M . On considère les V_i donnés par le lemme et pour $\overline{V_i} \subseteq U_i$, on prend une fonction plateau f_i avec $\text{supp}(f_i) \subseteq U_i$ et $f_i|_{V_i} = 1$. Alors, pour tout i , la fonction $\psi = f_i \varphi_i$ se prolonge en une fonction C^∞ sur M . Soit $F : M \rightarrow \mathbb{R}^{n+p}$, $x \mapsto (\psi_1(x), \dots, \psi_p(x), f_1(x), \dots, f_p(x))$. La fonction F est C^∞ , car ses composantes le sont. Montrons l'injectivité de F . Soient $x, y \in M$ tels que $F(x) = F(y)$. Comme les V_i forment un recouvrement de M , il existe i tel que $x \in V_i$. Alors $f_i(x) = 1 = f_i(y)$. On a aussi $\psi_i(x) = \psi_i(y)$. Ainsi $\varphi_i(x)f_i(x) = \varphi_i(y)f_i(y)$, soit $\varphi_i(x) = \varphi_i(y)$, mais φ_i est bijective, d'où $x = y$. Il faut maintenant que je m'assure que F est une immersion. Il faut donc vérifier qu'en tout point, son application linéaire tangente est une

application linéaire injective. Par composition, $T_x f = (T_x \psi_1, \dots, T_x \psi_p, \dots, T_x f_1, \dots, T_x f_p)$. Si $x \in V_i$, alors sur V_i , $\psi_x = \varphi_i$; sur V_i , $T_x \psi_i = T_x \varphi_i$ et $T_x \varphi_i : T_x M \rightarrow \mathbb{R}^n$ est un isomorphisme, d'où l'injectivité de $T_x F$. ■

2.3 Champs de vecteurs

Dans toute cette section, les variétés différentielles considérées seront supposées C^∞ . On prend M une variété et X un champ de vecteur (que l'on peut penser comme un opérateur différentiel d'ordre 1), soit $X : M \rightarrow TM$ de classe C^∞ tel que $p \circ X(m) = m$. On verra comment, étant donné X , on peut trouver des courbes de classe C^∞ $c : I \rightarrow M$ telles que pour tout $t \in I$, $c'(t) = X(c(t)) \in T_{c(t)}M$.

2.3.1 Dérivations sur une variété et description par rapport aux champs

Définition. (Dérivation sur une algèbre)

Soit A une algèbre (associative, unitaire), typiquement, $A = C^\infty(M)$. Une *dérivation* sur A est une application linéaire $D : A \rightarrow A$ tel que pour tous $a, b \in A$, $D(ab) = D(a)b + aD(b)$. Canoniquement, pour $A = C^\infty(M)$, on parle de *dérivation sur M* . On note $\text{Der}(A)$ l'ensemble des dérivations de A .

Remarques.

1. $D(1) = 0$.
2. $D(1^2) = D(1) = 1.D(1) + D(1).1 = 2D(1)$.
3. Si $A = C^\infty(M)$ comme suggéré, $D(\text{application constante}) = 0$.

Proposition

$\text{Der}(A)$ est un espace vectoriel.



Par contre, si $D_1, D_2 \in \text{Der}(A)$, en général, $D_1 \circ D_2 \notin A$!

Proposition. (Crochet de dualité de dérivations)

Si $D_1, D_2 \in \text{Der}(A)$, $D_1 \circ D_2 - D_2 \circ D_1 \in \text{Der}(A)$.

▷ Simple calcul. ■

Proposition. (Champ de vecteurs et dérivations)

Soit M une variété C^∞ et $A = C^\infty(M)$. Tout champ de vecteurs X sur M détermine une dérivation D_X de A donnée si $f \in A$ par

$$D_X(f)(x) = T_x f(X(x)) \in \mathbb{R}$$

(car $T_x f : T_x M \rightarrow \mathbb{R}$, où $T_x f$ est l'application linéaire tangente de f , définie pour tout $v \in T_x M$ par $T_x f(v) = \frac{d}{dt} f(c(t))$ où $c : I \rightarrow M$ avec $c'(0) = v$). On a $D_X(f) \in A$.

$$\begin{array}{ccc} C^\infty(N) & \xrightarrow{g \mapsto g \circ \phi} & C^\infty(M) \\ \phi_*(D) \downarrow & & \downarrow D \\ C^\infty(N) & \xleftarrow{h \mapsto h \circ \phi^{-1}} & C^\infty(M) \end{array}$$

▷ On traite d'abord le cas d'un ouvert U de \mathbb{R}^n . Un champ de vecteurs sur U est donné par une application $C^\infty X : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, car $TU = U \times \mathbb{R}^n$. Fixons (e_1, \dots, e_n) une base de \mathbb{R}^n . Alors $X(x) = \sum_{i=1}^n X_i(x) e_i$. Alors pour $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $T_x f(X(x)) = df(x)(X(x)) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) X_i(x)$. C'est bien C^∞ . Ainsi $\frac{\partial}{\partial x_i}$ est la dérivation correspondant au champ de vecteurs constant $x \mapsto e_i$.

Dans le cas d'une variété M , C^∞ est une notion locale, donc on peut se placer dans un domaine de carte (U, φ) . Soit X un champ de vecteurs.

$$\begin{array}{ccccc} \Phi : TU & \simeq & U \times \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\text{pr}_2} & \mathbb{R}^n \\ (x, \xi) & \mapsto & (x, T_x \varphi(\xi)) & \mapsto & T_x \varphi(x) \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ U & & x & & \end{array}$$

L'application $\text{pr}_2 \circ \Phi \circ X$ est une application C^∞ par composition, donc $x \mapsto T_x \varphi(X(x))$ est C^∞ . Or f est C^∞ , sa restriction à U également, donc on a que l'application lue dans la carte (U, φ) donnée par $\varphi(U) \rightarrow \mathbb{R}$ qui à $z \mapsto f \circ \Phi^{-1}(z)$ est C^∞ . Ainsi, $T_x f(X(x)) = T_x f \circ T_{\varphi(x)} \varphi^{-1} \circ T_x \varphi(X(x))$, car $T_{\varphi(x)} \varphi^{-1} \circ T_x \varphi = x$. Or le premier terme égale $T_{\varphi(x)}(f \circ \varphi^{-1})$ où $f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow \mathbb{R}$ est C^∞ donc $z \mapsto T_z(f \circ \varphi^{-1})$ de $\varphi(U) \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ est C^∞ . Le dernier terme est déjà réglé. ■

On voit maintenant que toute dérivation provient d'un champ de vecteurs.

Théorème. (Correspondance entre champs de vecteurs et dérivations)

L'application $X \mapsto D_X$ est une application linéaire bijective entre l'espace vectoriel $\chi(M)$ des champs de vecteurs et celui $\text{Der}(C^\infty(M))$ des dérivations.

▷ Cette application est clairement linéaire. Montrons la bijectivité. Commençons par le cas d'un ouvert convexe de \mathbb{R}^n . L'injectivité vient de ce que, si $X(x) = \sum X_i(x) \cdot e_i$, si $D_X = 0$, $X = 0$. En effet, si $X \neq 0$, il existe $a \in U$ et $i \in \{1, \dots, n\}$ tel que $X_i(a) \neq 0$, donc $(D_X f)(x) = \sum_{i=1}^n X_i(x) \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$ où

f est la restriction à U de la fonction $x \mapsto x_i$ la i -ième coordonnée. Démontrons la surjectivité. Soit D une dérivation. On cherche $X \in \chi(U)$ tel que pour tout f , pour tout x , $D(f)(x) = \sum X_i(x) \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$. Fixons $x_0 \in U$ convexe. D'après le lemme de Hadmard, $f(x) = f(x_0) + \sum_{i=1}^n (x_i - x_{0,i})h_i(x)$ avec les $h_i \in C^\infty(U)$ et même $h_i(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)$. Soient $g_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ qui à $x \mapsto x_i - x_{0,i}$, avec donc $g_i(x_0) = 0$. Alors $f(x) = f(x_0) + \sum_{i=1}^n g_i(x)h_i(x)$. Alors $(Df)(x) = \sum_{i=1}^n [D(g_i)(x)h_i(x) + g_i(x)Dh_i(x)]$, d'où $(Df)(x_0) = \sum_{i=1}^n D(g_i)(x_0) \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)$. Ainsi Df sur U coïncide avec D_X où $X(y) = \sum_{i=1}^n D(g_i)(y)e_i$. ■

2.3.2 Restriction d'une dérivation à un ouvert

Proposition. (Restriction des dérivations)

Soit D une dérivation sur M .

1. Soit U un ouvert de M , $f, g \in C^\infty(M)$ telles que $f|_U = g|_U$. Alors $D(f)|_U = D(g)|_U$.
2. Pour tout ouvert U de M , il existe une unique dérivation D_U sur U telle que si $f \in C^\infty(M)$, $f|_U \in C^\infty(U)$ et alors $D(f)|_U = D_U(f|_U)$.

▷ Par soustraction, on se ramène à : si $f|_U = 0$, $D(f)|_U = 0$, c'est-à-dire, pour tout $x \in U$, $D(f)(x) = 0$. Soit donc $x \in U$. Il existe V un ouvert dont l'adhérence est un compact inclus dans U et $x \in V$, il existe également une fonction plateau g dont le support est inclus dans U et valant 1 sur V . Alors $fg = 0$ au sens du produit donc $D(fg) = 0 = D(f)g + fD(g)$ en x . En particulier, en x , $0 = D(f)(x).g(x) + f(x)D(g)(x) = (Df)(x)$, car $f(x) = 0$.

Soit $f \in C^\infty(U)$. Soit $x \in U$. Quid de $D_U(f)(x)$? On prend $V \subseteq U$ et g une fonction plateau comme ci-dessus. Alors la fonction fg se prolonge par 0 en une fonction C^∞ sur M . On dispose de $D(fg) \in C^\infty(M)$. On pose, pour $y \in V$, $D_U(f)(y) = D(fg)(y)$. Ceci ne dépend pas du choix de g grâce au premier point. Sa valeur en x ne dépend pas du choix de v . ■

2.3.3 Image par un difféomorphisme d'un champ de vecteurs ou d'une dérivation

Soient M, N deux variétés. Soit $\phi : M \rightarrow N$ une application de classe C^∞ . ϕ induit un morphisme d'algèbre $\phi^* : C^\infty(N) \rightarrow C^\infty(M)$ via $g \mapsto g \circ \phi$. Si de plus ϕ est un C^∞ difféomorphisme, on a aussi $(\phi^{-1})^* : C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(N)$. On les utilise ainsi pour transporter dérivations sur M en dérivations sur N .

Définition. (Transport de dérivation)

Avec les notations précédentes, soit $D \in \text{Der}(C^\infty(M))$. Alors $\phi_*(D)$ donnée par :

$$\phi_*(D)(g) = (\phi^{-1})^* \circ D(\phi^*(g))$$

soit

$$\phi_*(D)(g)(y) = D(g \circ \phi)(\phi^{-1}(y))$$

est dans $\text{Der}(C^\infty(N))$.

Remarque. Pour des champs de vecteurs,

$$\begin{array}{ccc} TM & \xrightarrow{T\phi} & TN \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \xrightarrow{\phi} & N \end{array}$$

et si $X \in \chi(M)$, $\phi_*(X) = T\phi(X \circ \phi^{-1})$, soit $\phi_*(X)(y) = T_{\phi^{-1}(y)}(X(\phi^{-1}(y)))$.

Avec les définitions ci-dessus, $D_{\phi_*(X)} = \phi_*(D_X)$.

▷ En effet, $D_{\phi_*(X)}(g)(y) = T_y g(\phi_*(X)(y)) = T_y g \circ T_{\phi^{-1}(y)}(X(\phi^{-1}(y))) = T_{\phi^{-1}(y)}(g \circ \phi^{-1})(X(\phi^{-1}(y)))$ pour $g \in C^\infty(N)$. Pour $\phi_*(D_X)(g)(y) = D_X(g \circ \phi)(\phi^{-1}(y)) = T_{\phi^{-1}(y)}(g \circ \phi)(X(\phi^{-1}(y)))$, d'où l'identité. ■

On peut donc reprendre la preuve du théorème :

Preuve.

▷ Montrons l'injectivité dans le cas général. Soit $X \in \chi(M)$ tel que $D_X = 0$. Si $a \in M$ avec $X(a) \neq 0$, soit (U, φ) une carte en a , $\varphi(a) = 0$. $T_a \varphi(X(a)) \neq 0$ avec $T_a \varphi : T_a M \rightarrow \mathbb{R}^n$, donc pour au moins l'une des coordonnées, $T_a \varphi^i(X(a)) = D_X(\varphi^i)(a) \neq 0$. Ce n'est pas encore une contradiction, car φ^i n'est définie que sur U et pas sur M tout entier. Soit $V \subseteq U$, avec \bar{V} compact, $a \in V$ et g une fonction plateau à support dans V . On considère $g\varphi^i$ qui se prolonge en une fonction C^∞ sur M . $D_X(g\varphi^i)(a) = D_X(g)(a)\varphi^i(a) + g(a)D_X\varphi^i(a) = D_X\varphi^i(a) \neq 0$.

Montrons maintenant la surjectivité. Soit D une dérivation sur $C^\infty(M)$. On cherche X tel que $D = D_X$. Soit (U_i, φ_i) des cartes d'un atlas d'où des D_{U_i} , puis $\varphi_i(D_{U_i})$ dérivations sur l'ouvert $\varphi_{i*}(U_i)$ d'où $X_i \in \chi(\varphi_i(U_i))$ tel que $D_{X_i} = \varphi_{i*}(D_{U_i})$, puis $(\varphi_i^{-1})_*(X_i) = Y_i$ champ de vecteur sur U_i . Question : existe-t-il $Y \in \chi(M)$ tel que $Y|_{U_i} = Y_i$. Il faut vérifier que les Y_i et Y_j coïncident sur $U_i \cap U_j$. Pour cela, $(\varphi_i)_*(Y_i) = X_i$ sur $\varphi_i(U_i \cap U_j)$ et $(\varphi_j)_*(Y_j) = X_j$ sur $\varphi_j(U_i \cap U_j)$. ■

Proposition. (Comportement du transport de dérivation par composition)

Soient M, N, P trois variétés différentielles. Soient $\phi : M \rightarrow N$ et $\psi : N \rightarrow P$ des difféomorphismes. Alors $(\psi \circ \phi)_* = \psi_* \circ \phi_*$, sur $\chi(M)$ ou sur $\text{Der}(M)$.

▷ On le vérifie bien sur le diagramme, ou pour les courageux, par le calcul. ■

On retiendra en somme le lien fondamental : pour $X \in \chi(M)$,

$$D_{\phi_*(X)} = \phi_*(D_X).$$

2.3.4 Construction de champs de vecteurs

Soit M une variété C^∞ . Soit $X \in \chi(M)$. On a vu : si (U, φ) est une carte locale, alors l'application lue dans les cartes est un champs de vecteur Y sur U , $Y = \varphi_*(X)$.

$$\begin{array}{ccc} TU & \longrightarrow & \varphi(U) \times \mathbb{R}^k \\ (x, \xi) & \longmapsto & (\varphi(x), T_x \varphi(\xi)) \\ X \uparrow & & \uparrow Y \\ U & \xrightarrow{\varphi} & \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^k \end{array}$$

Si on a un atlas (U_i, φ_i) de M , on obtient ainsi des champs de vecteurs $Y_i = (\varphi_i)_*(X|_{U_i})$ sur $\varphi_i(U_i)$ ayant la compatibilité sur $\varphi_i(U_i \cap U_j)$, $Y_i = (\varphi_i \circ \varphi_j^{-1})_*(Y_j)$.

Inversement :

Proposition. (Recollement de champs de vecteurs)

Soit M une variété, $(U_i, \varphi_i)_{i \in I}$ un atlas de M et pour tout $i \in I$, Y_i un champ de vecteurs sur l'ouvert $\varphi_i(U_i)$. On suppose : si $U_i \cap U_j \neq \emptyset$, alors sur $\varphi_i(U_i \cap U_j)$, $Y_i = (\varphi_i \circ \varphi_j^{-1})_*(Y_j)$. Alors il existe un champ de vecteurs X sur M tel que $\varphi_{i*}(X|_{U_i}) = Y_i$.

▷ En effet, $X_i = (\varphi_i^{-1})_*(Y_i)$ est un champ de vecteurs sur U_i et la condition dit exactement que $X_i|_{U_i \cap U_j} = X_j|_{U_i \cap U_j}$. ■

2.3.5 Crochet de Lie de champs de vecteurs

Définition. (Crochet de Lie de champs de vecteurs)

Soient $X, Y \in \chi(M)$. Soient D_X et D_Y les dérivations correspondantes. Le *crochet de Lie* de X et Y , noté $[X, Y]$, est le champ de vecteurs associé à la dérivation $[D_X, D_Y] = D_X \circ D_Y - D_Y \circ D_X : D_{[X, Y]} = [D_X, D_Y]$.

Exemple. (Crochet de Lie de champs d'un ouvert de \mathbb{R}^n)

Sur U ouvert de \mathbb{R}^n muni d'une base (e_1, \dots, e_n) , $X = \sum_{i=1}^n X_i e_i$ avec $X_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^∞ , $Y = \sum_{i=1}^n Y_i e_i$, $Z = [X, Y] = \sum_{i=1}^n Z_i e_i$. On a :

$$Z_j = \sum_{i=1}^n (X_i \frac{\partial Y_j}{\partial x_i} - Y_i \frac{\partial X_j}{\partial x_i}).$$

En effet, $D_X = \sum_{i=1}^n X_i \frac{\partial}{\partial x_i}$, $D_Y = \sum_{i=1}^n Y_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ et $D_X \circ D_Y(g) = D_X(\sum_{j=1}^n Y_j \frac{\partial g}{\partial x_j}) = \sum_{i=1}^n X_i (\sum_{j=1}^n \frac{\partial Y_j}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial x_j} + \sum_{j=1}^n Y_j \frac{\partial^2 g}{\partial x_i \partial x_j})$. On utilise le théorème de Schwartz pour conclure.

Comme tout crochet de Lie, celui des champs de vecteurs n'est pas associatif, mais vérifie :

Propriété. (Identité de Jacobi pour les champs de vecteurs)

Soient $X, Y, Z \in \chi(M)$. On a :

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

▷ La vérification est immédiate en passant par les dérivations! ■

Propriété. (Dualité et crochet de Lie de champs de vecteurs)

Soient $X, Y \in \chi(M)$, $\phi : M \rightarrow N$ un difféomorphisme. Alors

$$\phi_*([X, Y]) = [\phi_*(X), \phi_*(Y)].$$

▷ De même. ■

2.3.6 Flot d'un champ de vecteurs

2.3.6.1 Équation différentielle sur un ouvert de \mathbb{R}^n

Soit U un ouvert de \mathbb{R}^n . Soit X un champ de vecteurs, *i. e.* $X : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe C^∞ . On cherche des courbes $c : I \rightarrow U$ de classe C^∞ , avec I un intervalle ouvert contenant 0, telles que pour tout $t \in I$, $c'(t) = X(c(t))$ avec une *condition initiale* $c(0) = x_0$ où l'on s'est fixé un $x_0 \in U$.

Théorème. (Théorème de Cauchy-Lipschitz)

Avec X et x_0 comme ci-dessus, il existe I intervalle ouvert $\ni 0$, $c : I \rightarrow U$ C^∞ tels que $c'(t) = X(c(t))$ pour tout $t \in I$, $c(0) = x_0$. De plus, deux telles solutions coïncident sur l'intersection de leurs domaines de définition.

Ceci permet, pour $x_0 \in U$ donné, de considérer la solution maximale issue de x_0 , *i. e.* $c_{x_0} : I_{x_0} \rightarrow U$ où I_{x_0} est un intervalle maximal pour les c , $c(0) = x_0$.

Théorème. (Flot d'un champ de vecteurs sur un ouvert)

Soit $\Omega = \bigcup_{x \in U} I_x \times \{x\} \subseteq \mathbb{R} \times U$. Alors Ω est un ouvert de $\mathbb{R} \times U$ et l'application $\phi : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^n$ avec $(t, x) \mapsto c_x(t)$ est C^∞ .

Définition. (Flot d'un champ de vecteurs sur un ouvert)

Cette application ϕ est appelée le *flot* de X .

Remarque. Puisque Ω est ouvert, pour tout $x \in U$, il existe $\varepsilon > 0$ et V voisinage ouvert de x tel que $] -\varepsilon, \varepsilon[\times V \subseteq \Omega$, i. e. $\forall y \in V,] -\varepsilon, \varepsilon[\subseteq I_y$ intervalle fixe valable pour tous les y de V .

Pour $t \in \mathbb{R}$, soit $V_t = \{x \in U \mid (t, x) \in \Omega\}$ ouvert. Alors $x \in V_t \Leftrightarrow t \in I_x$ et l'on a une application $V_t \longrightarrow U, x \mapsto \phi(t, x) = \phi_t(x) = c_x(t)$.


Motivation.

FIGURE 2.3.1 : Théorème de Cauchy-Lipschitz et flot. —
On réapplique l'existence en $c_x(t)$.

Proposition

- (1) Soit $x \in U, t \in I_x$. Alors $I_{\phi_t(x)} = I_{c_x(t)} = I_x - t$ translaté.
- (2) $t + s \in I_x \Leftrightarrow s \in I_{\phi_t(x)}$ et $\phi_s(\phi_t(x)) = \phi_{s+t}(x)$. Ainsi ϕ_t est un difféomorphisme de V_t sur son image.

▷ Pour le premier point, supposons $I_x =] -a, b[$ avec $a, b > 0$, éventuellement infinis, par exemple $0 < t < b$. Posons $d(s) = c_x(t + s)$ défini sur $] -a - t, b - t[$, $d(0) = c_x(t)$. Alors $d'(s) = \frac{d}{ds} c_x(t + s) = c'_x(t + s) = X(c_x(t + s)) = X(d(s))$. Ainsi d est une solution de l'équation différentielle issue de $c_x(t) = \phi_t(x)$. Ceci donne $I_x - t =] -a - t, b - t[\subseteq I_{\phi_t(x)}$. La solution maximale issue de $\phi_t(x)$ est $s \mapsto \phi_s(\phi_t(x))$. En particulier, $d(s) = \phi_s(\phi_t(x)) = \phi_{s+t}(x)$ pour $s \in I_x - t$. En particulier, pour $s = -t$, $\phi_{-t}(\phi_t(x)) = \phi_0(x) = x$. Ainsi, ϕ_t est un difféomorphisme sur V_t . En suite,

on refait comme ci-dessus avec $(-t, \phi_t(x))$ au lieu de (t, x) . On obtient $I_{\phi_t(x)} + t \subseteq I_x$. ■

VOC Dans la preuve ci-dessus, on dit que (ϕ_t) est un *groupe local à un paramètre*.

Définition. (Champ de vecteurs complet)

On dit que le champ de vecteurs X est *complet* si pour tout $x \in U$, $I_x = \mathbb{R}$. Alors pour tout $t \in \mathbb{R}$, on dispose du difféomorphisme ϕ_t ($V_t = U \forall t$) et $(\phi_t)_{t \in \mathbb{R}}$ est un groupe à un paramètre de difféomorphismes, *i. e.* on a un morphisme de groupes de $(\mathbb{R}, +)$ dans Difféo qui à $t \mapsto \phi_t$.

On cherche à décrire les opérations inverses.

Proposition

Soit U un ouvert de \mathbb{R}^n , $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times U$ ouvert contenant $\{0\} \times U$ et $h : \Omega \rightarrow U$ de classe C^∞ tel que $h(0, x) = x$ et $h(s, h(t, x)) = h(s + t, x)$ dès que les deux membres sont définis. On pose, pour $x \in U$, $\chi(x) = \frac{d}{dt} h(t, x)|_{t=0}$. Alors X est un champ de vecteurs sur U , appelé *générateur infinitésimal* de h , et le flot de X est donné pour h .

▷ $t \mapsto c_x(t) = h(t, x)$ définie pour t assez petit est une courbe C^∞ issue de x . De plus, $\frac{d}{dt} c_x(t) = \frac{d}{ds} c_x(t + s)|_{s=0} = \frac{d}{ds} h(t + s, x)|_{s=0} = \frac{d}{ds} h(s, h(t, x))|_{s=0} = X(h(t, x))$. ■

2.3.6.2 Image par un difféomorphisme... again

Propriété. (Image d'un flot par un difféomorphisme)

Soient U, V ouverts de \mathbb{R}^n et $f : U \rightarrow V$ un difféomorphisme. Soit X un champ de vecteurs sur U , d'où l'on tire $f_*(X)$ un champ de vecteurs sur V . Soit (ϕ_t) le groupe local à un paramètre associé à X , (ψ_t) le groupe local à un paramètre associé à $f_*(X)$. Alors $\psi_t = f \circ \phi_t \circ f^{-1}$.

▷ Soit $y \in V$. Il faut voir que $t \mapsto f \circ \phi_t(f^{-1}(y))$ est la courbe intégrale issue de y pour le champ $f_*(X)$. Or $\frac{d}{dt} (f(\phi(t, f^{-1}(y))))|_{t=0} = T_{\phi_t \circ f(y)} f(X(f^{-1}(y))) = f_*(X)(y)$. ■

2.3.6.3 Flot d'un champ de vecteurs sur une variété

Définition. (Équation différentielle sur une variété)

Soit M une variété, $X : M \rightarrow TM$ un champ de vecteurs et $a \in M$. Une solution de l'équation différentielle sur M définie par X est un couple (I, c) où I est un intervalle ouvert, $0 \in I$ et $c : I \rightarrow M$ est C^∞ avec $c(0) = a$ et $c'(t) = X(c(t))$. C'est appelé *courbe intégrale* de X .

En se plaçant dans des cartes locales, on montre :

Théorème. (Théorème de Cauchy-Lipschitz sur des variétés)

Soit M une variété, $X : M \rightarrow TM$ et $a \in M$. Alors :

- (1) Il existe un intervalle ouvert $I \ni 0$ et une solution $c : I \rightarrow M$ avec $c(0) = a$.
- (2) Si $c_1 : I_1 \rightarrow M$ est une autre solution avec de même $c_1(0) = a$, alors c_1 et c coïncident sur $I \cap I_1$.

Ainsi, on dispose de la notion de solution maximale issue d'un point a et pour $a \in M$, de l'intervalle maximal I_a .

Définition. (Flot d'un champ de vecteurs sur une variété)

On définit $\Omega = \bigcup_{a \in M} I_a \times \{a\} \subseteq \mathbb{R} \times M$, ouvert et $\phi : \Omega \rightarrow M$ qui à $(t, a) \mapsto c_a(t) = \phi_t(a) = \phi(t, a)$ qui est de classe C^∞ .

Lemme. (Uniformité du flot sur les compacts)

On reprend les notations ci-dessus.

Soit $K \subseteq M$ compact. Alors il existe $\varepsilon > 0$ et U un ouvert de M contenant K tels que $] - \varepsilon, \varepsilon[\times U \subseteq \Omega$ et ϕ est C^∞ sur $] - \varepsilon, \varepsilon[$.

▷ Soit $a \in K$. Il existe $\varepsilon_a > 0$ et U_a un ouvert de M contenant a tel que $] - \varepsilon_a, \varepsilon_a[\times U_a \subseteq \Omega$. Les $(U_a)_{a \in K}$ forment un recouvrement ouvert de K , d'où un recouvrement fini $U_{a_1} \cup \dots \cup U_{a_p} \supseteq K$. Alors $U = U_{a_1} \cup \dots \cup U_{a_p}$ ouvert convient et $\varepsilon = \min(\varepsilon_{a_1}, \dots, \varepsilon_{a_p})$ convient. ■

Théorème. (Complétude des champs de vecteurs compact)

Soit M une variété compacte. Alors tout champ de vecteurs sur M est complet.

En particulier, pour tout $X \in \chi(M)$, on dispose d'un groupe à un paramètre $(\varphi_t^X)_{t \in \mathbb{R}}$ de difféomorphisme de M .

▷ D'après le lemme, il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $x \in M$, $] - 2\varepsilon, 2\varepsilon[\subseteq I_x$. On veut que pour tout $x \in M$, $I_x = \mathbb{R}$. Soit $a \in M$, $I_a \neq \mathbb{R}$, par exemple $I_a =] - \alpha, \beta[$, $\beta < +\infty$ et $t = \beta - \varepsilon$. Considérons $c_a(t)$. On sait que pour tout $\delta < \varepsilon$, $\phi(s, c_a(t))$ est défini et $\phi(s, \phi_t(a)) = \phi(s + t, a)$ avec $s + t < \beta$. Ainsi, on peut prolonger $u \mapsto \phi(u, a)$ au delà de β via $\phi(u - t, c_a(t))$, ce qui contredit la maximalité. ■

Légèrement plus généralement.

Propriété. (Complétude des champs de vecteurs à support compact)

Soit M une variété et $X \in \chi(M)$ à support compact. Alors X est complet.

▷ On suppose qu'il existe K compact tel que $X(m) = 0$ si $m \notin K$. Si $m \notin K$, la courbe constante $t \mapsto m$ est solution, d'où, si $x \in K$, la courbe c_x reste dans K et on ramène au théorème précédent. ■

Propriété. (Théorème des bouts pour les variétés)

Soit M une variété, $X \in \chi(M)$, $\phi : \Omega \rightarrow M$ son flot. Soit $K \subseteq M$ compact. On suppose que $m \in M$ est tel que $I_m \cap [0, +\infty[=]0, b[$ avec $b < +\infty$. Alors il existe $t_K \in]0, b[$ tel que pour tout $t \in]t_K, b[$, $\phi(t, m) \notin K$.

▷ D'après le lemme, il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $x \in K$, $] -\varepsilon, \varepsilon[\subseteq I_x$. On peut prendre $\varepsilon < b$ sans problème. On pose $t_K = b - \varepsilon > 0$. Si $t \in]t_K, b[$, $I_{\phi_t(m)} = I_m - t =]b - t, b[$ où $b - t < b - t_K = \varepsilon$. On n'a pas $] -\varepsilon, \varepsilon[\subseteq I_{\phi_t(m)}$, donc $\phi_t(m) \notin K$. ■

2.3.6.4 Une application

Théorème

Soit M une variété différentielle compacte et $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction C^∞ . Pour $a \in \mathbb{R}$, on pose $M^a = \{x \in M \mid f(x) \leq a\}$. Supposons $a < b$ tel que $f^{-1}([a, b])$ ne contient pas de points critiques de f . Alors il existe un difféomorphisme ϕ de M qui envoie M^a sur M^b .

▷ Pour tout $x \in f^{-1}([a, b])$, $T_x f \neq 0$. On sait également que M compacte peut être vue comme une sous-variété d'un certain \mathbb{R}^N . On a $T_x f \in (T_x M)^*$ et si $M \subseteq \mathbb{R}^N$, $T_x M \subseteq \mathbb{R}^N$. On munit \mathbb{R}^N , et donc chaque $T_x M$ d'une structure euclidienne, d'où le gradient de $f : \Delta f(x) \in T_x M$ défini par : pour tout $v \in T_x M$, $\langle \Delta f(x), v \rangle = T_x f(v)$. On dispose ainsi d'un champ de vecteurs $x \mapsto \Delta f(x)$ sur M . Soit $K = f^{-1}([a, b])$ compact, car fermé dans M . Posons $U = \{x \mid \Delta f(x) \neq 0\}$ ouvert contenant K . Soit donc g une fonction plateau avec $g = 1$ sur K , à support dans U . On pose pour $x \in M : \chi(x) = g(x) \cdot \frac{\Delta f(x)}{\|\Delta f(x)\|^2}$. Soit $\phi : \mathbb{R} \times M \rightarrow M$ le groupe à une paramètre donné par le flot de X , M étant compacte. Posons $t \mapsto f(\phi_t(x)) = h(t)$ et $h'(t) = T_{\phi_t} f(\chi(\phi_t(x))) = \langle \Delta f(\phi_t(x)), g(\phi_t(x)) \frac{\Delta f(\phi_t(x))}{\|\Delta f(\phi_t(x))\|^2} \rangle = g(\phi_t(x)) \in [0, 1]$. Si $\phi_t(x) \in K$, i. e. si $f(\phi_t(x)) \in [a, b]$, alors $h'(t) = 1$. De plus, $h(t) - h(a) = \int_a^t h'(s) ds = t - a$, i. e. ϕ_{b-a} envoie M^a sur M^b . ■

2.3.6.5 Redressement d'un champ de vecteurs

Propriété

Soit M une variété, X un champ de vecteurs et $a \in M$ tel que $\chi(a) \neq 0$. Alors il existe une carte (U, φ) en a telle que le champ X lu dans la carte est constant, i. e. $\varphi_*(X|_U)$ soit constant sur l'ouvert $\varphi(U)$.

▷ Dans le cas d'un ouvert de \mathbb{R}^n , on peut supposer $a = 0$, $X(0) = (X^1(0), \dots, X^n(0))$ et l'on peut supposer $X^1(0) \neq 0$. On veut trouver un difféomorphisme G défini sur un voisinage ouvert de 0 tel que $G_*(X) = e_1 = (1, 0, \dots, 0)$. Soit (ϕ_t) le groupe local associé à X . (L'intérêt est que les courbes intégrales de e_1 sont $\varphi_t(x_1, \dots, x_n) = (x_1 + t, x_2, \dots, x_n)$). Heuristiquement, dans le cas d'un champ constant, on peut utiliser les variables comme paramètres.) On fabrique, à partir de X , un difféomorphisme $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ qui à $(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \varphi_t(0, x_2, \dots, x_n)$. F est un difféomorphisme local au voisinage de zéro. On considère $dF(0)$. Sa jacobienne en zéro est la matrice compagnon dont la première colonne est $X(0)$. Son déterminant est donc $X^1(0) \neq 0$. Par le théorème d'inversion locale pour les sous-variétés, F est un difféomorphisme local. Prenons $G = F^{-1}$ sur les voisinages obtenus ci-dessus. Quel est $G_*(X)$? On sait que c'est le générateur infinitésimal du groupe à un paramètre obtenu à partir de celui de X en conjuguant par G , i. e. $t \mapsto F^{-1} \circ \varphi_t \circ F$. Pour $x \in U$, $\frac{d}{dt} F^{-1} \circ \varphi_t \circ F(x)|_{t=0} = \frac{d}{dt} F^{-1} \circ \varphi_t \circ \varphi_{x_1}(0, x_2, \dots, x_n)|_{t=0} = \frac{d}{dt} F^{-1}(\underbrace{\varphi_{t+x_1}(0, x_2, \dots, x_n)}_{F(t+x_1, x_2, \dots, x_n)})|_{t=0} = \frac{d}{dt} (x_1 + t, x_2, \dots, x_n) = (1, 0, \dots, 0)$. ■

2.3.6.6 Image d'un champ de vecteurs par un flot

Proposition

Soit X un champ de vecteurs sur une variété M , ϕ_t son flot. Alors $(\phi_t)_*(X) = X$.

▷ $\frac{d}{dt} \phi_t(x) = X(\phi_t(x))$, d'où la formule $(\phi_t)_*(X)(x) = T_{\phi_t^{-1}(x)} \phi_t(X(\phi_t^{-1}(x)))$. On a $\frac{d}{dt} = \frac{d}{ds} \phi_{t+s}(x)|_{s=0} = \frac{d}{ds} \phi_t \circ \phi_s(x) = T_x \phi_t(X(x)) = X(\phi_t(x))$ où $X(x) = T_{\phi_t(x)} \phi_t^{-1}(X(\phi_t(x)))$. ■

On donne la formule générale que l'on admettra.

Proposition

Soient X, Y deux champs de vecteurs et ϕ_t^X, ϕ_t^Y leurs groupes locaux à un paramètre. Alors $\frac{d}{dt} (\phi_t^X)_*(Y)|_{t=0} = [X, Y]$.

⊗ (Idée de la preuve.) Cette fois, on passe par les dérivations : $D_{[X,Y]} = D_X D_Y - D_Y D_X$. ■

2.4 Formes différentielles

2.5 Groupes de Lie

Dans la suite, toutes les variétés seront supposées C^∞ .

2.5.1 Définition, premiers exemples

Définition. (Groupe de Lie)

Un *groupe de Lie* G est une variété C^∞ munie d'une structure de groupe telle que les applications $m : G \times G \longrightarrow G$ et $\text{inv} : G \longrightarrow G$ sont C^∞ .

$$(x, y) \longmapsto xy \qquad x \longmapsto x^{-1}$$

Définition. (Morphisme de groupes de Lie)

Un *morphisme (de Lie)* entre deux groupes de Lie est un morphisme entre ces groupes qui soit une application de classe C^∞ .

Définition. (Sous-groupe de Lie)

Un *sous-groupe de Lie* d'un groupe de Lie est un sous-groupe de ce groupe qui en est aussi une sous-variété.

Exemples. (Groupes de Lie)

1. $GL_n(\mathbb{R})$ est un groupe de Lie.
2. $SL_n(\mathbb{R})$ est un groupe de Lie.
3. $\mathcal{O}(n, \mathbb{R}), \mathcal{U}(n, \mathbb{C}), SO(n, \mathbb{R}), SU_n(\mathbb{C})$, sont des groupes de Lie.

2.5.2 Translations à gauche & à droite, champ de vecteurs invariants

Définition. (Translations latérales dans un groupe de Lie)

Soit G un groupe de Lie. Pour $g \in G$, les applications $L_g : G \longrightarrow G$ et

$$h \longmapsto gh$$

$R_g : G \longrightarrow G$ sont C^∞ et sont des difféomorphismes, appelées translations à gauche

$$h \longmapsto hg$$

et à droite par g .

Proposition

$$\text{On a : } L_{g_1} \circ L_{g_2} = L_{g_1 g_2}, R_{g_1} \circ R_{g_2} = R_{g_2 g_1}.$$

Proposition

$$\text{On a : } L_g R_h = R_h L_g.$$

Définition. (Champ de vecteurs invariant)

Un champ de vecteurs X sur G est dit *invariant* à gauche, respectivement à droite, si pour tout $g \in (L_g)_*(X) = X$, respectivement $(R_g)_*(X) = X$. Ceci s'écrit : $X(gh) = T_h L_g(X(h))$. Ainsi, X est complètement déterminé par sa valeur $X(e)$ en l'élément neutre $X(g) = T_e L_g(X(e))$.

Proposition

Notons $\mathcal{G} = T_e G$. L'application $X \mapsto X(e) \in \mathcal{G}$ est un isomorphisme de l'espace des champs de vecteurs invariants à g avec \mathcal{G} .

▷ Soit $\mathfrak{X}(G)$ l'ensemble des champs de vecteurs sur G et $\mathfrak{X}(G)^{\text{inv}}$ le sous-ensemble de ceux invariants à g . Alors l'application $X \mapsto X(e)$ de $\mathfrak{X}(G)^{\text{inv}}$ sur \mathcal{G} est linéaire injective grâce à ce qui précède. De plus, elle est surjective : si $v \in \mathcal{G}$, on pose $X(g) = T_e L_g(v) \in T_g G$. Il est bien invariant à gauche : $X(gh) = T_e L_{gh}(v)$ grâce à $L_{gh} = L_g \circ L_h$ et $T_e(L_{gh}) = T_h L_g \circ T_e L_h$. Il faut encore s'assurer que $g \mapsto X(g)$ est bien C^∞ . ■

On en déduit :

Proposition

Tout groupe de Lie est une variété parallélisable.

▷ Il faut trouver, si $n = \dim(G)$, n champs de vecteurs X_1, \dots, X_n sur G tels que $(X_1(g), \dots, X_n(g))$ soit une base de $T_g G$. On a $\dim(T_e G) = n$. Soit (e_1, \dots, e_n) une base de $\mathcal{G} = T_e G$. On considère les champs invariants à g associés : $X_k(g) = T_e L_g(e_k)$: c'est une famille libre, car $T_e L_g : T_e G \rightarrow T_g G$ est inversible. Ainsi $TG \simeq G \times \mathcal{G}$ par $(g, T_e L_g(v)) \longleftarrow (g, v)$. ■

Proposition. (Invariance du crochet de Lie)

Le crochet $[X, Y]$ de deux champs de vecteurs invariants à gauche (resp. à droite) est encore invariant à gauche (resp. à droite).

▷ On a vu que si φ est un difféomorphisme, $\varphi_*([X, Y]) = [\varphi_*(X), \varphi_*(Y)]$. ■

2.5.3 Flot d'un champ de vecteurs invariant à gauche et sous-groupe à un paramètre d'un groupe de Lie

Définition. (Sous-groupe à un paramètre d'un groupe de Lie)

Un sous-groupe à un paramètre d'un groupe de Lie G est un morphisme de $(\mathbb{R}, +)$ vers G .

Exemple

Pour $G = GL_n(\mathbb{R})$, tout groupe à un paramètre est de la forme $t \mapsto \exp(tA)$ pour une $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$.

Remarque importante. Si $f : (\mathbb{R}, +) \rightarrow G$ est un sous-groupe à un paramètre de G , on lui associe un groupe à un paramètre de difféomorphismes de $G : \phi_t(g) = g \cdot f(t)$, i. e. $\phi(t) = R_{f(t)}$.

Théorème

1. Si $f : \mathbb{R} \rightarrow G$ est un sous-groupe à un paramètre, alors le générateur infinitésimal du groupe à un paramètre de difféomorphisme $\phi_t(g) = gf(t)$ est un champ de vecteurs invariant à g .
2. Inversement, si X est un champ de vecteurs invariant à gauche, le groupe à un paramètre de difféomorphisme est défini sur $\mathbb{R} \times G$ et il est donné par un sous-groupe à un paramètre de G , i. e. $\phi_t^\times(g) = g \cdot f_X(t)$ où $f_X(t)$ est un sous-groupe à un paramètre de G , $f_X(t) = \phi_t^\times(e)$.

▷ Pour le premier point, $\phi_t(g) = g \cdot f(t)$. On sait que le générateur infinitésimal est donné grâce à $\frac{d}{dt}\phi_t(g) = X(\phi_t(g))$. Or $\frac{d}{dt}(gf(t)) = \frac{d}{dt}L_g(f(t)) = T_{f(t)}L_g(f'(t))$. En $t = 0$, $X(g) = T_eL_g(f'(0))$. C'est exactement la forme des champs invariants à g .

Inversement, soit X un champ de vecteurs invariants à g . On regarde son flot. Il est défini sur $I_e \times G$, i. e. pour tout $g \in G$, $I_e \subseteq I_g$, et il est donné par $(t, g) \mapsto g \cdot \phi_t(e)$ où $\phi_t(e)$ est une courbe issue de g , dans G . C'est-à-dire que l'on a $\phi_t(g) = g \cdot \phi_t(e)$. Pour le voir, comme en $t = 0$, ces deux courbes valent g , il suffit de voir qu'elles satisfont à la même équation différentielle $\frac{d}{dt}(g, \phi_t(e)) = \frac{d}{ds}(g \cdot \phi_{s+t}(e))|_{s=0} = \frac{d}{ds}(g \cdot \phi_s \circ \phi_t(e))|_{s=0} = T_{\phi_t(e)}L_gX(\phi_t(e)) = X(g \cdot \phi_t(e))$, car X est invariant à g . Par ailleurs, par définition, $\frac{d}{dt}\phi_t(g) = X(\phi_t(g))$, d'où, pour $t \in I_e$, $\phi_t(g) = g \cdot \phi_t(e)$. En particulier, pour tout $g \in G$, $I_e \subseteq I_g$. On a vu, de façon générale, $I_{\phi_t(e)} = I_e - t$ d'où $I_e \subseteq I_e - t$ pour tout $t \in I_e$, $I_e + t \subseteq I_e$, d'où $I_e = \mathbb{R}$. ■

2.5.4 Algèbre de Lie

Définition. (Algèbre de Lie)

C'est un espace vectoriel \mathcal{G} muni d'une application bilinéaire $[\cdot, \cdot] : \mathcal{G} \times \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}$ qui est alternée/antisymétrique et satisfait à l'identité de Jacobi :

$$\forall X, Y, Z \in \mathcal{G}, \quad [X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

Définition. (Sous-algèbre de Lie)

Une sous-algèbre de Lie est un sev stable par $[\cdot, \cdot]$.

Définition. (Morphisme d'algèbre de Lie)

Un morphisme d'algèbre de Lie est une application $f : \mathcal{G}_1 \longrightarrow \mathcal{G}_2$ linéaire telle que $f([X, Y]) = [f(X), f(Y)]$.

Exemples. (Algèbres de Lie)

1. Soit A une algèbre associative. Pour tous $X, Y \in A$, $[XY] = XY - YX$ convient.
2. Soit A une algèbre, alors l'algèbre de ses dérivations $\text{Der}(A)$ muni du crochet de Lie déjà rencontré, convient.
3. Soit M une variété. Alors $\mathfrak{X}(G)$ est une algèbre de Lie
4. Soit G un groupe de Lie. Alors \mathcal{G} est une algèbre de Lie.

2.5.5 Quelques calculs d'applications linéaires tangentes

2.5.5.1 La multiplication

On considère $m : G \times G \longrightarrow G$. Calculons $T_{(e,e)}m : \mathcal{G} \times \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}$. Soient $t \mapsto a(t)$, $t \mapsto b(t)$ courbes dans G issues de e . $a'(0), b'(0) \in \mathcal{G}$. Ainsi $T_{(e,e)}(m)(a'(0), b'(0)) = a'(0) + b'(0)$. En effet, $m(a(t), b(t)) = c(t) = a(t)b(t)$ et l'on calcul $\frac{d}{dt}m(a(t), b(t))|_{t=0}$. De façon générale, $T_{(e,e)}m(u, v) = T_{(e,e)}m(u, 0) + T_{(0,e)}m(0, v)$, car $(u, v) = (u, 0) + (0, v)$ et $T_{(e,e)}m(a'(0), 0) = \frac{d}{dt}m(a(t), e) = \frac{d}{dt}(a(t)|_{t=0}) = a'(0)$.

Calculons maintenant $T_{(g,e)}m : T_gG \times T_eG \longrightarrow T_gG$ qui à $(v, w) \mapsto v + T_eL_g(w)$. Si $t \mapsto c(t)$ est une courbe issue de g , alors $c(t) = g.a(t)$ où $t \mapsto a(t)$ est issue de e , $c'(0) = v$. Soit $t \mapsto b(t)$ une courbe issue de e , $b'(0) = w$. Alors $\frac{d}{dt}c(t)b(t)|_{t=0} = \frac{d}{dt}g(a(t)b(t))|_{t=0} = \frac{d}{dt}(L_g(a(t)b(t)))|_{t=0} = T_eL_g(\frac{d}{dt}(a(t)b(t))) = T_eL_g(a'(0) + b'(0)) = c'(0) + T_eL_g(b'(0)) = v + T_eL_g(w)$.

Maintenant, soit $t \mapsto a(t)$ une courbe issue de e . Le vecteur tangent en g à la courbe $t \mapsto a(t)ga(t)^{-1}$ est $T_eR_g(a'(0)) = T_eL_g(a'(0))$. En effet, $a(t)ga(t)^{-1} = m(a(t), g, a(t)^{-1})$

et $\frac{d}{dt}(a(t)^{-1})|_{t=0} = -a'(0)$. On a ainsi la composée $t \mapsto (a(t)g, a(t)^{-1})$ de dérivée $(T_e R_g(a'(0)), -a'(0))$ avec m , où il faut prendre la différentielle en (g, e) . On obtient ainsi $T_e R_g(a'(0)) + T_e L_g(-a'(0))$.

Un dernier fait utile. Soient $x, g \in G$. Le vecteur tangent en xg à la courbe $t \mapsto xa(t)ga(t)^{-1} = L_x(a(t)ga(t)^{-1})$ est $T_g L_x(T_e R_g(a'(0)) - T_e L_g(a'(0))) = T_x R_g T_e L_x(a'(0)) - T_e(L_{xg})(a'(0))$.

2.5.6 Actions d'un groupe de Lie sur lui-même et sur \mathcal{G}

2.5.6.1 Définitions

Proposition. (Régularité de la conjugaison)

Dans un groupe de Lie, les automorphismes intérieurs sont des applications C^∞ . C'est donc un difféomorphisme.

▷ En effet, ils s'expriment sous la forme $L_g R_{g^{-1}}$ pour les $g \in G$. ■

Définition. (Adjoint dans un groupe de Lie)

Soit G un groupe de Lie et $g \in G$. On appelle $\text{Ad}(g) : T_e G \rightarrow T_e G$ sa différentielle en e .

Remarque importante. Cherchons $\text{Ad}(g)(X)$. Soit $t \mapsto a(t)$ une courbe issue de e avec $a'(0) = X$. Alors $\text{Ad}(g)(X) = \frac{d}{dt}(g \cdot a(t)g^{-1})|_{t=0}$.

On dispose maintenant d'une application $\text{Ad} : G \rightarrow \text{End}(T_e G)$. Elle est C^∞ , car différentielle d'une application C^∞ .

Définition. (Adjonction dans un groupe de Lie)

La différentielle de Ad en e est notée $T_e \text{Ad} = \text{ad} : \mathcal{G} \rightarrow \text{End}(\mathcal{G})$.

Proposition. (Adjoint du produit)

Soient $g_1, g_2 \in G$. Alors $\text{Ad}(g_1 g_2) = \text{Ad}(g_1) \circ \text{Ad}(g_2)$.

▷ $\text{Ad}(g_1 g_2)(X) = \frac{d}{dt}(g_1 \underbrace{g_2 a(t) g_2^{-1}}_{b(t)} g_1^{-1}) = \text{Ad}(g_1) \left(\frac{d}{dt} b(t) \right) = \text{Ad}_{g_1}(\text{Ad}(g_2)(X))$. ■

Concrètement, $X, Y \in \mathcal{G} = T_e G$ et $\text{ad}(X)(Y) = \frac{d}{dt}(\text{Ad}(a(t))(Y))|_{t=0}$. Pour $t \mapsto b(t)$ courbe issue de e avec $b'(0) = Y$ et $t \mapsto a(t)$ courbe issue de e avec $a'(0) = X$,

$$\boxed{\text{ad}(X)(Y) = \frac{d}{dt} \left(\frac{d}{ds} a(t) b(s) a(t)^{-1} \right)_{s=0, t=0} .}$$

On a aussi : $\forall X, Y \in \mathcal{G}, \text{ad}(X)(Y) \in \mathcal{G}$.

On dispose aussi du crochet, via identification de \mathcal{G} avec champs de vecteurs invariants à gauche.

Théorème. (Lien adjonction-crochet)

Pour tous $X, Y \in \mathcal{G}$, $\text{ad}(X)(Y) = [X, Y]$.

▷ $[X, Y]$ est l'élément de \mathcal{G} associé au champ de vecteurs invariant à g $[\tilde{X}, \tilde{Y}]$, i. e. à la dérivation $D_{[\tilde{X}, \tilde{Y}]} = D_{\tilde{X}}D_{\tilde{Y}} - D_{\tilde{Y}}D_{\tilde{X}}$. Il faut donc considérer la dérivation associée au champ de vecteurs invariants à gauche $\text{ad}(\tilde{X})(Y)$. On rappelle que $D_{\tilde{X}}f(x) = T_x f(\tilde{X}(x)) = T_x f(T_e L_x(X)) = T_e(f \circ L_x)(X) = \frac{d}{dt} f(x.a(t))|_{t=0}$ où $a(t)$ est une courbe issue de e , $a'(0) = X$. En particulier, $D_{\text{ad}\tilde{X}(Y)}f(x) = T_x f(T_e L_x(\text{ad}(X)(Y)))$. On considère a, b chemins pointés en X, Y et $(t, s) \mapsto f(x, a(t)b(s)a(t)^{-1})$ de classe C^∞ . Alors $\frac{d}{dt} \left(\frac{d}{ds} f(xa(t)b(s)a(t)^{-1}) \right) = \frac{d}{dt} (T_x f T_e L_x \text{Ad}(a(t))(Y))|_{t=0} = T_x f T_e L_x \text{ad}(X)(Y)$. D'après le théorème de Schwarz, c'est aussi $\frac{d}{ds} \frac{d}{dt} (f(xa(t)b(s)a(t)^{-1}))|_{t=0, s=0}$. Or $\frac{d}{dt} f(xa(t)b(s)a(t)^{-1}) = T_{xb(s)} f(T_x R_{b(s)} T_e L_x(X)) - T_{xb(s)} f T_e L_{xb(s)} X$. Le deuxième terme se récrit $T_{xb(s)} f T_e L_{xb(s)}(X) = T_{xb(s)} f(\tilde{X}(xb(s))) = D_{\tilde{X}} f(xb(s))$, et $\frac{d}{ds} (D_{\tilde{X}} f)(xb(s))|_{s=0} = D_{\tilde{Y}} (D_{\tilde{X}} f)(x)$. Pour le premier terme, on veut $\frac{d}{ds} (T_{xb(s)} f T_x R_{b(s)} T_e L_x(X)) = \frac{d}{ds} \left(\frac{d}{dt} f(xa(t)b(s))|_{t=0} \right)|_{s=0} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d}{ds} f(xa(t)b(s))|_{s=0} \right)|_{t=0} = D_{\tilde{Y}} f(x(a(t)))|_{t=0} = D_{\tilde{X}} D_{\tilde{Y}} f(x)$. ■

Exemple

Pour le groupe de Lie $G = \text{SL}(n, \mathbb{R})$, $\mathcal{G} = \{M \in M_n(\mathbb{R}), \text{tr}(M) = 0\}$.

Pour $G = \mathcal{O}(n, \mathbb{R})$, $\mathcal{G} = \{M, M^T = -M\}$.

Pour $G = \text{SU}(n, \mathbb{C})$, $\mathcal{G} = \{M \in M_n(\mathbb{C}), M^* = -M, \text{Tr}(M) = 0\}$.

2.5.7 Application exponentielle

L'application exponentielle, de même que dans la théorie des équations différentielles, permet de faire le lien entre algèbre de Lie et groupe de Lie.

Soit G un groupe de Lie, $\mathcal{G} = T_e G$. Soit $X \in \mathcal{G}$, \tilde{X} champ de vecteurs invariant à g , dont on sait qu'il est complet. Le groupe à un paramètre de difféomorphismes associé à \tilde{X} est de la forme $\phi_t^{\tilde{X}}(g) = g\phi_t^{\tilde{X}}(d)$. De plus, $t \mapsto \phi_t^{\tilde{X}}(e)$ est un sous-groupe à un paramètre du groupe de Lie.

Définition. (Exponentielle dans un groupe de Lie)

On définit :

$$\exp : \mathcal{G} \longrightarrow G$$

$$X \longmapsto \phi_1^{\tilde{X}}(e)$$

Exemple

Pour $G = GL(n, \mathbb{R})$, $\phi_t^{\tilde{X}}(g) = g\phi_t^{\tilde{X}}(I)$, d'où $\frac{d}{dt}\phi_t^{\tilde{X}}(g) = \phi_t^{\tilde{X}}(g)X$.

On a donc à résoudre une équation différentielle linéaire.

On peut décrire la forme des sous-groupes à un paramètre des groupes de Lie, au moyen de l'exponentielle.

Proposition. (Forme des sous-groupes paramétrés de Lie)

Les sous-groupes à un paramètre d'un groupe de Lie G sont de la forme $t \mapsto \exp(tX)$ pour un $X \in \mathfrak{g}$.

▷ On sait a priori qu'ils sont $t \mapsto \phi_t^{\tilde{X}}(e)$. Il suffit de dire que c'est $\exp(tX) = \phi_1^{t\tilde{X}}(e)$. ■

Lemme

Pour $X \in \mathfrak{g}$, $\phi_{st}^{\tilde{X}}(e) = \phi_t^{s\tilde{X}}(e)$.

▷ En effet, fixons s , et considérons les courbes $t \mapsto \phi_t^{s\tilde{X}}(e)$ et $t \mapsto \phi_{st}^{\tilde{X}}(e)$ qui valent e en $t = 0$. Ce sont des sous-groupes à un paramètre de G . Il suffit de voir qu'elles ont mêmes générateurs infinitésimaux. ■

Proposition. (L'exponentielle est un difféomorphisme local en 0)

$\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G$ est un difféomorphisme local en 0 et $T_0 \exp : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ est Id.

▷ $T_0 \exp(X) = \frac{d}{dt} \exp(0 + tX) = \frac{d}{dt} \exp(tX)|_{t=0} = \frac{d}{dt} \phi_1^{t\tilde{X}}(e)|_{t=0} = \frac{d}{dt} \phi_t^{\tilde{X}}(e)|_{t=0} = X$. ■

Propriété. (Composition de l'exponentielle par un morphisme)

Soient G, H deux groupes de Lie d'algèbres de Lie respectives \mathfrak{g} et \mathfrak{h} . Soit $f : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes de Lie. Alors pour tout $X \in \mathfrak{g}$, $f(\exp_G(X)) = \exp_H(T_e f(X))$. Autrement dit,

$$f \circ \exp_G = \exp_H \circ T_e f.$$

▷ On considère les sous-groupes à un paramètre de H . Ils sont donnés par $t \mapsto f(\exp_G(tX))$ et $t \mapsto \exp_H(T_e f(tX))$. Montrons qu'ils ont même générateur. $\frac{d}{dt} f(\exp_G(tX))|_{t=0} = T_e f(\frac{d}{dt} \exp_G(tX)|_{t=0}) = T_e f(X)$. ■

Application. (Exponentielle d'un sous-groupe d'un groupe de Lie)

Si $G \subseteq GL_n(\mathbb{R})$, alors $\exp_G = \exp_{GL_n(\mathbb{R})}|_G$.

Application. (Conjugée de l'exponentielle)

On a, pour $g \in G$, $\text{Ad}(g) = \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$ et $\text{Ad}(g) = T_e i(g)$. Ainsi $\exp(\text{Ad}(g)(X)) = i(g) \exp(X)$, d'où

$$g \exp(X) g^{-1} = \exp(\text{Ad}(g))(X).$$

Application. (Exponentielle de l'adjoint)

$\text{Ad} : G \rightarrow \text{GL}(\mathcal{G})$, $T_e \text{Ad} = \text{ad}$. Ainsi, $\exp(\text{ad}(X)) = \text{Ad}(\exp(X))$, $\text{ad}(X) \in \text{End}(\mathcal{G})$.

Proposition. (Tangente d'un morphisme de Lie)

Soient G, H deux groupes de Lie d'algèbres de Lie \mathcal{G}, \mathcal{H} . Soit $f : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes de Lie. Alors $T_e f : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ est un morphisme d'algèbre de Lie, c'est-à-dire : $T_e f([X, Y]) = [T_e f(X), T_e f(Y)]$, soit $T_e f(\text{ad}(X)(Y)) = \text{ad}(T_e f(X))(T_e f(Y))$.

▷ Pour tous $g \in G$, $X \in \mathcal{G}$, $f(g \exp(tX) g^{-1}) = f(g) f(\exp(X)) = f(g)^{-1}$. On prend la dérivée en $t = 0$. Alors $T_e f \circ \text{Ad}(g)(Y) = \text{Ad}(f(g)) \circ T_e f(Y)$. On prend $g = \exp(sX)$, $X \in \mathcal{G}$. Alors $\frac{d}{ds} T_e f \text{Ad}(\exp(sX))(Y)|_{s=0} = T_e f(\text{ad}(X)(Y)) = \frac{d}{ds} \text{Ad}(f(\exp(sX)))(T_e f(Y))|_{s=0} = \text{ad}(T_e f(X))(T_e f(Y))$. ■

L'application exponentielle n'est pas toujours injective, ni surjective. D'ailleurs, l'image d'un connexe étant connexe, il ne faut pas rêver : on ne peut avoir de résultat de surjectivité que sur des groupes de Lie connexes.

Proposition. (Surjectivité de l'exponentielle de Lie)

Soit G un groupe de Lie connexe. Soit V un voisinage de 0 dans \mathcal{G} sur lequel \exp est un difféomorphisme. Alors G est engendré par $\exp(V)$.

▷ Soit $W = \exp(V) \subseteq G$, voisinage ouvert de e . W^{-1} également. Le groupe engendré par $\exp(V)$ est le sous-ensemble de G formé des produits d'éléments de W et de W^{-1} ; c'est un sous-groupe H de G . Montrons que H est un ouvert fermé. Par fait général, le produit fini d'ouverts est ouvert dans un groupe topologique, donc H est ouvert. H est alors automatiquement fermé dans un groupe topologique. Comme G est connexe, $G = H$. ■

On peut démontrer le fait intéressant suivant qui permet de passer du continu au C^∞ :

Théorème. (Paramétrisation des morphismes continus)

Soit G un groupe de Lie. Alors tout morphisme \underline{G} de $(\mathbb{R}, +)$ vers G est C^∞ et donc un sous-groupe à un paramètre.

On utilise le fait suivant :

Proposition. (Unicité de la racine carrée)

Munissons \mathcal{G} d'une norme. Soit $B(0, 2r)$, $r > 0$, sur laquelle \exp est un difféomorphisme et $V = \exp(B(0, r))$. Alors pour tout $g \in V$, g possède une *unique* racine carrée dans V .

▷ Dans l'image de l'exponentielle, posséder une racine carrée n'a rien d'exceptionnel. Si $g \in V$, toute racine carrée s'écrit $\exp(Y)$ pour $Y \in V$ unique. ■

Preuve.

▷ On va utiliser la densité des dyadiques dans \mathbb{R} . On se place sur $V = \exp(B(0, M))$ où l'on a une racine carrée unique. Soit $f : (\mathbb{R}, +) \rightarrow G$ non trivial : il existe $a > 0$ tel que $f(a) \neq e$. On peut supposer a arbitrairement petit, en fait tel que $f([-a, a]) \subseteq V$. On a $f(\frac{a}{n})^n = f(a) = f(\frac{a}{n})^n$ d'où $f(\frac{a}{n}) \neq e$. En particulier, $f(a) = \exp(aX)$ pour un unique X avec $aX \in B(0, r)$, alors par unicité de la racine carrée, $f(\frac{a}{2}) = \exp(\frac{a}{2}X)$ et $f(\frac{a}{2^n}) = \exp(\frac{a}{2^n}X)$ puis pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $f(\frac{k}{2^n}a) = \exp(\frac{k}{2^n}aX)$ et par densité, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f(ta) = \exp(taX)$ et pour tout $s \in \mathbb{R}$, $f(s) = \exp(sX)$. ■

Théorème. (Théoreme de Cartan)

Soit G un groupe de Lie. Soit H un sous-groupe fermé de G . Alors H est un sous-groupe de Lie d'algèbre de Lie $\mathcal{H} = \{X \in \mathcal{G}, \forall t, \exp(tX) \in H\}$.

Chapitre 3

Exercices

Difficulté des exercices :

- ○ ○ ○ ○ Question de cours, application directe, exercice purement calculatoire sans réelle difficulté technique
- • ○ ○ ○ Exercice faisable, soit intuitivement, soit en employant des moyens rudimentaires ou des techniques déjà vues
- • • ○ ○ Exercice relativement difficile et dont la résolution appelle à une réflexion plus importante à cause d'obstacles techniques ou conceptuels, qui cependant devraient être à la portée de la plupart des étudiants bien entraînés
- • • • ○ Exercice très exigeant, destiné aux élèves prétendant aux concours les plus difficiles, exercice « classique ».
- • • • • La résolution de l'exercice requiert un raisonnement et des connaissances extrêmement avancés, dépassant les attentes du prérequis. Il est presque impossible de le mener à terme sans indication. Bien qu'exigibles à très peu de concours, ces exercices sont très intéressants et présentent souvent des résultats forts.

Première section

★ ★ ★ ★ ☆ **Exercice 1** (Titre de l'exercice s'il en est). Texte de l'exercice.

★ ★ ★ ★ ★ **Exercice 2.** Texte de l'exercice, sans titre

★ ★ ★ ★ ☆ **Exercice 3** (Titre de l'exercice). Texte de l'exercice.

1. Et puis il y a des questions, quand même.
2. Allez une deuxième.

Appendice

Table des matières

1	Différentiabilité	3
1.1	Applications différentiables	3
1.1.1	Rappels sur les applications linéaires continues	3
1.1.2	Définition	3
1.1.3	Classes de régularité	5
1.2	Grands théorèmes du calcul différentiel	5
1.2.1	Lemmes	5
1.2.2	Théorème d'inversion locale, théorème d'inversion globale	5
1.2.3	Théorèmes des fonctions implicites	5
1.2.4	Théorème du rang constant	5
1.2.4.1	Immersion, submersion	7
2	Géométrie différentielle	9
2.1	Sous-variétés de l'espace euclidien	9
2.1.1	Définitions	9
2.1.2	Espace tangent en un point d'une sous-variété	14
2.1.3	Fibré tangent	15
2.1.4	Fibré co-tangent	16
2.1.5	Notion de transversalité	16
2.1.6	Applications différentiables sur des sous-variétés	17
2.1.7	Calcul d'extrema	18
2.1.8	Difféomorphismes entre sous-variétés	19
2.1.9	Cartes locales, atlas	20
2.1.10	Généralisation des théorèmes fondamentaux	22
2.2	Variétés différentielles	23
2.2.1	Notion de variété topologique	23
2.2.2	Notion de variété différentielle et applications différentiables sur des variétés différentielles	26
2.2.3	Sous-variété d'une variété différentielle	29
2.2.4	Variétés à bord	29
2.2.5	Points réguliers, points critiques	29

2.2.6	Espace tangent en un point à une variété M	31
2.2.7	Difféomorphismes, immersions, submersions sur des variétés différentielles et adaptation des grands théorèmes à leur cas	32
2.2.8	Fibré tangent à une variété différentielle	34
2.2.9	Fibrations, fibrés vectoriels	35
2.2.10	Quelques constructions de variétés différentielles : actions de groupe et revêtements	39
2.2.11	Fonctions plateaux et partitions de l'unité	42
2.2.12	Plongement d'une variété compacte dans un \mathbb{R}^n	43
2.3	Champs de vecteurs	44
2.3.1	Dérivations sur une variété et description par rapport aux champs	44
2.3.2	Restriction d'une dérivation à un ouvert	46
2.3.3	Image par un difféomorphisme d'un champ de vecteurs ou d'une dérivation	47
2.3.4	Construction de champs de vecteurs	48
2.3.5	Crochet de Lie de champs de vecteurs	49
2.3.6	Flot d'un champ de vecteurs	50
2.3.6.1	Équation différentielle sur un ouvert de \mathbb{R}^n	50
2.3.6.2	Image par un difféomorphisme... again	52
2.3.6.3	Flot d'un champ de vecteurs sur une variété	52
2.3.6.4	Une application	53
2.3.6.5	Redressement d'un champ de vecteurs	54
2.3.6.6	Image d'un champ de vecteurs par un flot	54
2.4	Formes différentielles	55
2.5	Groupes de Lie	55
2.5.1	Définition, premiers exemples	55
2.5.2	Translations à gauche & à droite, champ de vecteurs invariants	56
2.5.3	Flot d'un champ de vecteurs invariant à gauche et sous-groupe à un paramètre d'un groupe de Lie	57
2.5.4	Algèbre de Lie	58
2.5.5	Quelques calculs d'applications linéaires tangentes	58
2.5.5.1	La multiplication	58
2.5.6	Actions d'un groupe de Lie sur lui-même et sur \mathcal{G}	59
2.5.6.1	Définitions	59
2.5.7	Application exponentielle	60
3	Exercices	65
	Première section	65

Bibliographie

[1] *Titre du livre*, Auteur du livre, date, maison d'édition

Table des figures

2.1.1 Définition par submersion, illustration. —	11
2.1.2 Définition par graphe, illustration. —	11
2.1.3 Définition par redressement, illustration. —	12
2.1.4 Définition par paramétrage, illustration. —	12
2.3.1 Théorème de Cauchy-Lipschitz et flot. —	51

Liste des tableaux