



UNIVERSITÉ
LAVAL

MAT-2400
Méthodes numériques

Devoir 3

11 novembre 2025

Louis-Victor Carrier-Favreau

NI. 537 320 649

Jean-Christophe Parent

NI. ??????????

Table des matières

2. Démonstration que $E(h) \leq Ch^3$	5
---------------------------------------	---

Table des figures

1	Polynome d'interpolation de $f(x)$	2
2	Maximum de l'erreur du polynome d'interpolation de $f(x)$ en fonction de h . . .	3
3	Interpolation quadratique par morceaux $Q_n(x)$ de $f(x)$	4
4	Erreur max de $Q_n(x)$ en fonction de h	5




FIGURE 1 – Polynome d'interpolation de $f(x)$

On voit que le polynome d'interpolation ne converge pas vers $f(x)$ lorsque $n \rightarrow \infty$. En fait, comme l'interpolation est un polynome de degré n on voit que si $P_n(x) \rightarrow f(x)$ ($n \rightarrow \infty$) alors $P_n \rightarrow T_0(x)$ ($n \rightarrow \infty$) où $T_0(x)$ est le polynome de Taylor de f en 0. Cependant f est discontinue en $x = \pm i$ comme Mathieu l'a mentionné en classe. Donc par le théorème de Taylor le rayon de convergence est $R = |i|$. Comme l'interpolation est sur $[-5, 5]$ qui est en dehors de $D_1(0) \subset \mathbb{C}$ l'interpolation ne peut pas converger vers $T_0(x)$.




FIGURE 2 – Maximum de l'erreur du polynome d'interpolation de $f(x)$ en fonction de h




FIGURE 3 – Interpolation quadratique par morceaux $Q_n(x)$ de $f(x)$




FIGURE 4 – Erreur max de $Q_n(x)$ en fonction de h

La figure montre que $E(h)$ diminue proportionnellement à h^3 . On observe le comportement attendu entre l'erreur et la courbe de référence ce qui confirme que l'interpolation quadratique par morceaux converge avec un ordre de 3, comme démontré ci-bas.

2. Démonstration que $E(h) \leq Ch^3$

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$|f'''(x)| \leq M \quad (M > 0)$$

$$E(h) := \max_{-5 \leq x \leq 5} |f(x) - Q_n(x)|$$

Travaillons sur $I = [x_i, x_{i+2}] \subset [-5, 5]$. Soit $\xi_x \in I$.

$$\begin{aligned} |f(x) - Q_n(x)| &= \left| \frac{f'''(\xi_x)}{3!} (x - x_i)(x - x_{i+1})(x - x_{i+2}) \right| \\ &= \left| \frac{f'''(\xi_x)}{3!} (x - x_i)(x - (x_i + h))(x - (x_i + 2h)) \right| \\ &= \left| \frac{f'''(\xi_x)}{3!} (x - x_i)((x - x_i) - h)((x - x_i) - 2h) \right| \\ &\leq \left| \frac{M}{3!} (x - x_i)((x - x_i) - h)((x - x_i) - 2h) \right| \end{aligned}$$

Comme $|x - x_i| \leq 2h$ on trouve que $|x - x_i - h| \leq h$ et $|x - x_i - 2h| \leq h$ et donc

$$\begin{aligned} |f(x) - Q_n(x)| &\leq \frac{M}{3!} 2h \times h \times 2h \\ &= \frac{2M}{3} h^3 \\ &= Ch^3 \quad \left(C = \frac{2M}{3} \right) \end{aligned}$$

Par conséquent

$$E(h) = \max_{-5 \leq x \leq 5} |f(x) - Q_n(x)| \leq Ch^3$$