

1 Energy in DB

$$\mathcal{H}(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} hu^2 + gh^2 + \frac{h^3}{3} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx$$

For the Soliton at $t = 0$

$$h(x, 0) = a_0 + a_1 \text{sech}^2(\kappa x)$$

$$u(x, 0) = c \left(1 - \frac{a_0}{a_0 + a_1 \text{sech}^2(\kappa x)} \right)$$

$$\kappa = \frac{\sqrt{3a_1}}{2a_0\sqrt{a_0 + a_1}} \quad (1)$$

and

$$c = \sqrt{g(a_0 + a_1)} \quad (2)$$

For $a_0 = 1.0$, $a_1 = 0.7$, $g = 9.81$

$$\kappa = \frac{\sqrt{2.1}}{2\sqrt{1.7}}$$

$$\kappa = \sqrt{\frac{21}{68}}$$

$$c = \sqrt{9.81(1.7)}$$

$$c = \sqrt{16.677}$$

$$h(x, 0) = 1 + 0.7 \text{sech}^2 \left(\sqrt{\frac{21}{68}} x \right)$$

$$u(x, t) = \sqrt{16.677} \left(1 - \frac{1}{1 + 0.7 \text{sech}^2 \left(\sqrt{\frac{21}{68}} x \right)} \right)$$

$$u(x, t) = \sqrt{16.677} \left(\frac{0.7 \operatorname{sech}^2 \left(\sqrt{\frac{21}{68}} x \right)}{1 + 0.7 \operatorname{sech}^2 \left(\sqrt{\frac{21}{68}} x \right)} \right)$$

Using Wolfram

$$\int_{-50}^0 h u^2 dx = 6.35155$$

$$\int_0^{250} h u^2 dx = 6.35155$$

$$\int_{-50}^0 g h^2 dx = 520.981$$

$$\int_0^{250} g h^2 dx = 2482.98$$

$$\int_{-50}^0 \frac{h^3}{3} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx = 0.584961$$

$$\int_0^{250} \frac{h^3}{3} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx = 0.584961$$

So we have

$$\mathcal{H}(0) = \frac{1}{2} [2 \times 6.35155 + 2 \times 0.584961 + 520.981 + 2482.98]$$

$$\mathcal{H}(0) = 6.35155 + 0.584961 + \frac{1}{2} [520.981 + 2482.98]$$

$$\mathcal{H}(0) = 6.936511 + \frac{1}{2} [3003.961]$$

$$\mathcal{H}(0) = 6.936511 + 1501.9805$$

$$\mathcal{H}(0) = 1508.917011$$