



# PODÉS ENCONTRAR...

## CHURRINCHE (*Pyrocephalus rubinus*)



Mide 14 cm.

El macho es muy vistoso (rojo), gran dimorfismo sexual. Se alimenta de insectos. Ave símbolo de Lobería.

**MIGRATORIO.** Llega en primavera.

## CHINGOLO (*Zonotrichia capensis*)



Mide 14 cm. Muy confiado, inquieto y se mueve a los saltitos. Tiene un semicopete y mejillas grises, collar en la nuca color castaño. Pico grisáceo o azulado.

**RESIDENTE.**

## GORRIÓN COMÚN (*Passer domesticus*)



Mide 15 cm. Es exótico. Plumaje gris y marrón. Gran dimorfismo sexual. Se lo observa en pequeñas bandadas, haciendo típicos saltitos.

**RESIDENTE.**

## SUIRIRÍ REAL (*Tyrannus melancholicus*)



Miden 21 cm. Son solitarios. Se posan en lugares visibles, como cables, ramas altas. Defienden su territorio con agresividad, pelean con aves más grandes que ellos. Cazan insectos al vuelo, que son su principal alimento. Se reproduce en Lobería, llega en primavera y se va en otoño.

**MIGRATORIO.**

## PICABUEY (*Machetornis rixosa*)



Mide 19 cm. Se destacan porque cazan insectos en el suelo haciendo carreritas o, en el aire, haciendo cortos vuelos acrobáticos. Macho y hembra son iguales a simple vista. Siempre andan en pareja.

**RESIDENTE.**

## BENTEVEO COMÚN (*Pitangus sulphuratus*)



Miden 22 cm. Posan de manera visible y andan solos o en pareja. Muy territoriales y ruidosos. Su voz onomatopéica es típica y dice bi-chio.fuuii. Si tienen la posibilidad, hacen vuelos rasantes sobre el agua o se largan en picada en el arroyo para buscar peces.

**RESIDENTE.**

## CABECITANEGRA COMÚN (*Spinus magellanicus*)



Mide 12 cm. Gran dimorfismo sexual. El macho es verdoso y amarillo; de cabeza con capucha negra. Andan en bandaditas, se los observa con facilidad, se mueven mucho. Se alimentan de insectos, arañitas. **RESIDENTE.**

## CALANDRIA GRANDE (*Mimus saturninus*)



Mide 26 cm. Muy frecuente. Se posa en sitios visibles, anda en el suelo con frecuencia donde realiza carreras breves. Su canto es agradable y muy variado, incluso puede imitar cantos de otras aves. **RESIDENTE.**

## ESTORNINO PINTO (*Sturnus vulgaris*)



Mide 20 cm. Pico alargado de color amarillo, casi cónico. Su plumaje sin brillo pasa a ser negro con pintas blancas y brillo metálico violáceo-verdoso en época reproductiva. No presenta dimorfismo sexual. Exótico. **RESIDENTE.**

## JUNQUERO (*Phleocryptes melanops*)



Mide 14 cm. Pequeño, inquieto, se mueve de junco en junco y cuando es necesario se agarra fuertemente con las patas abiertas. Tiene un canto muy característico. **RESIDENTE.**

## PICAFLOR COMÚN (*Chlorostilbon lucidus*)



Mide 9 cm. Se lo observa muy fácil. Dimorfismo sexual. El macho es color verde tornasolado con reflejos azules en la garganta y la cola azul. El pico es rojo con la punta negra.

**RESIDENTE.**

## CACHILO CEJA AMARILLA (*Ammodramus humeralis*)



Mide 11 cm. Sin dimorfismo sexual, se alimenta de semillas y a veces larvas. Suele vérselo posado, aunque es muy terrícola y le gusta andar entre matas y pastos. Canto muy característico. **RESIDENTE.**

## MISTO (*Sicalis luteola*)



Mide 12 cm. Se lo observa con frecuencia, la hembra tiene colores más opacos y parduscios, en la época reproductiva el macho canta desde la parte superior de pastos altos, vuela hacia arriba y se deja caer planeando y cantando.

**RESIDENTE.**

## RATONA COMÚN (*Troglodytes aedon*)



Mide 10 cm. Es muy inquieta, confiada y curiosa. Se alimenta de insectos y arañas. Tiene un canto alegre y muy fuerte comparado a su tamaño.

**RESIDENTE.**

## TORCAZA (*Zenaida auriculata*)



Mide 25 cm. Muy sociables, anda en pareja o bandadas. Caminadoras. Nidifica en zonas con árboles en altura media o baja. Es común escuchar a esta especie "arrullando", su canto es gutural y ronco... rrúuuu, gúuu, gúuu. Canta más fuerte el del macho que el de la hembra. **RESIDENTE.**

## VERDÓN (*Embernagra platensis*)



Se alimenta de insectos, crustáceos, lombrices, larvas y de semillas, que cazan o buscan en bandada.

**RESIDENTE.**

## PECHO AMARILLO COMÚN (*Pseudoleistes virescens*)



Mide 22 cm. No presenta dimorfismo sexual. Siempre anda en grupo y un individuo de "vigilante", ante el menor peligro, hace 1 sonido de alerta y todos se van.

**RESIDENTE.**

## LECHUCITA VIZCACHERA (*Athene cunicularia*)



Mide 25 cm. Vive en pareja todo el año, macho y hembra muy parecidos. Se la puede ver en actividad de día y de noche. Muy simpática, confiada, suele estar parada erguida en un poste. Cuando te acercás te mira fijo, luego da vuelta su cabeza hacia otro lado. **RESIDENTE.**

## BIGUÁ (*Phalacrocorax brasiliensis*)



Mide 75 cm, una envergadura alar de 100 cm. Es común verla posada, con las alas abiertas, secándose al sol, siempre cerca o sobre el agua. Se alimenta de peces pequeños, pero también come renacuajos, ranas e insectos acuáticos.

**RESIDENTE.**

## GARZA BLANCA (*Ardea alba*)



Es la estrella del lugar, se la puede observar siempre sigilosa, oculta, observando. Es blanca de largas patas y cuello en forma de S. Se alimenta de peces, anfibios, reptiles, ratones y otros animales pequeños. **RESIDENTE.**

## PATO CUCHARA (*Spatula platalea*)



Gran dimorfismo sexual. El macho tiene cabeza gris pálida, ojos amarillos pálidos y cuerpo "rojo" con manchas negras. La hembra es mayormente marrón moteada, pero nota los lados blancos de la cola puntiaguda y el gran pico negro. Bastante común. **RESIDENTE.**

## PATO DE COLLAR (*Callonetta leucophrys*)



Mide 38 cm. Gran dimorfismo sexual. Pico celeste en el macho. Plomizo azulado en la hembra. Patas rosadas. Anda en pareja o en grupos. Se posa en los postes o en las ramas de los árboles. **RESIDENTE.**

## SIRIRÍ PAMPA (*Dendrocygna viduata*)



Mide 38-44 cm. Pico negro con banda grisácea o celeste cerca de la punta. Patas grises. Iris pardo oscuro. Cabeza, mitad anterior blanca, mitad posterior negra. Mancha blanca en la parte antero-superior del cuello. Pequeño collar negro en la garganta. Cuello posterior negro. Base del cuello castaño rojizo. Dorsalmente, rayado de canela y negruzco. **RESIDENTE.**

## PATO BARCINO (*Anas flavirostris*)



Mide 40 cm aprox. Pico amarillo con negro en la parte dorsal y en la punta. Patas gris azuladas. Iris pardo oscuro. Generalmente lo observamos en pareja o grupo.

**RESIDENTE.**

## PATO MAICERO (*Anas georgica*)



Mide 50 cm es más grande que el anterior, puede llegar a medir 60 cm. Tienen una cola larga y puntiaguda que hace que se diferencia con el anterior (además del tamaño). **RESIDENTE.**

## PATO OVERO (*Mareca sibilatrix*)



Mide 50 cm. Pico azulado con la base y la punta, negros. Anda en pareja o en pequeños grupos. Fácil de observar.


**RESIDENTE.**

## TERO COMÚN (*Vanellus chilensis*)



Mide 30 a 35 cm. Elegante y estilizado, coronado por un fino copete. Pico corto y rojo, punta negra. Ojos rojo intenso y redondos. Patas largas, finas y rojas. Cuando camina o está quieto, hace "agachaditas". Debajo de sus alas hay unas pequeñas prolongaciones óseas rojas (espolones) que usa como protección. **RESIDENTE.**

## MARTÍN PESCADOR GRANDE (*Megaceryle torquata*)



Mide 45 cm. Presenta dimorfismo sexual. La hembra es similar al macho, pero tiene un marcado plumaje como si fuera un collar en el pecho de color gris celeste bordeado de blanco. **RESIDENTE.**

**¡SEGUINOS EN REDES!**

@turismoloberia | loberiaturismo