

Experimentalphysik II (SS 2023/2024)

Übung 13

Tutorium: 2

Abgabe: 14.07.2023

Aufgabe 1: Plattenkondensator mit Dielektrikum

(a)

$$\begin{aligned}E_L &= \frac{U_L}{d_L} \\&= 2\epsilon_r \frac{U_P}{d_P} \\&= 2\epsilon_r E_P \\ \frac{E_P}{E_L} &= \frac{1}{2\epsilon_r} \\&\approx 0.278\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}U &= 2U_L + U_P \\&= 2U_L + \frac{U_L}{\epsilon_r} \\U_L &= \frac{U}{2 + \frac{1}{\epsilon_r}} \\E_L &= \frac{U}{d} \frac{1}{2 + \frac{1}{\epsilon_r}} \\&\approx \frac{600 \text{ V}}{5 \text{ mm}} \frac{1}{2 + \frac{1}{1.8}} \\&\approx 93.9 \frac{\text{kV}}{\text{m}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}U_P &= \frac{1}{\epsilon_r} \frac{U}{2 + \frac{1}{\epsilon_r}} \\E_P &= \frac{1}{\epsilon_r d_P} \frac{U}{2 + \frac{1}{\epsilon_r}} \\&\approx \frac{1}{1.8 \cdot 5 \text{ mm}} \frac{600 \text{ V}}{2 + \frac{1}{1.8}} \\&\approx 26.1 \frac{\text{kV}}{\text{m}}\end{aligned}$$

(c)

(d)

$$\begin{aligned}\frac{1}{C} &= \frac{2}{C_L} + \frac{1}{C_P} \\ &= \frac{2d_L}{\epsilon_0 A} + \frac{d_P}{\epsilon_0 \epsilon_r A} \\ &= \frac{2d_L}{\epsilon_0 A} \left(1 + \frac{1}{\epsilon_r}\right) \\ C &= \frac{\epsilon_0 A}{2d_L} \frac{1}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}} \\ &\approx \frac{8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 200 \text{ cm}^2}{2 \cdot 2.5 \text{ mm}} \frac{1}{1 + \frac{1}{1.8}} \\ &\approx 22.8 \text{ pF}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C &= \frac{Q}{U} \\ Q &= CU \\ &= \frac{\epsilon_0 AU}{2d} \frac{1}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}} \\ &= \frac{8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 200 \text{ cm}^2 \cdot 600 \text{ V}}{2 \cdot 5 \text{ mm}} \frac{1}{1 + \frac{1}{1.8}} \\ &\approx 6.84 \text{ nC}\end{aligned}$$

(e)

$$\begin{aligned}\frac{W_P}{W} &= \frac{C_P U_P^2}{C U^2} \\ \frac{C_P}{C} &= \frac{2C_P}{C_L} + 1 \quad , \text{ siehe (b)} \\ &= \epsilon_r + 1 \\ U_P &= \frac{1}{\epsilon_r} \frac{U}{2 + \frac{1}{\epsilon_r}} \quad , \text{ siehe (b)} \\ \frac{U_P}{U} &= \frac{1}{2\epsilon_r + 1} \\ \frac{W_P}{W} &= \frac{C_P U_P^2}{C U^2} \\ &= \frac{\epsilon_r + 1}{(2\epsilon_r + 1)^2} \\ &\approx \frac{1.8 + 1}{(2 \cdot 1.8 + 1)^2} \\ &\approx 13.2\%\end{aligned}$$

(f)

$$W = \frac{1}{2} C U^2$$

$$\begin{aligned}
&\approx \frac{1}{2} \cdot 6.84 \text{ nC} \cdot 600^2 \text{ V}^2 \\
&\approx 4.11 \text{ } \mu\text{J}
\end{aligned}$$

Aufgabe 2: Poynting-Vektor

(a)




Figure 1: Poynting Vektoren bei Aufladen eines kreisförmigen Plattenkondensators. (Tatsächlich würden sich die B-Felder bei einem perfekt homogenen Feld im Inneren des Kondensators gegenseitig wegheben, deswegen die beiden inneren B-Feldlinien bitte einfach ignorieren)

(b)

Der Poynting-Vektors zeigt, wie man in der Skizze gut nachvollziehen kann, radial nach innen.

$$\begin{aligned}
0 &= U + U_R + U_C \\
&= U + RI + \frac{Q}{C} \\
&= U + R\dot{Q} + \frac{Q}{C} \\
\dot{Q} &= -\frac{Q}{RC} - \frac{U}{R} \\
Q(t) &= c \cdot e^{-\frac{t}{RC}} - UC \quad , \quad c \in \mathbb{R} \\
Q(0) = 0 &\implies Q(t) = UC \left(e^{-\frac{t}{RC}} - 1 \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\vec{S}(t) &= \epsilon_0 c^2 (\vec{E}(t) \times \vec{B}(t)) \\
|\vec{S}|(t) &= \epsilon_0 c^2 |\vec{E}| \cdot |\vec{B}| \\
&= \epsilon_0 c E^2 \\
&= \epsilon_0 c \frac{U^2}{d^2} \\
&= \epsilon_0 c \frac{Q^2}{d^2 C^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \epsilon_0 c \frac{U^2 C^2 \left(e^{-\frac{t}{RC}} - 1 \right)^2}{d^2 C^2} \\
&= \epsilon_0 c \frac{U^2}{d^2} \left(e^{-\frac{t}{RC}} - 1 \right)^2 \\
&= \epsilon_0 c E_{max}^2 \left(e^{-\frac{t}{RC}} - 1 \right)^2 \\
&= I_{max} \left(e^{-\frac{t}{RC}} - 1 \right)^2, \quad I \equiv \text{Intensität}
\end{aligned}$$

(c)

(d)

Aufgabe 3: Dipolstrahlung

(a)

$$\begin{aligned}
c &= I(\theta, r), \quad c \in \mathbb{R} \text{ beliebig aber fest} \\
&= \frac{\omega^4 P_0^2}{2(4\pi)^2 \epsilon_0 c^3} \cdot \frac{\sin^2(\theta)}{r^2} \\
c &= \frac{\sin^2(\theta)}{r^2} \\
c &= \frac{\sin(\theta)}{r} \\
r &= c \sin(\theta)
\end{aligned}$$

Letzteres ist die bekannte Vorschrift für einen den Ursprung tangierenden Kreis in Polarkoordinaten mit Radius $r = \frac{c}{2}$.

(b)

$$\begin{aligned}
I_{ges} &= \int_{\mathcal{S}} I(\theta, r) d\vec{S} \\
&= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta I(\theta, r) \cdot r^2 \sin \theta \\
&= 2\pi \cdot \frac{1}{2} \frac{\omega^4 P_0^2}{(4\pi)^2 \epsilon_0 c^3} \int_0^\pi d\theta \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \cdot r^2 \sin \theta \\
&= \underbrace{\frac{\omega^4 P_0^2}{16\pi^2 \epsilon_0 c^3}}_{\eta} \int_0^\pi d\theta \sin^3 \theta \\
&= \frac{\eta}{2} \int_0^\pi d\theta (\sin \theta - \cos(2\theta) \sin \theta) \\
&= \eta - \frac{\eta}{2} \int_0^\pi d\theta \cos(2\theta) \sin \theta \\
&= \eta - \frac{\eta}{4} \int_0^\pi d\theta (\sin(3\theta) - \sin \theta)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \eta + \frac{\eta}{2} - \frac{\eta}{4} \int_0^\pi d\theta \, (\sin(3\theta)) \\
&= \eta + \frac{\eta}{2} + \frac{\eta}{12} \cos(3\theta) \Big|_0^\pi \\
&= \eta + \frac{\eta}{2} - \frac{\eta}{6} \\
&= \frac{4}{3}\eta \\
&= \frac{\omega^4 P_0^2}{12\pi^2 \epsilon_0 c^3}
\end{aligned}$$