

Experimentalphysik III (WS 2023/2024)

Übung 4

Tutorium: 8

Abgabe: 07.11.2023

Aufgabe 1: Zweilinsensystem

Welchen Abstand müssen zwei Sammellinsen von je 10 cm Brennweite haben, damit ihre Gesamtbrennweite $f = 8 \text{ cm}$ ist?

.....

$$\begin{aligned}
 D' &= D_1 + D_2 - dD_1D_2 \\
 &= 2D - dD^2 \\
 d &= \frac{2D - D'}{D^2} \\
 &\approx \frac{2 \cdot \frac{1}{10 \text{ cm}} - \frac{1}{8 \text{ cm}}}{\frac{1}{10^2 \text{ cm}^2}} \\
 &\approx 7.5 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

Aufgabe 2: Vorsatzlinse für Kamera

Eine Kamera mit Brennweite $f_1 = 5 \text{ cm}$ soll mit einer Vorsatzlinse versehen werden, sodass eine Briefmarke in natürlicher Grösse erscheint, wenn die Kamera auf ∞ eingestellt wird. Wie groß ist die Brennweite f_2 der Vorsatzlinse?

Die Briefmarke erscheint in natürlicher Grösse, wenn das gesamte System aus Objektiv und Vorsatzlinse das Licht ungebrochen durchlässt $\implies D' = 0$. Für dünne Linsen kann die Brechkraft einfach auf addiert werden:

$$\begin{aligned}
 D' &= D_V + D_L = 0 \\
 f_V &= -f_L
 \end{aligned}$$

Aufgabe 3: Vergrößerung am Kepler'schen Fernrohr

Ein Keplersches Fernrohr besteht aus einem Objektiv mit Brennweite f_{obj} und einem Okular mit Brennweite f_{okl} die sich den selben Brennpunkt teilen.

(a)

Bestimmen Sie für einen Strahl der in der Höhe h und Winkel α das Objektiv trifft die Abbildungsmatrix. Das Objektiv ist eine plankonvexe Linse mit dem Radius von $r_1 = 24 \text{ cm}$, das Okular ist eine bikonvexe Linse mit Biegeradius $r_2 = 12 \text{ cm}$. Beide Linsen sind aus Kronglas mit einem Brechungsindex von $n_L = 1.6$ gefertigt.

.....

$$D_1 = (n_L - n_0) \left(\frac{1}{r_{11}} + \frac{1}{r_{12}} \right) \approx (1.6 - 1) \left(\frac{1}{24 \text{ cm}} + \frac{1}{\infty \text{ cm}} \right) \approx \frac{1}{40} \text{ dpt}$$

$$D_2 = (n_L - n_0) \left(\frac{1}{r_{21}} + \frac{1}{r_{22}} \right) \approx (1.6 - 1) \left(\frac{1}{12 \text{ cm}} + \frac{1}{12 \text{ cm}} \right) \approx \frac{1}{10} \text{ dpt}$$

Abbildungsmatrix für das ganze System:

$$\begin{aligned} M &= M_{L_2} \cdot M_T \cdot M_{L_1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -D_2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{d}{n_0} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -D_1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & \frac{d}{n_0} \\ -D_2 & 1 - D_2 \frac{d}{n_0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -D_1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 - D_1 \frac{d}{n_0} & \frac{d}{n_0} \\ D_1 D_2 \frac{d}{n_0} - D_2 - D_1 & 1 - D_2 \frac{d}{n_0} \end{pmatrix} \\ &\approx \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & 50 \text{ cm} \\ 0 & -4 \end{pmatrix}, \quad \text{mit } \begin{cases} d = \frac{1}{D_1} + \frac{1}{D_2} = 50 \text{ cm} \\ n_0 \approx 1 \end{cases} \end{aligned}$$

(b)

Mit der Abbildungsmatrix:

$$\begin{aligned} S_2 &= M \cdot S_1 = M \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \beta &= -4\alpha \\ V &= \frac{\tan \beta}{\tan \alpha} = \frac{\tan(-4\alpha)}{\tan \alpha} \approx -4, \quad \text{da } \tan \alpha = \alpha + \mathcal{O}(\alpha^3) \end{aligned}$$

Mithilfe die Geometrie:

$$V = \frac{\tan \beta}{\tan \alpha} = \frac{b_z/F_2}{-b_z/F_1} = -\frac{D_2}{D_1} = -4$$

Aufgabe 4: Öffnungsfehler plankonvexe Linse