

Blutzucker und Niere: früh erkennen.

Zu viel Zucker schadet leise: erst Niere, Augen und Nerven, später Herz und Gehirn. Hinten steht, wie du deine Zuckerkurve glättest.

1 DEINE ZUCKERWERTE EINORDNEN

	normal	Prädiabetes	Diabetes
HbA1c, Langzeitwert	unter 5,7 %	5,7–6,4 %	ab 6,5 %
Nüchternzucker	unter 100 mg/dl	100–125 mg/dl	ab 126 mg/dl

	unauffällig	grenzwertig	Insulinresistenz
HOMA-IR	unter 2,0	2,0–2,5	über 2,5

HOMA-IR = Nüchterninsulin (µU/ml) × Nüchternzucker (mg/dl) ÷ 405; zeigt Insulinresistenz oft Jahre vor dem Zucker. Laborübliche Grenzen, kein Leitlinienwert.

Dein HbA1c

%

Nüchternzucker

mg/dl

Dein HOMA-IR



**Viel Durst, Wasserlassen,
Gewichtsverlust: zeitnah
abklären, mit Erbrechen sofort.**

2 DEINE NIERE EINORDNEN

eGFR		EIWEISS IM URIN · mg/g		
		A1 unter 30	A2 30–300	A3 über 300
G1	ab 90			
G2	60–89			
G3a	45–59			
G3b	30–44			
G4	15–29			
G5	unter 15			
Risiko:				

Zwei Werte gehören zusammen: die Filterleistung (eGFR) aus dem Blut und das Eiweiß im Urin (Albumin-Kreatinin-Quotient, am besten Morgenurin).

Eiweiß im Urin ist oft das früheste Zeichen, auch bei normaler eGFR. Auffällige Werte nach drei Monaten wiederholen.


Deine eGFR

ml/min

Eiweiß im Urin

mg/g

3 WO DU AM MEISTEN ERREICHST




hier am besten umkehrbar

In der größten Präventionsstudie senkte Lebensstil mit 7 % weniger Gewicht und 150 Minuten Bewegung pro Woche die neuen Diabetesfälle um **58 %**.

4 KONTROLLE: WANN WIEDER MESSEN

SITUATION	ZUCKER	NIERE
Werte normal	mindestens jährlich	jährlich eGFR
Prädiabetes, Insulinresistenz	alle 6–12 Monate	jährlich eGFR und Urin-Eiweiß
Diabetes	alle 3–6 Monate	jährlich eGFR und Urin-Eiweiß
Bluthochdruck	mindestens jährlich	jährlich eGFR und Urin-Eiweiß

5 WAS DU SELBST TUN KANNST: DIE ZUCKERKURVE GLÄTTEN



Nach Ideen aus dem Buch »Der Glukose-Trick«, ohne Essig und ohne Käse- und Wurst-Rezepte, bewertet nach Studienlage.

DIE ZUCKERKURVE GLÄTTEN		EVIDENZ
	Gemüse zuerst dann Eiweiß und Fett, Kohlenhydrate zuletzt	● ● ●
	Kohlenhydrate nie allein Brot mit Ei, Joghurt mit Nüssen, Nudeln mit Hülsenfrüchten	● ● ●
	Herzhaft frühstücken Eiweiß statt Marmelade, Saft und Müsli mit Zucker	● ● ●
	Süßes als Nachtisch nach dem Essen statt zwischendurch	● ● ●
	Nach dem Essen gehen 10 bis 15 Minuten, auch Treppen oder Hausarbeit	● ● ●
	Muskeln aufbauen Muskeln sind der größte Zuckerspeicher	● ● ●
● ● ● Metaanalysen ● ● ● kleine Studien ● ● ● plausibel		



Die Tipps glätten die Zuckercurve. Dass sie für sich Herzinfarkte verhindern, ist nicht belegt. **Harte Belege gibt es für Gewichtsabnahme, Bewegung und Muskelaufbau.**

6 WANN MEDIKAMENTE DAZUKOMMEN

Prädiabetes

→ Lebensstil: Gewicht, Bewegung, Muskelaufbau. Kontrolle alle 6 bis 12 Monate.

Diabetes

→ Lebensstil und meist Metformin. Ziel für den HbA1c meist unter 7 %, individuell festgelegt.

Herz oder Niere krank

Nach Herzinfarkt oder Schlaganfall SGLT2-Hemmer und/oder GLP-1-Rezeptor-Agonist; bei Herzenschwäche oder Nierenerkrankung SGLT2-Hemmer. Unabhängig vom Zuckerwert.

Eiweiß im Urin

Blutdrucksenker aus der Gruppe der ACE-Hemmer oder Sartane, oft zusätzlich SGLT2-Hemmer.

7 DEINE ERSTEN SCHRITTE

- ☐ HbA1c, eGFR und Eiweiß im Urin bestimmen lassen
- ☐ Bei jeder Mahlzeit: Gemüse zuerst

- ☐ Nach dem Abendessen 15 Minuten gehen
- ☐ _____

8 PASSENDE HANDOUTS



Ernährung

Teller und
Wochenplan



Krafttraining

Muskeln als
Zuckerspeicher



Ausdauer

VO₂max, Zonen



Blutdruck

Messen und senken



Fragen? Vereinbare einen Termin bei mir.

Praxis KardioPro · Im Neuen Stahlhof · Breite Straße 69 · 40213 Düsseldorf

0211 54 55 66 46 · bruno@kardio.pro · kardio.pro

Quellen: American Diabetes Association, Standards of Care in Diabetes 2025, Diabetes Care 2025 · Marx N et al., 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes, Eur Heart J 2023 · KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for Chronic Kidney Disease, Kidney Int 2024 · Knowler WC et al., NEJM 2002 · Shukla AP et al., Diabetes Care 2015 · Buffey AJ et al., Sports Med 2022 · Inchauspé J, Der Glukose-Trick, 2022.