

Rauchen: Aufhören lohnt sich immer.

Rauchen ist der größte vermeidbare Risikofaktor für Herz, Gefäße, Lunge und Krebs. Vorne ordnest du deinen Konsum ein, hinten steht dein Plan für den Rauchstopp.

1 DEINEN KONSUM EINORDNEN

Zigaretten pro Tag, im Mittel

 Stück

Jahre geraucht

 Jahre

Packungsjahre = Stück ÷ 20 × Jahre

 PJ

Beispiel: 30 Zigaretten über 20 Jahre sind $1,5 \times 20 = 30$ Packungsjahre. Wichtig für die Lungenkrebs-Früherkennung, siehe Abschnitt 5.

2 WIE STARK IST DIE ABHÄNGIGKEIT?

Wann rauchst du nach dem Aufwachen die erste?

- ☐ innerhalb von 5 Min. (3)
☐ 31–60 Min. (1)

- ☐ 6–30 Min. (2)
☐ später (0)

Wie viele Zigaretten am Tag?

- ☐ bis 10 (0)
☐ 21–30 (2)

- ☐ 11–20 (1)
☐ mehr als 30 (3)

gering

mittel

stark

Summe der Punkte


0–1

2–4

5–6

Heaviness of Smoking Index. Je stärker die Abhängigkeit, desto mehr lohnt sich Unterstützung durch Medikamente.

3 WAS DEIN KÖRPER ZURÜCKGEWINNT



nach der letzten Zigarette, Vergleich jeweils mit weiterem Rauchen

GEWONNENE LEBENSJAHRE

Stopp mit 30 ≈ 10

Stopp mit 40 ≈ 9

Stopp mit 50 ≈ 6

Stopp mit 60 ≈ 3

Wer mit 30 aufhört, lebt im Mittel fast so lange wie jemand, der nie geraucht hat. Auch mit 60 gewinnt man noch etwa drei Jahre.

Daten aus 50 Jahren Nachbeobachtung britischer Ärzte.

4 E-ZIGARETTE, TABAKERHITZER, NIKOTINBEUTEL

Alle liefern Nikotin: Es erhöht Puls und Blutdruck und hält die Abhängigkeit aufrecht. Die E-Zigarette mit Nikotin half in Studien beim Ausstieg sogar etwas besser als Nikotinpflaster, **aber nur als Übergang** und nie zusätzlich zur Zigarette. Für Tabakerhitzer und Nikotinbeutel ist ein Nutzen beim Aufhören nicht belegt.

5 LUNGENKREBS-FRÜHERKENNUNG



Seit April 2026 gibt es eine Früherkennung mit **Niedrigdosis-CT**, jährlich, für Menschen von **50 bis 75 Jahren**, die mindestens **25 Jahre** und mindestens **15 Packungsjahre** geraucht haben; auch, wenn der Rauchstopp weniger als 10 Jahre zurückliegt. Sprich mich an, ob das für dich passt.

6 DEIN PLAN IN FÜNF SCHRITTEN

**Stopp-Tag**in ein bis zwei Wochen
festlegen**Umfeld**Familie und Kollegen
einweihen**Auslöser**Kaffee, Pause, Auto:
vorher ersetzen**Rauchfrei**Wohnung, Auto,
Aschenbecher weg**Rückfall**kein Scheitern, sondern
ein Lernschritt

7 WAS DEINE CHANCEN ERHÖHT

HILFE	WAS SIE BRINGT	EVIDENZ
Beratung Kurs, Telefon, App	erhöht die Chance, am meisten zusammen mit Medikamenten	● ● ●
Nikotinersatz Pflaster plus Kaugummi oder Spray	Kombination wirkt besser als ein Mittel allein	● ● ●
Vareniclin verschreibungspflichtig, 12 Wochen	mehr als doppelt so viele Rauchfreie wie mit Scheinmedikament	● ● ●
Cytisin verschreibungspflichtig, pflanzlich	wirksam, etwas weniger gut untersucht	● ● ●
E-Zigarette mit Nikotin, nur als Übergang	etwas besser als Nikotinpflaster, Langzeitfolgen offen	● ● ●

● ● ● hohe Aussagesicherheit ● ● ● mittlere ● ● ● gering · Cochrane-Übersichten

Ganz ohne Hilfe schaffen es nur wenige dauerhaft. Medikamente wähle ich mit dir nach Vorerkrankungen aus; nach dem Rauchstopp nehmen viele einige Kilo zu, das lässt sich abfangen.

8 KONTROLLE: DEINE ERSTEN 28 TAGE

Jeden rauchfreien Tag abhaken. Kohlenmonoxid in der Ausatemluft messe ich gern in der Praxis, nach vier Wochen, drei und zwölf Monaten.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

9 DEINE ERSTEN SCHRITTE

- ☐ Stopp-Tag eintragen: _____
- ☐ Termin zur Beratung über Medikamente
- ☐ Drei Auslöser und ihren Ersatz aufschreiben

10 PASSENDE HANDOUTS

**Blutdruck**Messen und
senken**Cholesterin**

LDL, ApoB, Lp(a)

**Ausdauer**Lunge und
Kondition**Krebsfrüherkennung**

Was ab welchem Alter



Fragen? Vereinbare einen Termin bei mir.

Praxis KardioPro · Im Neuen Stahlhof · Breite Straße 69 · 40213 Düsseldorf

0211 54 55 66 46 · bruno@kardio.pro · kardio.pro

Quellen: Visseren FLJ et al., 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention, Eur Heart J 2021 · Doll R et al., BMJ 2004 · Heatherton TF et al., Br J Addict 1989 · Livingstone-Banks J et al., Cochrane 2023 · Lindson N et al., Cochrane 2025 · WHO, Health benefits of smoking cessation · G-BA, Lungenkrebs-Früherkennung 2026.