


Schlaf: mindestens sieben Stunden.

Im Schlaf erholen sich Herz, Stoffwechsel und Gehirn. Vorne prüfst du, wie gut du schläfst und ob Atemaussetzer dahinterstecken könnten, hinten steht, was hilft.

1 WIE VIEL SCHLAF DU BRAUCHST



Erwachsene brauchen mindestens sieben Stunden, meist sieben bis neun. Wer dauerhaft kürzer schläft, hat ein höheres Risiko für Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht und Herzkrankheiten.

+12 %

Sterberisiko bei dauerhaft zu kurzem Schlaf

+30 %

bei sehr langem Schlaf, oft Zeichen einer Krankheit

Deine Schlafdauer, Mittel einer Woche

 Std.

Schlechte Nächte pro Woche

 Nächte

Regelmäßigkeit zählt fast so viel wie Dauer: **jeden Tag etwa zur gleichen Zeit aufstehen.**

2 KÖNNTEN ATEMAUSSETZER DAHINTERSTECKEN?

Eine Schlafapnoe bleibt oft jahrelang unentdeckt. Kreuze an, was auf dich zutrifft:

- | | |
|---|---|
| ☐ lautes, unregelmäßiges Schnarchen | ☐ Vorhofflimmern |
| ☐ Atemaussetzer, vom Partner bemerkt | ☐ Übergewicht, Halsumfang über 40 cm |
| ☐ tagsüber müde, Einnicken beim Lesen oder Fernsehen | ☐ Kopfschmerzen am Morgen |
| ☐ Bluthochdruck, vor allem schwer einstellbar | ☐ nachts mehrmals Wasserlassen |

Treffen mehrere Punkte zu, lohnt sich eine Schlafuntersuchung, meist erst einmal zu Hause mit einem kleinen Messgerät. Dieser Check ist eine Orientierung, kein geprüfter Fragebogen.

	unauffällig	leicht	mittel	schwer
Atemaussetzer pro Stunde	unter 5	5-14	15-29	ab 30

3 WANN ES EINE SCHLAFSTÖRUNG IST

Chronische Insomnie

- Ein- oder Durchschlafprobleme, zu frühes Erwachen
- an mindestens **drei Nächten pro Woche**, seit **drei Monaten**
- mit Folgen am Tag: Müdigkeit, Reizbarkeit, Konzentration

Bald ärztlich abklären

- Einschlafen am Steuer oder in Gesprächen: bis zur Abklärung nicht selbst fahren
- unruhige Beine am Abend, die zum Bewegen zwingen
- Schlafprobleme mit gedrückter Stimmung


4 KONTROLLE: ZWEI WOCHEN SCHLAFTAGEBUCH

Morgens eintragen, nachts nicht auf die Uhr sehen. Das Tagebuch zeigt, ob Maßnahmen wirken.

	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
ins Bett							
aufgestanden							
erholt? 1-5							

5 WAS DU SELBST TUN KANNST: EIN TAG FÜR GUTEN SCHLAF

Beispiel für ein Schlaffenster von 23 bis 7 Uhr. Verschiebe es nach deinem Typ, aber halte es auch am Wochenende.



Die ersten drei Regeln sind Kern der Verhaltenstherapie und gut belegt; weniger Zeit im Bett bei starker Tagesmüdigkeit, als Berufsfahrer, bei Epilepsie oder bipolarer Störung nur mit ärztlicher Begleitung. Schlaf-Tracker messen Dauer brauchbar, Schlafphasen ungenau.

6 WANN BEHANDLUNG DAZUKOMMT

Insomnie	→ Kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I) ist die erste Wahl, auch als geprüfte App.
Melatonin	→ Die einzige Ausnahme: mild wirksam, am ehesten ab 55 Jahren oder bei Jetlag und Schichtarbeit.
Schlafmittel: keine	Sie machen abhängig und erzeugen keinen natürlichen Schlaf mit echtem Tiefschlaf. Wir verzichten → konsequent darauf.
Schlafapnoe	Atemmaske über Nacht (CPAP), bei leichter bis mittlerer Form auch Unterkieferschienen; Gewicht senken hilft.

⚠ Auch Medikamente können den Schlaf stören, etwa Kortison, entwässernde Tabletten am Abend oder manche Betablocker. **Nicht selbst absetzen, sondern mit mir besprechen.**

7 DEINE ERSTEN SCHRITTE

- | | |
|---|--|
| ☐ Feste Aufstehzeit wählen: _____ Uhr | ☐ Handy nicht im Schlafzimmer laden |
| ☐ Kaffee nur bis zum frühen Nachmittag | ☐ _____ |

8 PASSENDE HANDOUTS

Blutdruck Atemaussetzer erhöhen ihn	Zucker und Niere HbA1c, Glukosekurve	Ausdauer VO ₂ max, Zonen	Ernährung Teller und Wochenplan
---	--	---	---



Fragen? Vereinbare einen Termin bei mir.

Praxis KardioPro · Im Neuen Stahlhof · Breite Straße 69 · 40213 Düsseldorf
0211 54 55 66 46 · bruno@kardio.pro · kardio.pro