

高考模拟卷

盛炯元 杨元谦

1. 在硝化细菌中,不会发生的生命活动是 ()

- A. 核膜的消失与重建 B. 核酸-蛋白质复合物的形成与消失 C. 氧气的摄取 D. ATP 的合成与水解

【答案】. A

【考点】. 原核与真核细胞的差异、化能合成作用

【解析】. 原核生物是原核细胞,没有以核膜为界限的细胞核,不存在增殖时周期性的核膜消失与重建,A 选项错误;在基因转录、复制时,会有 RNA 聚合酶或 DNA 聚合酶与 DNA 分子结合形成核酸-蛋白质复合物,B 选项正确;在化能合成作用中,硝化细菌需要借助氧气氧化氨或亚硝酸盐,C 选项正确;ATP 作为能量货币,能量在各生化反应中流动伴随着 ATP 的合成与水解,D 正确。

2. 蛋白质是结构和功能多样的生物大分子,下列叙述正确的是 ()

- A. 二硫键的断裂不会改变蛋白质的空间结构
B. 血浆里,人体三大供能物质中质量分数最大的是蛋白质
C. 向蛋白质溶液中加入浓的硫酸铜溶液可使蛋白质发生盐析
D. 利用基因工程可以“创造”出自然界中原先不存在的蛋白质

【答案】. B

【考点】. 蛋白质空间结构、血液中糖脂蛋相对含量、盐析与变性、基因工程局限性


【解析】. 二硫键影响蛋白质的三、四级结构,进而影响其整体空间结构,A 选项错误;血浆中水占 91%~92%,蛋白质约占 7%^[义务教育教科书·生物学七年级下册 P35],B 选项正确;铜离子是重金属,会使蛋白质发生变性,而不是盐析,C 选项错误;基因工程原则上只能生产自然界中已存在的蛋白质,D 选项错误。

3. 在一定温度下,大田的某种植物绿色叶片的光合速率和呼吸速率的平均对光照强度的响应曲线如图所示。下列说法错误的是 ()

- A. 生长于光照强度为 a 环境的植株生长最将因匮乏营养而死亡
B. 光照强度从 a 逐渐增加到 b 时,该植物生长速率逐渐增大
C. 光照强度小于 b 时,提高大田 CO₂ 浓度,CO₂ 固定速率会增大
D. 光照强度为 b 时,适当降低光反应速率,CO₂ 固定速率会降低

【答案】. C

【考点】. 总光合速率、净光合速率



【解析】. 生长于光照强度为 a 环境的植株虽然其叶片的总光合速率与呼吸速率相等,但植株中总有无法进行光合作用的组织(如根、花、果实)消耗着贮存的有机物,A 选项正确;光照强度小于 b 时,影响光合作用的主要因素为光照,提高大田 CO₂ 浓度不一定使 CO₂ 固定速率增大,C 选项错误。

4. 葡萄糖转运蛋白 4 (GLUT4) 是一种存在于脂肪细胞中的蛋白质。在胰岛素的刺激下, GLUT4 会从脂肪细胞内的囊泡膜上转移至细胞膜上,葡萄糖借助细胞膜上的 GLUT4 进入脂肪细胞。下列叙述错误的是 ()

- A. 脂肪细胞中 GLUT4 以氨基酸为原料,在核糖体中合成
B. GLUT4 转移至细胞膜所需要的能量主要来自于线粒体
C. GLUT4 每次转运葡萄糖时,其自身构象都会发生改变

D. 当血糖浓度升高时, 脂肪细胞膜上的 GLUT4 数量减少

【答案】. D

【考点】. 蛋白质的生物合成、主动运输、胞间信息传递

【解析】. 当血糖浓度升高时, 胰岛 B 细胞受刺激分泌更多胰岛素, 促进更多 GLUT4 从脂肪细胞内的囊泡膜上转移至细胞膜上, 故 D 选项错误。

5. 某研究团队测定了水分胁迫 (不足或过多) 下黄芩叶片的生理指标, 结果如表所示。下列叙述正确的是 ()

生理指标 处理	丙二醛含量 ($\text{mg} \cdot \text{g}^{-1}$)	可溶性糖含量 ($\text{mg} \cdot \text{g}^{-1}$)	叶绿素含量 ($\text{mg} \cdot \text{g}^{-1}$)
水分供给适量	2.0	31.0	1.65
水分供给过多	2.8	25.0	1.50
水分供给不足	9.2	57.8	1.50

(注: 在胁迫状态下, 细胞积累的活性氧会破坏膜的脂质分子, 形成丙二醛)

- A. 氧自由基会攻击膜的组分蛋白质分子时, 产物也是自由基, 引发雪崩式反应
- B. 水分过多时, 细胞膜完整性受损, 控制物质进出的能力减弱
- C. 水分不足时, 细胞内可溶性糖含量的变化导致水分流失增加
- D. 无论水分供给过多或不足, 叶片内叶绿素含量相同, 推测叶绿素的合成与水分供给无关


【答案】. B

【考点】. 细胞衰老——自由基学说、数据分析

【解析】. 自由基攻击蛋白质分子会使蛋白质活性下降, 但产物不是自由基, 当自由基攻击磷脂时, 产物才是自由基, 引发雪崩式反应, A 选项错误; 注意到水分过多时, 细胞内可溶性糖含量显著降低, 控制物质进出的能力减弱, B 选项正确; 水分不足时, 胞内可溶性糖含量升高, 渗透压升高, 更不易流失水分, C 选项错误; 无论水分供给过多或不足, 叶片内叶绿素含量都减少, 叶绿素合成与水分供给有关, D 选项错误。

6. 生菜是一种在保存和运输过程中易发生褐变的蔬菜。多酚氧化酶 (PPO) 在有氧条件下能催化酚类物质形成褐色的醌类物质, 导致植物组织褐变。某团队研究生菜多酚氧化酶在不同条件下的特性, 结果如图所示。下列叙述正确的是 ()

(注: 吸光度大小与醌类物质含量成正相关)



- A. 低氧环境可促进褐变发生
- B. 柠檬酸有抗氧化作用
- C. 保存和运输生菜的最适 pH 值为 6
- D. 40°C 时 PPO 活性最高, 适于生菜保存

【答案】. B

【考点】. 数据分析

【解析】. 褐变的实质是氧化, 故低氧环境能减缓褐变的发生, A 选项错误; 随着柠檬酸浓度上升, 多酚氧化酶的活性下降, 褐变 (氧化) 减缓, 故柠檬酸有抗氧化作用, B 选项正确; 当 pH 为 6 时, 吸光度最高, 褐变 (氧化) 程度最高, 不

宜用于保存和运输，C 选项错误；当反应温度为 40°C 时，吸光度最高，褐变（氧化）程度最高，不宜用于保存和运输，D 选项错误。