

## Ejercitación N.º 4: Sistemas de ecuaciones no lineales

### Ejercicio 1

Escriba una subrutina que implemente la resolución de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales utilizando el método :

- a. de eliminación de Gauss.
- b. Gauss-Jordan.

Utilice como argumentos la matriz de coeficientes, el vector independiente y el vector solución.

Para dar al código mayor generalidad, implemente también pivoteo parcial.

NOTA: Para el pivoteo puede utilizar la rutina desarrollada en el ejercicio 10 de la práctica 1 para intercambiar los elementos de dos filas.

### Ejercicio 2

Escriba una subrutina de implemente la resolución de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales utilizando el método iterativo:

- a. de Jacobi.
- b. de Gauss-Seidel.

Utilice como argumentos la matriz de coeficientes, el vector independiente y el vector solución.

Para dar al código mayor generalidad, utilice el código desarrollado en la práctica 1 para convertir una matriz en su forma diagonal dominante si es posible.

### Ejercicio 3

Emplee los métodos desarrollados en los ejercicios 1 y 2 para hallar la solución del siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + 2z - 6r - t = 10 \\ x - y - 2z - r + 9t = 4 \\ 2x + 2y - 8z - r - t = 1 \\ -x - 9y + z + 2r + t = 6 \\ 5x + y - z - r + t = 0 \end{cases}$$

Emplee la función intrínseca MATMUL para chequear la solución mediante la operación  $A \cdot x - b \approx 0$

La solución aproximada es:  $x \simeq -0,236393176279448$   $y \simeq -1,09504467912266$   $z \simeq -0,220958570268075$   $r \simeq -1,97562956945573$   $t \simeq 0,0804224207961007$

### Ejercicio 4

Escriba un código FORTRAN que implemente la solución de un sistema de  $n$  ecuaciones algebraicas no lineales utilizando el método iterativo de:

a. Punto Fijo.

b. Gauss-Seidel.

### Ejercicio 5

Escriba un código FORTRAN que implemente la solución de un sistema de  $n$  ecuaciones algebraicas no lineales utilizando el método iterativo de Newton-Raphson.

### Ejercicio 6

Emplee los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones no lineales para hallar una solución de:

$$\begin{cases} x^2 + x + y^2 - y + z^3 - 3z^2 - 13z = -9 \\ x^2 - 2x + y^2 + z = 6 \\ x^3 - 2x^2 + y + z^3 - 3z^2 - 25z = -74 \end{cases}$$

Dicho sistema tiene las siguientes soluciones reales:

$$\begin{array}{lll} x = 2 & y = 1 & z = 5 \\ x \approx 0,191357 & y \approx -1,11508 & z \approx 5,10268 \\ x \approx 1,79582 & y \approx 1,15846 & z \approx 5,02464 \\ x \approx 2,4395 & y \approx -0,0892965 & z \approx 4,91986 \end{array}$$

## Ejercicios de integración de conocimientos

### Ejercicio 7

Calcule la inversa de la siguiente matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 3 & 6 & -4 \\ 2 & 1 & 8 \end{bmatrix}$$

- A modo de chequeo general, que es aplicable incluso cuando no se conoce la solución analítica, verifique la inversa que obtuvo utilizando las dos multiplicaciones  $AA^{-1} = A^{-1}A = I$  y observe la cantidad de decimales de precisión que tiene la solución obtenida.
- Cheque cuántos decimales de la solución numérica coinciden con la solución analítica:

$$A^{-1} = \frac{1}{263} \begin{bmatrix} 52 & 17 & 2 \\ -32 & 30 & 19 \\ -9 & -8 & 30 \end{bmatrix}$$

### Ejercicio 8

Dos pesas ( $W_1 = 10 \text{ N}$  y  $W_2 = 20 \text{ N}$ ) cuelgan de tres cuerdas de longitudes  $L_1 = 3 \text{ m}$ ,  $L_2 = 4 \text{ m}$  y  $L_3 = 4 \text{ m}$  y de una barra horizontal cuya longitud es  $L = 8 \text{ m}$ . Encuentre los ángulos que forman las cuerdas con lo horizontal y la tensión en cada una de las cuerdas.




Figura 1: Dos pesas suspendidas de cuerdas de longitud conocida.

- (a) Explore diferentes conjuntos de valores iniciales para las incógnitas  $T_1, T_2, T_3, \theta_1, \theta_2, \theta_3$  y verifique si el sistema converge a una solución correcta.

$$\begin{cases} T_1 \sin \theta_1 - T_2 \sin \theta_2 - m_1 g = 0 \\ T_1 \cos \theta_1 - T_2 \cos \theta_2 = 0 \\ T_2 \sin \theta_2 + T_3 \sin \theta_3 - m_2 g = 0 \\ T_2 \cos \theta_2 - T_3 \cos \theta_3 = 0 \\ L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos \theta_2 + L_3 \cos \theta_3 = L \\ L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin \theta_2 - L_3 \sin \theta_3 = 0 \end{cases}$$

- (b) Otra forma de buscar la solución del mismo problema es utilizando como variables incógnita  $T_1, T_2, T_3, \sin \theta_1, \sin \theta_2, \sin \theta_3, \cos \theta_1, \cos \theta_2, \cos \theta_3$  y añadiendo al sistema las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} (\sin \theta_1)^2 + (\cos \theta_1)^2 = 1 \\ (\sin \theta_2)^2 + (\cos \theta_2)^2 = 1 \\ (\sin \theta_3)^2 + (\cos \theta_3)^2 = 1 \end{cases}$$

Verifique si este método es más estable.