

TP5 Thermodynamique

Partie 1 : Rayonnement

BERREDO DE LA COLINA Lucas

MARTIN Lola

- Corps noir / corps gris
- Radiation dans le vide

- Analogue électrocinétique
- Résolution exacte
- Résolution approchée

- Corps gris
- Corps noir

- Deux échantillons (gris, noir)
- Deux chambres :
 - ▶ Four (200°C)
 - ▶ Refroidissement à l'eau
- Elles peuvent être mises sous vide
- Mesures de temperature analogiques (100 points, 15 min)

EXPERIENCES

1. Corps gris, **chauffage**, vide
2. Corps gris, **refroidissement**, vide
3. Corps gris, **chauffage**, sans vide
4. Corps gris, **refroidissement**, sans vide
5. Corps noir, **chauffage**, vide
6. Corps noir, **chauffage**, sans vide

```
MacBook-Pro-de-Lucas:CSV lucasberredodelacolina$ ls  
1. tp5-gris-vidé-chauff.csv  
2. tp5-gris-vidé-refroid.csv  
3. tp5-gris-air-chauff.csv  
4. tp5-gris-air-refroid.csv  
5. tp5-noir-vidé-chauff.csv
```

Temps	Thermocouple	EA0
0	43,2356657	0,209796296
9	50,75927386	0,214779578
18	57,27973427	0,214779578
27	64,80334243	0,219762859
36	71,32380283	0,219762859
45	77,84426324	0,22474614
54	84,36472365	0,219762859
63	90,88518405	0,22474614
72	96,90407058	0,219762859
81	102,9229571	0,22474614
90	108,4402698	0,219762859
99	113,9575824	0,214779578

APPROXIMATION GRAPHIQUE 1ER ORDRE

APPROXIMATION GRAPHIQUE 2EME ORDRE

APPROXIMATION NUMÉRIQUE AVEC PYTHON

Comme nous avons la résolution pour τ , nous pouvons donner ça vers un `curve_fit` dans Python.

```
def theoretical_model(t, tau):  
    term1 = np.arctan(np.exp(2) * arccoth(T_kelvin_data / T_f))  
    term2 = np.arctan(np.exp(2) * arccoth(T_i / T_f))  
    term3 = arccoth(T_kelvin_data / T_f)  
    term4 = arccoth(T_i / T_f)  
    return 2 * tau * (term1 - term2 + term3 - term4)  
  
# Use curve_fit to find the optimal tau  
popt, pcov = curve_fit(theoretical_model, t_data, T_kelvin_data, p0=[1.0])  
optimal_tau = popt[0]  
print(optimal_tau)
```

Figure – Exemple refroidissement. Il y a aussi un fichier pour chauffage.

APPROXIMATION NUMÉRIQUE AVEC PYTHON

Résultats :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Corps gris, chauffage, vide | $\tau = 96.0399\dots$ |
| 2. Corps gris, refroidissement, vide | $\tau = 86.1429\dots$ |
| 3. Corps gris, chauffage, sans vide | $\tau = 99.2634\dots$ |
| 4. Corps gris, refroidissement, sans vide | $\tau = 84.5618\dots$ |
| 5. Corps noir, chauffage, vide | $\tau = 111.8591\dots$ |
| 6. Corps noir, chauffage, sans vide | $\tau = 90.5110\dots$ |

- Approximation graphique 1er ordre
- Approximation graphique 2eme ordre

TP5 Thermodynamique

Partie 2 : Loi de Stefan

BERREDO DE LA COLINA Lucas

MARTIN Lola

Bien que nous ayons travaillé avec l'équipement et observé des résultats avec Mme Nom, nous n'avons pas enregistré de résultats numériques.

- Deduction Loi Stefan

- Explication dispositif

APPROXIMATION DES RÉSULTATS

- Rappel : on n'a pas les résultats, mais on peut approximer
- Simulation des données
- Explication du valeur