



Convolução: função retangular

Lucas de Castro Costa

Professor: Lourenildo Leite
Universidade Federal do Pará

7 de janeiro de 2021

- 1 Introdução
- 2 Teoria
- 3 Metodologia
- 4 Resultados
- 5 Conclusão

- Função retangular;
- Convoluções;
- Amplitude espectral.

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Teoria
- 3 Metodologia
- 4 Resultados
- 5 Conclusão

Função retangular

$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } |t| > a/2, \\ \frac{1}{2} & \text{se } |t| = a/2, \\ 1 & \text{se } |t| < a/2. \end{cases}$$

Equações importantes

Função retangular

$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } |t| > a/2, \\ \frac{1}{2} & \text{se } |t| = a/2, \\ 1 & \text{se } |t| < a/2. \end{cases}$$

Convolução

$$f(x) * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(x - \tau)d\tau$$

Equações importantes

Função retangular

$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } |t| > a/2, \\ \frac{1}{2} & \text{se } |t| = a/2, \\ 1 & \text{se } |t| < a/2. \end{cases}$$

Convolução

$$f(x) * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(x - \tau)d\tau$$

Transformada rápida de Fourier

$$F(x) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n)e^{-i\pi(x\frac{n}{N})}$$

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Teoria
- 3 Metodologia**
- 4 Resultados
- 5 Conclusão

Parâmetros utilizados

- $a = 2$;
- $\Delta t = 0.001$;
- $\Delta f = \frac{1}{n\Delta t}$;
- $n \rightarrow$ número de pontos no *grid*;

Função retangular

$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } |t| > a/2, \\ \frac{1}{2} & \text{se } |t| = a/2, \\ 1 & \text{se } |t| < a/2. \end{cases}$$

Parâmetros utilizados

- $a = 2$;
- $\Delta t = 0.001$;
- $\Delta f = \frac{1}{n\Delta t}$;
- $n \rightarrow$ número de pontos no *grid*.

Gráfico da função retangular com $a = 2$




Figura: Função retangular com $a = 2$.

$$f(x) * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(x - \tau)d\tau$$

$$\text{rect}(t) * \text{rect}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \text{rect}(\tau) \text{rect}(t - \tau) d\tau$$

$$\text{rect}(t) * \text{rect}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \text{rect}(\tau) \text{rect}(t - \tau) d\tau$$

- Serão feitas 5 auto convoluções;
- Por se tratar de convolução, o tamanho de amostragens dobra após cada convolução;
- No final, serão comparados os resultados normalizados.

$$F(x) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) e^{-i\pi(x \frac{n}{N})}$$

- Serão aplicadas as transformadas em cada uma das funções;
- Foi plotado apenas uma parte da amplitude espectral;
- No final, serão comparados os resultados normalizados;

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Teoria
- 3 Metodologia
- 4 Resultados**
- 5 Conclusão

Gráfico com função e convoluções




Figura: Gráfico de comparação da função original e as convoluções.

Gráfico com função e amplitudes espectrais




Figura: Gráfico de comparação das amplitudes espectrais.

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Teoria
- 3 Metodologia
- 4 Resultados
- 5 Conclusão**

- Mudança no formato ao decorrer das auto convoluções, tendendo a uma Gaussiana;
- Perda de energia na amplitude espectral com o decorrer das convoluções.

Obrigado pela atenção!