


Ejercicio 6

Se lanzan dos dados. Uno de ellos tiene dos caras verdes y cuatro rojas, y el otro tiene cuatro caras verdes y dos negras. Si por cada cara verde obtenida se gana \$5, por cada cara negra se gana \$10 y por cada cara roja se gana \$25. ¿Cuál es la ganancia esperada de dicho juego?



$$\Omega = \{(V_1V_2), (V_1N_2), (R_1V_2), (R_1N_2)\}$$

X: ganancia obtenida al tirar dos dados, $R_X = \{10, 15, 30, 35\}$

x	10	15	30	35
p(x)	0,222	0,111	0,444	0,222

$$\mu = E(X) = 10 \cdot 0,222 + 15 \cdot 0,111 + 30 \cdot 0,444 + 35 \cdot 0,222 = 25$$

Int: "Si se repite el experimento aleatorio infinitas veces, se espera obtener en promedio una ganancia de \$25".

Ejercicio 7

Un contratista desea conocer el costo total de un proyecto. Sabe que el costo de los materiales es una variable aleatoria con media \$ 200.000 y desvío estándar \$ 10.000. La mano de obra cuesta \$1.500 por día, y la cantidad de días necesarios para finalizar el proyecto puede ser representado por una variable aleatoria con media 80 días y desvío estándar 12 días. Suponiendo que el costo de los materiales y mano de obra son independientes ¿cuál es la media y el desvío estándar del costo total del proyecto?

C: costo de materiales $E(C) = \$200.000$ $\sigma(C) = \$10.000$

D: cantidad de días $E(D) = 80$ días $\sigma(D) = 12$ días

CT: costo total del proyecto

$$CT = C + 1.500 \cdot D$$

$$\mu = E(CT) = E(C + 1.500 \cdot D) = E(C) + 1.500 \cdot E(D) = \$200.000 + 1.500 \$/\text{días} \cdot 80 \text{ días} = \$218.000$$

$$\sigma(CT) = \sigma(C + 1.500 \cdot D) = \sigma(C) + 1.500 \sigma(D) = \$10.000 + 1.500 \$/\text{días} \cdot 12 \text{ días} = \$28.000$$