

1 SENL (Sistemas de Ecuaciones no Lineales)

1.1 Newton-Raphson

El método consigue una de las raíces del sistema de ecuaciones, habría que iterarlo varias veces para obtener todas. El Jacobiano tiene que ser evaluado en un punto. Fórmula iterativa desarrollada:

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(x_k, y_k)}{\partial x_k} & \frac{\partial f_1(x_k, y_k)}{\partial y_k} \\ \frac{\partial f_2(x_k, y_k)}{\partial x_k} & \frac{\partial f_2(x_k, y_k)}{\partial y_k} \end{pmatrix}^{-1} \times \begin{pmatrix} f_1(x_k, y_k) \\ f_2(x_k, y_k) \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \vec{J}(\vec{x}_k)^{-1} \times \vec{F}(\vec{x}_k) \quad (2)$$

1.2 Método Punto Fijo

El método de punto fijo es igual que el método de Newton Raphson, la diferencia está en el jacobiano. En el método de punto fijo se elige una matriz A a conveniencia. Se puede tomar la matriz jacobiana y mantener la matriz evaluada en la semilla para todas las iteraciones, para no tener que inventar una y chequear convergencia.

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \vec{J}(\vec{x}_k)^{-1} \times \vec{F}(\vec{x}_k) \quad (3)$$

1.3 Cálculo de inversa de una matriz

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \times \text{Adj}(A)$$

$$\text{Adj}(A) = \text{Cof}(A)^T$$

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \times \det(\text{de la matriz que queda al eliminar la fila } i \text{ y la col } j)$$

La matriz de cofactores es del mismo tamaño que A y cada elemento es el cofactor ij . Si es un solo elemento el que queda, va ese elem directamente como determinante de la matriz sobrante.

2 SEL (Sistemas de Ecuaciones Lineales)

2.1 Método de Jacobi

El método de Jacobi tiene menor costo computacional que triangular o invertir una matriz, y busca resolver sistemas del tipo $A\vec{x} = \vec{b}$.

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Para cada componente i , el esquema iterativo se define como: Notar que las potencias k y $k + 1$ son simplemente notación para mostrar la iteración en la que estamos.

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad (4)$$

La forma iterativa de Jacobi es: $\vec{x} = T + \vec{b}$

Despejando para x_1, x_2, x_3 :

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)} \right) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}} \left(b_2 - a_{21}x_1^{(k)} - a_{23}x_3^{(k)} \right) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{a_{33}} \left(b_3 - a_{31}x_1^{(k)} - a_{32}x_2^{(k)} \right) \end{cases} \quad (5)$$

Sea T la matriz de iteración para Gauss-Seidel

$$T = \begin{pmatrix} 0 & \frac{a_{12}}{a_{11}} & \frac{a_{13}}{a_{11}} \\ \frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & \frac{a_{23}}{a_{22}} \\ \frac{a_{31}}{a_{33}} & \frac{a_{32}}{a_{33}} & 0 \end{pmatrix} \quad (6)$$

Para tres variables:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{a_{12}}{a_{11}} & \frac{a_{13}}{a_{11}} \\ \frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & \frac{a_{23}}{a_{22}} \\ \frac{a_{31}}{a_{33}} & \frac{a_{32}}{a_{33}} & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} \\ \frac{b_3}{a_{33}} \end{pmatrix} \quad (7)$$

2.2 Método de Gauss-Seidel

El método de Gauss-Seidel converge más rápido que el método de Jacobi, pues tiene en cuenta las aproximaciones que se van haciendo en esa misma iteración con las primeras variables para aproximar las siguientes. Aclaración: i es el número de iteración.

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad (8)$$

Despejando para x_1, x_2, x_3 :

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - a_{12} x_2^{(k)} - a_{13} x_3^{(k)} \right) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}} \left(b_2 - a_{21} x_1^{(k+1)} - a_{23} x_3^{(k)} \right) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{a_{33}} \left(b_3 - a_{31} x_1^{(k+1)} - a_{32} x_2^{(k+1)} \right) \end{cases} \quad (9)$$

La forma iterativa de Gauss Seidel es: $\vec{x} = T + \vec{b}$

2.3 Criterios de convergencia

Sea λ un autovalor de T .

- Si $\max(\lambda) < 1 \implies$ va a converger.
Para obtener λ se usa la ecuación $\det(T - \lambda \cdot I) = 0$
- Si A es diagonal dominante, va a converger. En caso de no serlo, no se puede concluir nada.
Una matriz A es dominante si $\forall i, |a_{ii}| > \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, i \neq j, i, j \in \mathbb{N}$.
Es decir, el elemento de la diagonal es mayor a la suma de todos los demás elementos de la fila.
- Si $\|T\|_\infty < 1 \implies$ va a converger. En caso de no serlo, no se puede concluir nada. La norma de T infinito es $\max_{1 \leq i \leq n} (\sum_{j=1}^n |t_{ij}|), i, j \in \mathbb{N}$.
Es decir, la mayor suma de valores absolutos de todos los elementos de una fila.

3 PVI (Problemas de Valor Inicial)

Problemas de ecuaciones diferenciales en los que la variable independiente es el tiempo. Las distintas aproximaciones no son soluciones más cercanas a la buscada, que reducen el error con iteraciones, sino que son soluciones correspondientes a avances temporales de paso h .

3.1 Método Euler

- Error local de Euler es $O(h^2)$
- Error global $\approx O(h)$
- El método Euler tiene orden de precisión 1.

Forma recursiva: $u_{n+1} = u_n + h f(u_n, t_n)$

3.2 Método de punto medio

Avanzar con la pendiente evaluada en el punto medio del intervalo.

Forma recursiva

1. $u_{n+\frac{1}{2}} = u_n + h f(u_n, t_n)$ Primer iteración por Euler para obtener $u_n + \frac{1}{2}$.
2. $u_{n+1} = u_n + h f(u_{n+\frac{1}{2}}, t_{n+\frac{1}{2}})$

3.3 Método de Runge-Kutta

El método Runge-Kutta es de orden 2. Tener en cuenta que las sumas de los q_i son respecto a las variables, es decir, para un sistema, se suma el q_i correspondiente a la variable. Además, f tiene que depender de lo que depende realmente.

1. $q_1 = h f(u_n, t_n)$ Toma la pendiente al inicio del intervalo.
2. $q_2 = h f(u_{n+q_1}, t_{n+q_1})$ Toma la pendiente al final del intervalo.
3. $u_{n+1} = u_n + (\frac{q_1+q_2}{2})$ Avanzar con el promedio de las pendientes

3.4 Método de Euler Implícito

El método Runge-Kutta es de orden 1. $u_{n+1} = u_n + h f(u_{n+1}, t_{n+1})$