Diferenças em laudos

A-

1. **Adrenal: formato característico, ecogenicidade mantida. Adrenal direita não visualizada e esquerda com 0,67 cm de altura (em plano longitudinal) (normal: 0,3 a 0,6 cm). Sugestivo de hiperadrenocorticismo.**

2. **Adrenal:** formato característico, ecogenicidade mantida. **Adrenal direita medindo 0,75 cm, 0,88 cm (polo cranial e polo caudal) e adrenal esquerda medindo 0,73 cm, 1,29 cm (polo cranial e polo caudal). De acordo com Melian et al. (2021), os valores médios de espessura adrenal variam com o peso corporal dos cães:**

- **2,5 a 5 kg: adrenal esquerda 0,51 cm, direita 0,53 cm**
- **5 a 10 kg: esquerda 0,55 cm, direita 0,68 cm**
- **10,1 a 20 kg: esquerda 0,64 cm, direita 0,75 cm**
- **20,1 a 40 kg: esquerda 0,73 cm, direita 0,87 cm**

Obs.: Cão: peq e médio: polo: 0,3 a 0,6 cm, grande: 0,8 a 1,5 cm.

Adrenal: formato característico, ecogenicidade mantida. **Adrenal direita medindo 0,66 cm e 0,68 cm (polo cranial e polo caudal, respectivamente)** e esquerda 0,52 cm e 0,49 cm (polo cranial e polo caudal, respectivamente).

GATOS Adrenais: formato característico, ecogenicidade mantida. Adrenal direita com 0,68 cm de altura e esquerda com 0,51 cm de altura, mensuradas em plano longitudinal. De acordo com López et al. (2020), os valores de referência para a espessura da margem caudal da adrenal em gatos variam conforme o peso corporal: Gatos até 4 kg: até 0,39 cm; Gatos entre 4,1 e 8 kg: até 0,48 cm

3. **Ascite : Observação: líquido livre em cavidade abdominal de ecogenicidade anecóica. Ascite moderada.**
4.

B-

5. **Baço: dimensões aumentadas, margens arredondadas**, superfície lisa e ecogenicidade dentro dos limites da normalidade.

6. **Baço: dimensões aumentadas, margens arredondadas, superfície lisa e aspecto rendilhado. Sugestivo de hemoparasita.**

7. **Bexiga:** com repleção líquida moderada, parede normal medindo 0,13 cm (normal: 0,13 a 0,17 cm) de espessura, mucosa **lisa e em seu conteúdo lojas hiperecóica flutuantes, sugerindo sangue.**

8. **Baço:** dimensões preservadas, margens finas, superfície lisa e ecogenicidade dentro dos limites da normalidade.

F-

9. **Fígado: contornos definidos, dimensões aumentadas em relação aos limites do gradil costal. Lobulação hepática com margens arredondadas e superfície lisa. Parênquima hepático de ecogenicidade hipoecóica e textura grosseira. Arquitetura vascular de aspecto anatômico quanto ao trajeto e calibre dos vasos. (fígado com ecogenicidade hipoecóica e textura grosseira pode estar relacionado ao linfoma).**

10. **Fígado:** contornos definidos, **dimensões aumentadas** em relação aos limites do gradil costal. Lobulação hepática com **margens arredondadas** e superfície lisa. Parênquima hepático de **ecogenicidade hiperecóica** e textura dentro dos limites da normalidade. Arquitetura vascular de aspecto anatômico quanto ao trajeto e calibre dos vasos. **Sugestivo de esteatose hepática**.

11. **Fígado:** contornos definidos, **dimensões aumentadas** em relação aos limites do gradil costal. Lobulação hepática com **margens arredondadas** e superfície lisa. Parênquima hepático de **ecogenicidade hipoecóica** e textura dentro dos limites da normalidade. Arquitetura vascular de aspecto anatômico quanto ao trajeto e calibre dos vasos.

12. **Fígado: dimensões aumentadas** em relação aos limites do gradil costal. Lobulação hepática com **margens irregulares**. **Parênquima hepático de ecogenicidade heterogênea e textura grosseira**. Arquitetura vascular de aspecto anatômico quanto ao trajeto e calibre dos vasos. **Sugestivo de neoplasia.**

13. **Intestino:** alças intestinais de distribuição topográfica habitual, segmentos de alça de aspecto preservado com relação à estratificação em camadas e ecogenicidade. **Parede de intestino delgado espessada: duodeno medindo 0,57 cm; jejuno medindo 0,51 cm e íleo medindo 0,49 cm (valores de referência de acordo com Graffin S. Journal of feline medicine and sugery, 2019: Duodeno/Jejuno 0,18 a 0,27cm; Íleo com dobras 0,25 a 0,36cm e Cólon 0,10 a 0,25cm).** Peristaltismo normal quanto ao número de movimentos e direção do conteúdo (evolutivo). **Sugestivo de enterite.**

14. **Intestino:** alças intestinais de distribuição topográfica habitual, segmentos de alça de aspecto preservado com relação à estratificação em camadas e ecogenicidade. **Parede de intestino delgado espessada, medindo 0,00 cm (normal 0,20 cm a 0,47cm).** Peristaltismo normal quanto ao número de movimentos e direção do conteúdo (evolutivo). **Sugestivo de enterite, doença intestinal inflamatória, giardíase.**

15. **Intestino: alças intestinais de distribuição topográfica habitual, segmentos de alça de aspecto preservado com relação à estratificação em camadas, ecogenicidade, normoespessada, e moderado meteorismo intestinal. Sugestivo de enterite.**

16. **Intestino:** alças intestinais de distribuição topográfica habitual, segmentos de alça de aspecto preservado com relação à estratificação em camadas e espessura da parede. **Em camada mucosa diversas manchas brilhantes distribuídas dentro da camada, sugerindo doença intestinal inflamatória.** Peristaltismo normal quanto ao número de movimentos e direção do conteúdo (evolutivo).
17. **Intestino: Intestino delgado com dilatação de alça, nesta dilatação, turbilhamento que indica obstrução de alça intestinal. Foi visualizada uma imagem linear com ecogenicidade hiperecóica, sugerindo ser o local da obstrução, pois logo após esta imagem, não havia conteúdo em alça intestinal.**

18. **Intestino:** alças intestinais de distribuição topográfica habitual, segmentos de alça de aspecto preservado com relação à estratificação em camadas e ecogenicidade. **Parede de intestino delgado espessada: duodeno medindo 0,44 cm; jejuno medindo 0,42 cm e íleo medindo 0,37 cm (valores de referência de acordo com Pennick e D` Anjou, 2015 para cães acima de 30kg: Duodeno: 0,44; Jejuno: 0,38; Íleo: 0,38cm e Cólon: 0,15cm).** Peristaltismo normal quanto ao número de movimentos e direção do conteúdo (evolutivo). **Sugestivo de enterite.**

19. **Intestino:** alças intestinais de distribuição topográfica habitual, segmentos de alça de aspecto preservado com relação à estratificação em camadas e ecogenicidade. **Parede de intestino delgado espessada: duodeno medindo 0, cm; jejuno medindo 0, cm e íleo medindo 0, cm (valores de referência de acordo com Pennick e D` Anjou, 2015 para cães com até 15kg: Duodeno: 0,38; Jejuno: 0,30; Íleo: 0,30 cm e Cólon: 0,15cm).** Peristaltismo normal quanto ao número de movimentos e direção do conteúdo (evolutivo). **Sugestivo de enterite.**

20. **Intestino:** alças intestinais de distribuição topográfica habitual, segmentos de alça de aspecto preservado com relação à estratificação em camadas e ecogenicidade. **Parede de intestino delgado espessada: duodeno medindo 0, cm; jejuno medindo 0, cm e íleo medindo 0, cm (valores de referência de acordo com Pennick e D` Anjou, 2015 para cães 15 a 30 kg: Duodeno: 0,41; Jejuno: 0,35; Íleo: 0,35 cm e Cólon: 0,15cm).** Peristaltismo normal quanto ao número de movimentos e direção do conteúdo (evolutivo). **Sugestivo de enterite.**
21.

P

22. **Pâncreas: corpo pancreático com espessura normal medindo 0,86 cm (normal: 0,6 cm a 1 cm), parênquima de ecogenicidade hiperecóica e homogênea. Sugestivo de pancreatite.**

23. **Pâncreas:** corpo pancreático normoespessado medindo 0,89 cm **(normal: 0,6 cm a 1 cm), parênquima de ecogenicidade hipoecóica e homogênea e mesentério reativo em sua volta. Sugestivo de pancreatite.**

24. **Próstata: topografia habitual, contornos definidos, superfície lisa, formato bilobado, dimensões aumentadas medindo 2,03 x 1,92 cm (comprimento e altura em plano longitudinal), ecogenicidade homogênea e mantida. Sugestivo de hiperplasia prostática benigna do cão idoso.**

R

25. **Rins: esquerdo** em topografia habitual, de formato preservado, dimensões simétricas e normais, medindo 4,20 cm apresentando arquitetura mantida (com definição e relação corticomedular preservadas) e ecogenicidade dentro dos

limites da normalidade. **NÃO há evidências sonográficas de dilatação da pelve** ou alteração de espaço retroperitoneal **e com um cálculo de 0,14 cm, próximo à pelve**. **Rim direito medindo 6,41 cm de comprimento (em plano dorsal), com pelve renal dilatada, um cálculo na saída da pelve de 0,64 cm aproximadamente, outro distante da pelve medindo 0,38 cm aproximadamente e um terceiro obstruindo a pelve mais ou menos a uma distância de 3,0 cm do segundo cálculo medindo 0,22 cm de diâmetro aproximadamente. Sugestivo de hidronefrose por obstrução de ureter.**

26. **Rins:** em topografia habitual, de formato preservado, dimensões simétricas e normais. Rim direito medindo 3,67 cm e esquerdo 3,60 cm de comprimento (em plano dorsal), ambos apresentando arquitetura mantida (com definição e relação corticomedular preservadas) e **ecogenicidade aumentada**. Não há evidências sonográficas de dilatação da pelve ou alteração de espaço retroperitoneal. **Sugestivo de Nefrite.**

27. **Rins:** em topografia habitual, de formato preservado, dimensões simétricas e normais. Rim direito medindo 3,33 cm e esquerdo 2,96 cm de comprimento (em plano dorsal), **ambos apresentando ausência de definição corticomedular e ecogenicidade aumentada.** Não há evidências sonográficas de dilatação da pelve ou alteração de espaço retroperitoneal. **Sugestivo de displasia renal.**

28. **Rins:** em topografia habitual, de formato preservado, dimensões simétricas e normais. Rim direito medindo 4,37 cm e esquerdo 4,56 cm de comprimento (em plano dorsal), **ambos apresentando cortical maior que medular (normal: 1:1) e ecogenicidade hiperecóica.** Não há evidências sonográficas de dilatação da pelve ou alteração de espaço retroperitoneal. **Sugestivo de insuficiência renal.**

29. **Rins:** em topografia habitual, de formato preservado, dimensões simétricas e normais. Rim direito medindo 3,67 cm e esquerdo 3,60 cm de comprimento (em plano dorsal), ambos apresentando arquitetura mantida (com definição e relação corticomedular preservadas) e **ecogenicidade aumentada**. Não há evidências sonográficas de dilatação da pelve ou alteração de espaço retroperitoneal. **Sugestivo de Insuficiência Renal.**

30. **Rins:** em topografia habitual, de formato preservado, dimensões simétricas e normais. Rim direito medindo 3,96 cm e esquerdo 2,39 cm de comprimento (em plano dorsal) (normal: 3,00 a 4,30 cm), **ambos apresentando perda da definição corticomedular e ecogenicidade aumentada.** Não há evidências sonográficas de dilatação da pelve ou alteração de espaço retroperitoneal. **Sugestivo de Insuficiência Renal Crônica**.

U

31. **Útero e ovário: Útero medindo 1,72 cm de diâmetro, e sua luz com 1,27 cm de diâmetro, variando seu diâmetro em seu trajeto, com conteúdo anecóico, paredes espessadas e com estruturas circulares anecóicas. Sugestivo de hiperplasia endometrial cística. Piometra e/ou hemometra e/ou mucometra**
    .
32. **Útero: útero medindo 1,32 cm de diâmetro, variando seu diâmetro em seu trajeto. Sugestivo de piometra e/ou hemometra e/ou mucometra e/ou hidrometra.**

33. **Útero e ovário:** não há evidências sonográficas de alterações em útero e ovários. Útero medindo cm de diâmetro em região topográfica de colo uterino (dorsal a bexiga). Ovário esquerdo de dimensões simétricas 0,90 x 0,60 cm (comprimento x altura em plano longitudinal), e direito de dimensões simétricas 1,04 cm x 0,63 cm (comprimento x altura em plano longitudinal).

V

34. **Vias biliares dilatadas em porção inicial. Sugestivo De *Platynosomun fastosun.***
35. **Vesícula biliar:** com repleção líquida moderada, **paredes espessadas, medindo 0,38 cm de espessura (normal: menor que 0,30 cm),** mucosa lisa e conteúdo anecogênico e homogêneo. Ducto cístico de aspecto normal. Não há evidências ultrassonográficas de alterações em vias biliares. **Sugestivo de colecistite**
    .
36. **Vesícula biliar:** com repleção líquida moderada, paredes finas, medindo 0,10 cm de espessura (normal: menor que 0,30 cm), mucosa lisa **e em seu conteúdo: lama biliar.** Ducto cístico de aspecto normal. Não há evidências ultrassonográficas de alterações em vias biliares

37. **Vesícula biliar:** com repleção líquida moderada**, paredes espessadas, medindo 0,24 cm de espessura (normal: menor que 0,20 cm), sugestivo de colecistite, mucosa lisa e conteúdo discreta lama biliar. Vias biliares com paredes hiperecogênicas, aspecto dilatado e tortuoso, sendo sugestivo de colangite (colangites neutrofílicas ou colangites linfocíticas ou colangites crônicas associadas à parasitas hepáticos (*Platynosomum sp*).**

38. **Observação: Paciente apresenta anel herniário de 2,37 cm de comprimento em região inguinal, apresentando em seu interior alças intestinais.**

39. **Observação: líquido livre em cavidade abdominal de ecogenicidade anecóica. Ascite moderada.**

40. **em seu conteúdo imagem móvel de contornos irregulares, ecotextura mista e várias lojas anecogênicas (coágulo)**

41. **.Observação:** não há evidências sonográficas de alterações em glândulas mamárias.

42. **Observação: as imagens do exame ultrassonográfico segue nas próximas páginas.**