

5.1. Funções de Estatísticas parte 2

5.1.1. Função CONT.NÚM

A função CONT.NÚM conta o número de células que contêm números e conta os números na lista de argumentos.

Use a função CONT.NÚM para obter o número de entradas em um campo de número que esteja em um intervalo ou uma matriz de números.

Por exemplo, você pode inserir a seguinte fórmula para contar os números no intervalo A1:A20: =CONT.NÚM(A1:A20).

Os argumentos que são números, datas ou uma representação de texto de números (por exemplo, um número entre aspas, como "1") são contados.

Os valores lógicos e as representações de números por extenso que você digita diretamente na lista de argumentos são contados.

Os argumentos que são valores de erro ou texto que não podem ser convertidos em números não são contados.

Se um argumento for uma matriz ou referência, somente os números dessa matriz ou referência serão contados.

Células vazias, valores lógicos, texto ou valores de erro da matriz ou referência não são contados.

Sua sintaxe seria:

=CONT.NÚM(valor1;valor2;...)

Exemplo:

C4						
	A	B	C	D	E	F
1	Palavra					
2	Número					
3	2					
4	"2"		3			
5	68					
6	7					
7	01/12/219					

5.1.2. Função CONT.VALORES

A função CONT.VALORES conta o número de células que não estão vazias em um intervalo.

A função CONT.VALORES conta as células contendo qualquer tipo de informações, incluindo valores de erros e texto vazio ("").

Por exemplo, se o intervalo contiver uma fórmula que retorna uma cadeia vazia, a função CONT.VALORES contará esse valor.

A função CONT.VALORES não conta células vazias.

Se não precisar contar valores lógicos, texto ou valores de erro (em outras palavras, se quiser contar apenas as células que contêm números), use a função CONT.NÚM.

Sua sintaxe seria:

=CONT.VALORES(valor1; [valor2]; ...)

Exemplo:

C4						
	A	B	C	D	E	F
1	Palavra					
2						
3	2					
4	"2"		5			
5						
6	7					
7	01/12/219					

5.1.3. Função CONTAR.VAZIO


A função CONTAR.VAZIO, conta o número de células vazias em um intervalo de células.

Células com fórmulas que retornam "" (texto vazio) também são contadas. Células com valores nulos não são contadas.

Sua sintaxe seria:

=CONTAR.VAZIO(intervalo)

Exemplo:



	A	B	C	D	E	F
1	Palavra					
2						
3	2					
4	"2"		2			
5						
6	7					
7	01/12/219					

5.1.4. Função ORDEM.EQ

Retorna a posição de um número em uma lista de números. Seu tamanho em relação a outros valores de uma lista; se mais de um valor tiver a mesma posição, a posição superior desse conjunto de valores será retornada. Se você fosse classificar a lista, a ordem do número seria a sua posição.

Se **Ordem** for 0 ou omitido, o Excel ordenará o **Número** como se **Ref** (referência) fosse uma lista classificada na ordem descendente.

Se **Ordem** for qualquer valor diferente de zero, o Excel ordenará o **Número** como se **Ref** fosse uma lista classificada na ordem ascendente.

ORDEM.EQ fornece números duplicados na mesma ordem. No entanto, a presença de números duplicados afeta a ordem dos números subsequentes. Por exemplo, em uma lista de números inteiros classificados em ordem crescente, se o número 10 aparecer duas vezes e tiver uma ordem de 5, então 11 teria uma ordem de 7 (nenhum número teria uma ordem de 6).

Para algumas finalidades, é possível usar uma definição de ordem que considere os empates.


No exemplo anterior, você precisaria de uma ordem revista de 5,5 para o número 10. Isso pode ser feito por meio da adição do fator de correção a seguir ao valor retornado por ORDEM.EQ.

Esse fator de correção é apropriado tanto para o caso em que a ordem é calculada em ordem decrescente (ordem = 0 ou omitida) quanto em ordem crescente (ordem = valor diferente de zero).

Sua sintaxe seria:

=ORDEM.EQ(núm;ref;[ordem])

Exemplo:



	A	B	C	D	E
1		Jogador	Pontos	Rank Crescente	
2		Jogador 1	154	3	

5.1.5. Função MED

Retorna a mediana dos números indicados. A mediana é o número no centro de um conjunto de números.

Se houver uma quantidade par de números no conjunto, MED calculará a média dos dois números do meio.

Os argumentos podem ser números, nomes, matrizes ou referências que contenham números.

Os valores lógicos e representações em forma de texto de números digitados diretamente na lista de argumentos são contados.

Se uma matriz ou argumento de referência contiver texto, valores lógicos ou células vazias, estes valores serão ignorados; no entanto, células com valor zero serão incluídas.

Sua sintaxe seria:

=MED(núm 1; [núm 2]...)

Exemplo:

C4				=MED(A1:A7)	
	A	B	C	D	E
1	485				
2	64				
3	7				
4	15		12		
5	12				
6	1				
7	3				

5.1.6. Função MÁXIMOS

A função MÁXIMOS retorna o valor máximo entre as células especificadas por um determinado conjunto de critérios ou condições.

Sua sintaxe seria:

=MÁXIMOS(intervalo_máximo; intervalo_critériosN; critérioN; ...)

O tamanho e a forma dos argumentos **intervalo_máximo** e **intervalo_critériosN** devem ser iguais; caso contrário, as funções retornarão o erro **#VALOR!**.

Exemplo:

B7		=MÁXIMOS(C2:C6;A2:A6;"M*")	
	A	B	C
1	Vendedor	Região	Lucro
2	Maria	Leste	R\$ 45.678,00
3	Pedro	Oeste	R\$ 23.789,00
4	Marcos	Norte	R\$ 4.789,00
5	João	Sul (Novo Escritório)	R\$ 50.000,00
6	Marcelo	Centro-Oeste	R\$ 9.678,00
7	Máximo vendedores iniciem com a letra M	R\$ 45.678,00	

5.1.7. Função MÍNIMOS

A função MÍNIMOS devolve um valor mínimo entre as células especificadas, de acordo com um determinado conjunto de condições ou critérios.

Sua sintaxe seria:

=MÍNIMOS(intervalo_mínimo; Critérios_intervalo1; Critério1; ...)

Exemplo:

B7		=MÍNIMOS(C2:C6;A2:A6;"M*")	
	A	B	C
1	Vendedor	Região	Lucro
2	Maria	Leste	R\$ 45.678,00
3	Pedro	Oeste	R\$ 23.789,00
4	Marcos	Norte	R\$ 4.789,00
5	João	Sul (Novo Escritório)	R\$ 50.000,00
6	Marcelo	Centro-Oeste	R\$ 9.678,00
7	Mínimo vendedores iniciem com a letra M	R\$ 4.789,00	