

Primeiro Autor1; Segundo Autor2; Terceiro Autor3; Quarto Autor4; Orientador5. **(SEGUIR PADRÃO COM OS NOMES DE VOCÊS)**

GRUPO xxx

Universidade Nove de Julho – São Paulo – SP – Brasil

INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson é caracterizada por distúrbios motores como o tremor, rigidez, bradicinesia, fenômeno da parada, perda de reflexos e instabilidade postural, influenciando no equilíbrio destes pacientes. PRADO, et al. (1) baseando-se na importância do tronco na estabilidade postural, realizaram um estudo, utilizando em pacientes pakinsonianos a técnica FES associada à cinesioterapia, visando a melhora do padrão postural funcional dos pacientes.

INSERIR SUA INTRODUÇÃO EM NO MAXIMO 2 PARAGRAFOS - Tamanho da fonte 32

OBJETIVO

Assim este trabalho visou avaliar a instabilidade postural nestes pacientes, antes e após um programa de tratamento para o tronco a fim de elaborar um melhor programa de terapia para os mesmos.

INSERIR SEUS OBJETIVOS EM 1 FRASE ÚNICA - Tamanho da fonte 32

DESENVOLVIMENTO

Inserir no mínimo 3 parágrafos do seu trabalho escrito, abordando os principais assuntos - Tamanho da fonte 32

No mínimo 3 parágrafos (pode ter imagens, tabelas, etc)

RESULTADOS


Os dados foram analisados por meio do Google Forms com levantamento de dados com pesquisa no tema xxxxxx para assim compreender e elucidar os objetivos do trabalho (escreva 1 paragrafo DE TEXTO de resultados...) O questionário foi elaborado é composto por 5 questões com o intuito de quantificar os objetivos desejados, e x questões para a identificação do perfil dos respondentes (questões iniciais)

Inserir perguntas e gráficos obtidos no trabalho

Tamanho da fonte 32

Modelo

Gráfico 1 – Qual o principal motivo da mudança de plano de saúde



Fonte: Agência Nacional de Saúde suplementar, Governo do Estado de São Paulo (2021)

Modelo de Tabela

Tabela 1 – Variação média do desvio latero lateral e valor P encontrado pelo teste estatístico T de Student (probabilidade à 5%)

Voluntários	Antero – Posterior 1	Antero– posterior 2	P
Paciente 1	0,540017094	0,377597	0,849691
Paciente 2	0,383785461	0,556496	0,997633
Paciente 3	0,49725537	0,639599	0,459203
Paciente 4	0,95145161	0,873886	0,908002

Fonte: Elaborado pelos autores nesta pesquisa (2025)

CONCLUSÃO

Este trabalho demonstrou que não houve melhora do equilíbrio dos pacientes com doença de Parkinson submetidos ao tratamento convencional e FES para fortalecimento de tronco. Diferente dos resultados observados por PRADO, et al. (2), que também utilizaram a cinesioterapia e eletromusculação, porem em um periodo de 10 meses, não citando dias da semana e horas, cujos resultados apresentaram melhora do padrão postural e funcional.

Apesar de um resultado não satisfatório com relação ao déficit de equilíbrio, fica a sugestão para que outros trabalhos possam ser realizados com este enfoque, aumentando-se talvez o tempo de tratamento e o numero de pacientes.

INSERIR SUA CONCLUSÃO SOMANDO COM OS RESULTADOS DA PESQUISA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS – **CITAR AQUI SOMENTE OS COLOCADOS NO TEXTO**

1. PRADO, R. A.; NUNES, I. T.; KODA, L. C.; GOMES, C. Proposta de tratamento com estimulação elétrica funcional – FES, associada a cinesioterapia na doença de Parkinson. **Revista Medicina de Reabilitação**, 2000, v. 52, p. 23-27.

2. PIEMONTE, M. E. P. Manual de Exercícios Domiciliares para Pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica. **1ª ed. São Paulo: Manole, 2001.**