

---

## 数值积分和数值微分

Lucian Xu (app1eDog)

2023 年 6 月 2 日

## 数值积分和数值微分

对于定积分  $I(f) = \int_a^b f(x)dx$ , 一般的数值积分的公式为:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

### 插值型求积公式

#### 插值型求积公式

给定  $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ , 已知  $f(x)$  在这些点的函数值. 根据插值理论,  $f(x)$  的  $n$  次插值多项式  $L_n(x)$  为

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) \prod_{j=0, j \neq k}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j} = \sum_{k=0}^n f(x_k) I_k(x).$$

这时

$$\begin{aligned} I(f) &= \int_a^b f(x)dx \\ &\approx \int_a^b L_n(x)dx \\ &= \sum_{k=0}^n \left( \int_a^b I_k(x)dx \right) f(x_k) := I_n(f), \end{aligned}$$

其中  $A_k = \int_a^b I_k(x)dx$ .

**Def 5.1** 积分系数形如上述  $A_k = \int_a^b I_k(x)dx$  的积分公式被称为插值型求积公式.

记  $R(f) = I(f) - I_n(f)$ , 被称为插值型求积公式的截断误差, 根据插值多项式的余项可以估计截断误差为

$$R(f) = I(f) - I_n(f) = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)dx, \xi \in (a, b).$$

**Def 5.2** 如果  $x_k$  是等距的, 则对应的插值型求积公式为 Newton-Cotes 公式.

这时

$$A_k = \int_a^b I_k(x)dx = (b-a) \frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k! \cdot (n-k)!} \int_0^n \prod_{j=0, j \neq k}^n (t-j)dt, k = 0, 1, \cdots, n.$$

再次进行记号的简化, 设

$$C_{n,k} = \frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k! \cdot (n-k)!} \int_0^n \prod_{j=0, j \neq k}^n (t-j), k = 0, 1, \cdots, n,$$

则 Newton-Cotes 公式可以写成

$$I_n(f) = (b-a) \sum_{k=0}^n C_{n,k} f(x_k),$$

给出一些特殊取值的情形: 1. 2 个点的插值型求积公式, 这时  $n = 1, h = b - a$ ,

$$T(f) = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)),$$

称为梯形公式. 2. 3 个点的插值型求积公式, 这时  $n = 2, h = \frac{b-a}{2}$ ,

$$S(f) = \frac{b-a}{6} \left( f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right),$$

称为 Simpson 公式. 3. 5 个点的插值型求积公式, 这时  $n = 4, h = \frac{b-a}{4}$ ,

$$C(f) = \frac{b-a}{90} \left( 7f(a) + 32f\left(\frac{3a+b}{4}\right) + 12f\left(\frac{a+b}{2}\right) + 32f\left(\frac{a+3b}{4}\right) + 7f(b) \right),$$

称为 Cotes 公式.

#### 代数精度

$n + 1$  个点的插值型公式求积公式的代数精度至少是  $n$ .

#### Th 5.3

求积公式  $I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$  的代数精度至少是  $n$  等价于该求积公式是插值型求积公式.

#### 梯形公式, Simpson 公式和 Cotes 公式

巴拉巴拉一堆计算, 结论大概是

$$R_T(f) = \text{const}_T \cdot (b-a)^3 f^{(2)}(\xi), \xi \in (a, b),$$

$$R_S(f) = \text{const}_S \cdot (b-a)^5 f^{(4)}(\xi), \xi \in (a, b),$$

$$R_C(f) = \text{const}_C \cdot (b-a)^7 f^{(6)}(\xi), \xi \in (a, b).$$

#### 复化求积公式

将区间  $[a, b]$  等分, 每一个区间的积分分开计算, 也就是  $I(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx$ .

**复化梯形公式**

对每一个小区间的积分应用梯形公式, 就得到了复化梯形公式.

$$T_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{2} (f(x_k) + f(x_{k+1})).$$

先说先验误差, 不妨设  $f^{(2)}(x)$  有界, 对于给定精度  $\varepsilon$ , 只要  $h$  满足

$$\frac{b-a}{12} M h^2 \leq \varepsilon,$$

就会有

$$|I(f) - T_n(f)| \leq \varepsilon.$$

后验误差是在倍增的基础上得到的, 对于给定精度  $\varepsilon$ , 如果

$$\frac{1}{3} |T_{2n}(f) - T_n(f)| \leq \varepsilon,$$

就会有

$$|I(f) - T_n(f)| \leq \varepsilon.$$

接着有一个递推式

$$T_{2n}(f) = \frac{1}{2} T_n(f) + \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right).$$

**复化 Simpson 公式**

记  $x_{k+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(x_k + x_{k+1})$ , 对每一个小区间应用 Simpson 公式, 就得到了复化 Simpson 公式.

$$S_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{6} \left( f(x_k) + 4f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right) + f(x_{k+1}) \right).$$

这时先验误差和后延误差的条件分别变成了

$$\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 M \leq \varepsilon,$$

以及

$$\frac{1}{15} |T_{2n}(f) - T_n(f)| \leq \varepsilon,$$

这里的  $M$  是对  $f^{(4)}$  的控制.

**复化 Cotes 公式**

记  $x_{k+\frac{1}{4}} = \frac{1}{4}(3x_k + x_{k+1})$ ,  $x_{k+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(x_k + x_{k+1})$ ,  $x_{k+\frac{3}{4}} = \frac{1}{4}(x_k + 3x_{k+1})$ , 对每一个小区间应用 Cotes 公式, 就得到了复化 Cotes 公式.

$$C_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{90} \left( 7f(x_k) + 32f\left(x_{k+\frac{1}{4}}\right) + 12f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right) + 32f\left(x_{k+\frac{3}{4}}\right) + 7f(x_{k+1}) \right).$$

这时先验误差和后延误差的条件分别变成了

$$\frac{b-a}{945} \left(\frac{h}{4}\right)^6 M \leq \varepsilon,$$

以及

$$\frac{1}{63} |T_{2n}(f) - T_n(f)| \leq \varepsilon,$$

这里的  $M$  是对  $f^{(6)}$  的控制.

**复化求积公式的阶数****Def 5.4**

如果存在正整数  $p$  和非负常数  $C$  使得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{I(f) - I_n(f)}{h^p} = C,$$

则称公式  $I_n(f)$  是  $p$  阶的.

**Romberg 求积法**

以梯形公式为例, 在计算后延误差的时候有  $I(f) - T_{2n}(f) \approx \frac{1}{3}(T_{2n}(f) - T_n(f))$ , 上式可以写成

$$I(f) \approx \frac{4}{3}T_{2n}(f) - \frac{1}{3}T_n(f).$$

这表明可以用上式右边近似  $I(f)$ .

计算发现

$$\begin{aligned}
 \frac{4}{3}T_{2n}(f) - \frac{1}{3}T_n(f) &= \frac{4}{3} \sum_{k=0}^{n-1} \left( \frac{h}{4} (f(x_k) + f(x_{k+\frac{1}{2}})) + \frac{h}{4} (f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1})) \right) \\
 &\quad - \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{2} (f(x_k) + f(x_{k+1})) \\
 &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{6} (f(x_k) + 4f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1})) \\
 &= S_n(f).
 \end{aligned}$$

也就是说对梯形公式进行 Romberg 求积即可得到 Simpson 公式. 同样地, 对 Simpson 公式进行 Romberg 求积会得到 Cotes 公式. 接着对 Cotes 公式进行 Romberg 求积得到的被称为 Romberg 公式, 其是 8 阶的, 从而可以得到

$$I(f) - R_{2n}(f) \approx \frac{1}{255} (R_{2n}(f) - R_n(f)).$$

区间等分数							
(n)	$T_n(f)$		$S_n(f)$		$C_n(f)$		$R_n(f)$
1	$T_1$		$S_1$		$C_1(f)$		$R_1(f)$
	↓	↗	↓	↗	↓	↗	↓
2	$T_2$		$S_2$		$C_2(f)$		$R_2(f)$
	↓	↗	↓	↗	↓	↗	↓
4	$T_4$		$S_4$		$C_4(f)$		⋮
	↓	↗	↓	↗	↓		
8	$T_8$		$S_8$		⋮		
	↓	↗	⋮				
16	$T_{16}$						
	⋮						

## Gauss 求积公式

### Def 5.5

如果  $I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$  的代数精度为  $2n + 1$ , 那么这个求积公式为 Gauss-Legendre 公式, 对应的点  $x_k$  称为 Gauss 点.

**Th 5.6**

$I_n(f)$  是计算积分  $I(f)$  的插值型求积公式, 记

$$W_{n+1} = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n),$$

那么求积公式  $I(f) \approx I_n(f)$  是 Gauss 求积公式 (代数精度  $2n + 1$  或  $\{x_k\}$  为 Gauss 点)  $\Leftrightarrow W_{n+1}$  与任意一个次数不超过  $n$  的多项式  $p(x)$  正交.

**Gauss - Legendre 求积公式****Def 5.7**

正交多项式. 正交多项式  $\{g_k(x)\}_{k=0}^{\infty}$ .

**Th 5.8**

设  $\{g_k(x)\}_{k=0}^{\infty}$  为区间  $[a, b]$  上的正交多项式序列, 那么对任意的  $n$ , 多项式

$$g_0(x), g_1(x), \cdots, g_n(x)$$

都线性无关. 那么它们构成的  $n$  次多项式空间的一组基, 从而  $g_n(x)$  与任意一个次数不超过  $n - 1$  的多项式正交.

**Th 5.9**

设  $\{g_k(x)\}_{k=0}^{\infty}$  为区间  $[a, b]$  上的正交多项式序列, 则  $g_n(x)$  在  $(a, b)$  上有  $n$  个不同的零点.

( why? )

**Def 5.10**

Legendre 多项式:

$$P_n(t) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n (t^2 - 1)^n}{dt}, n = 0, 1, 2, \cdots$$

**Th 5.11**

Legendre 多项式序列是  $[-1, 1]$  上的正交多项式序列.

**区间  $[-1, 1]$  上的 Gauss 公式**

根据前面 Legendre 多项式的介绍, 可以想到  $n + 1$  次 Legendre 多项式  $P_{n+1}(t)$  的零点就是 Gauss 点. 那么求积系数为

$$A_k = \int_{-1}^1 \prod_{j=0, j \neq k}^n \frac{t - t_j}{t_k - t_j} dt, k = 0, 1, \cdots, n.$$

1. 当  $n = 0$  时,  $t_0 = 0, A_0 = 2$ , 得到 1 个节点的 Gauss 公式

$$\int_{-1}^1 g(t) dt \approx 2g(0).$$

2. 当  $n = 1$  时,  $t_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, t_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}, A_0 = 1, A_1 = 1$ , 得到 2 个节点的 Gauss 公式

$$\int_{-1}^1 g(t) dt \approx g\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

3. 当  $n = 2$  时,  $t_0 = -\sqrt{\frac{3}{5}}, t_1 = 0, t_2 = \sqrt{\frac{3}{5}}, A_0 = \frac{5}{9}, A_1 = \frac{8}{9}, A_2 = \frac{5}{9}$ , 得到 3 个节点的 Gauss 公式

$$\int_{-1}^1 g(t) dt \approx \frac{5}{9}g\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9}g(0) + \frac{5}{9}g\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right).$$

区间  $[a, b]$  上的 Gauss 公式

只需要想办法把区间  $[-1, 1]$  迁移变成区间  $[a, b]$  即可.

考虑变换  $x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t$ , 可得

$$I(f) = \int_{-1}^1 \frac{b-a}{2} f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t\right) dt,$$

接着由  $[-1, 1]$  上的 Gauss 公式可以得到  $[a, b]$  上的 Gauss 公式

$$\begin{aligned} I_n(f) &= \sum_{k=0}^n \frac{b-a}{2} A'_k f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t_k\right) \\ &= \sum_{k=0}^n A_k f(x_k). \end{aligned}$$

**Gauss 公式的截断误差**

设  $f(x) \in C^{2n+2}[a, b]$ , 截断误差为

$$\begin{aligned} R(f) &= \int_a^b f(x) - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \\ &= \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \int_a^b W_{n+1}^2(x) dx, \end{aligned}$$



其中  $W_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$ ,  $\xi \in (a, b)$ .

### Th 5.12

Gauss 公式的代数精度最多  $2n + 1$ .

### Gauss 公式的稳定性和收敛性

### Th 5.13

Gauss 公式的求积系数  $A_k > 0$ .

先说稳定性.

在利用求积公式时,  $f(x_k)$  往往是存在误差的, 实际上得到的是  $I_n(\tilde{f}) = \sum_{k=0}^n A_k \tilde{f}_k$ .

### Def 5.14,

对于求积公式  $I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ , 其近似值  $I_n(\tilde{f}) = \sum_{k=0}^n A_k \tilde{f}_k$ , 如果对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $\max_{0 \leq k \leq n} |f(x_k) - \tilde{f}_k| < \delta$  时, 有  $|I_n(f) - I_n(\tilde{f})| < \varepsilon$ , 就称这个求积公式是稳定的.

### Th 5.15

Gauss 公式是稳定的.

( Why? )

再说收敛性.

### Def 5.16

给定求积公式  $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k^{(n)} f(x_k^{(n)})$ , 如果任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N > 0$ , 当  $n > N$ , 有  $|I(f) - I_n(f)| < \varepsilon$ , 则称该求积公式收敛.

### Th 5.17

设  $f(x) \in C[a, b]$ , 则 Gauss 公式收敛.

( Why? )

### 带权积分

积分

$$I(f) = \int_a^b \rho(x) f(x) dx$$

称为带权积分, 其中  $\rho(x)$  称为权, 并且要满足如下三个条件:

1.  $\rho(x) \geq 0, x \in (a, b)$ ,
2.  $\int_a^b \rho(x) dx > 0$ ,
3. 对  $k = 0, 1, 2, \dots$ , 积分  $\int_a^b x^k \rho(x) dx$  存在.

依旧有代数精度的定义, 代数精度为  $2n + 1$  时依旧被称为 Gauss 公式.

常用带权积分:

#### 1. Gauss-Chebyshev 求积公式

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \frac{\pi}{n+1} \sum_{k=0}^n f(x_k).$$

其中  $x_k$  是  $n + 1$  次 Chebyshev 多项式的零点.

#### 2. Gauss-Hermite 求积公式

$$\int_{-1}^1 e^{-x^2} f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

其中  $x_k$  是  $n + 1$  次 Hermite 多项式的零点.

### 重积分的近似计算

自然是将重积分化为累次积分对  $x, y$  分别利用前面的方法.

### 数值微分

向前差商:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

向后差商:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h},$$

中心差商:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h},$$

将  $f(x_0 + h)$  与  $f(x_0 - h)$  在  $x_0$  处 Taylor 展开可以得到

$$\begin{aligned} f'(x_0) - \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= -\frac{h}{2}f''(x_0) + O(h^2), \\ f'(x_0) - \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} &= \frac{h}{2}f''(x_0) + O(h^2), \\ f'(x_0) - \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} &= -\frac{h^2}{6}f'''(x_0) + O(h^3). \end{aligned}$$

单单从步长  $h$  来看, 步长越小自然理论结果越准确, 但是从计算角度来看会造成有效数字的严重损失.

### 插值型求导公式

建立插值多项式  $p_n(x) \approx f(x)$ , 并且取

$$f'(x) \approx p'_n(x)$$

得到的就是插值型求导公式.

截断误差为

$$f'(x) - p'_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} W'_{n+1}(x) + \frac{W_{n+1}(x)}{(n+1)!} \frac{d}{dx} f^{(n+1)}(\xi),$$

对于插值节点来说, 截断误差只有前面一项.

### 两点插值

插值结果为

$$p_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1),$$

记  $h = x_1 - x_0$ , 可得

$$p'_1(x) = \frac{1}{h}(-f(x_0) + f(x_1)),$$

带余项的两点公式为

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \frac{1}{h} [f(x_1) - f(x_0)] - \frac{h}{2} f''(\xi_0), (x_0 < \xi_0 < x_1), \\ f'(x_1) &= \frac{1}{h} [f(x_1) - f(x_0)] - \frac{h}{2} f''(\xi_1), (x_0 < \xi_1 < x_1). \end{aligned}$$

### 三点差值

插值结果为

$$p_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x - x_2)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2),$$

记  $h = x_1 - x_0 = x_2 - x_1$ , 可得带余项的三点公式为

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)] + \frac{h^2}{3} f'''(\xi_0), (x_0 < \xi_0 < x_2),$$

$$f'(x_1) = \frac{1}{2h} [-f(x_0) + f(x_2)] - \frac{h^2}{6} f'''(\xi_1), (x_0 < \xi_1 < x_2),$$

$$f'(x_2) = \frac{1}{2h} [f(x_0) - 4f(x_1) + 3f(x_2)] + \frac{h^2}{3} f'''(\xi_2), (x_0 < \xi_2 < x_2).$$