

PREGUNTERO 2022

1. Ca renal mas frecuente (no esta el de celulas claras)
 - a. hipernefoma
 - b. sarcoma renal
 - c. células transicionales
 - d. tumor de wilms
2. tto giardiasis:
 - a. metronidazol
 - b. albendazol
3. tto ascariasis no complicada:
 - a. tinidazol
 - b. mebendazol
4. Cuando se diagnostica en ecografia el embarazo gemelar:
 - a. 8-12 semanas
 - b. 18-24
 - c. 20-24
5. En que caso se ve en eco el "estomago pequeño" en el feto
 - a. atresia esofagica
 - b. atresia yeyunal
 - c. atresia ano
 - d. malrotacion intestinal
6. Origen embriologico del útero
 - a. conductos de muller
 - b. conducto de wolf
7. el aleron anterior del ligamento ancho esta constituido por:
 - a. ligamento redondo
 - b. ligamento uteroovarico
 - c. trompa de falopio
8. cual de todos estos farmacos provoca ginecomastia como ram:
 - a. espironolactona
 - b. hidroclortiazida
 - c. morfina
9. Caso de hombre con hipersecreción y miosis. Estuvo haciendo trabajo en jardinería. Intoxicacion por:
 - a. organofosforados
 - b. organoclorados
 - c. hidrocarburos
10. diámetro mas grande del estrecho superior
 - a. conjugata vera que mide 13.5 cm
 - b. transverso anatomico 13,5 cm
 - c. transverso oblicuo
 - d. transverso util
11. Paciente de 35 semanas con clinica de corioamnionitis, conducta:
 - a. extraer el feto por cualquier via
 - b. reposo, atb y esperar tdp
 - c. maduracion pulmonar, reposo...

12. Niño con hemofilia por deficiencia de factor VIII grave, sufre caída de bicicleta, sin pérdida de conocimiento, solo hematoma en cabeza, que hacer:
- tac con contraste
 - enviarlo al hogar
 - internar y vigilar evolución
 - administrar factor VIII
13. test de schiller negativo que significa: epitelio normal
14. niño 5 meses con esteatorrea, diarrea, no gana peso. Que hay que hacer?
- Test del sudor,
 - coprocultivo
 - medir ph de materia fecal
 - buscar cuerpos reductores en materia fecal
15. que patologia se puede diagnosticar por cariotipo?
- Síndrome de down
 - Patau
 - Fibrosis quística
 - Marfan
16. Que pedis cuando sospechas adenomiosis?
- RMN
 - ecografía transvaginal
 - laparoscopia
17. Factor de riesgo para enfermedad coronaria
- menor de 40 años
 - hdl disminuida
 - HTP
18. Con respecto a abdomen agudo marcar correcta:
- el funcional es el mas frecuente
 - la causa mas frecuente de hemorrágico es el EE complicado
 - es mas facil identificar la causa del AA en la embarazada (algo así)
19. Signo o sintoma mas específico en niño al que se le sospecha diagnóstico de neumonía?
- taquipnea
 - tos seca
 - dolor al toser
20. la antroversión del útero se refiere a:
- el eje del útero con respecto al eje del cuello uterino
 - el eje del útero con respecto al eje de la pelvis
 - el eje del útero con respecto al eje de la vejiga
21. El dolor de la fisura anal es
- postevacuatorio
 - intraevacuatorio
 - preevacuatorio
 - constante
22. Causa mas frecuente de proctorragia en el adulto
- hemorroides
 - fisura
23. Síntomas en cushing, marcar el correcto:
- miopatía

- b. hipotension
 - c. hipoglucemia
24. signo en insuficiencia aortica
- a. hippus pupilar
 - b. lagofthalmos
 - c. retraccion de parpado
25. paciente diabetico que consulta por parestesias bilaterales, calambres, etc, diagnostico?:
- a. polineuropatia
 - b. mononeuropatia
26. Forma de presentacion mas frecuente del cancer renal
- a. asintomatico, se lo descubre como incidentaloma
 - b. triada hematuria, dolor, masa palpable
27. Paciente joven sin antecedentes, se diagnostica colelitiasis, conducta:
- a. colecistectomia por videolaparoscopia
 - b. expectante
28. Niño con antecedente de impetigo, presenta edema periorbitario bilateral, hipertension y hematuria: Sx nefritico
29. Niño de 9 meses con dolor abdominal, letargo, llora y se calma, deposición roja oscura:
- a. SUH
 - b. invaginacion intestinal
30. Aporte nutricional a un niño con desnutricion moderada, cuantas calorías diarias y proteínas hay que darle.
- a. 120-150 mg/kg/dia y 3 gr de proteínas
 - b. 100 mg/kg/dia y 2 gr de proteínas
 - c. 180 mg/kg/dia y 2 gr proteínas
 - d. 200 mg/kg/dia y 4 gr proteínas
31. A que se asocia la esplenectomia:
- a. leucocitosis
 - b. hepatitis
 - c. colecistitis
 - d. trombocitopenia
32. Primer parametro que disminuye en anemia ferropenica
- a. hemoglobina
 - b. ferremia
 - c. ferritina
 - d. saturacion de la transferrina
33. Paciente joven consulta para solicitar anticoncepcion, que hacer: ACO+ preservativo, consejeria para prevencion de its. Habia otras opciones que hablaban que primero habia que pedirle estudios o hacerle pap y colpo y recien darle los aco cuando tengas los resultados... no.
32. Principal consulta de niñas:
- a. vulvovaginitis
 - b. amenorrea
 - c. obesidad e hirsutismo
 - d. its
33. Principal motivo de consulta en cancer esofagico
- a. disfagia

- b. dolor
- 34. Si consulta un anciano con clinica de sindrome pilorico cual es la causa que piensas:
 - a. cancer gastrico
 - b. hipertrofia pilorica
- 35. Que es lo primero que solicitas cuando sospechas colestasis
 - a. ecografia
 - b. ERCP
 - c. rx abdomen
- 36. Cuando sospechas que hay sinusitis (esta en otros pregunteros)
 - a. con clinica
 - b. rx
- 37. Cefalea en pediatria tipo en racimos, pensar:
 - a. migraña
 - b. tensional
 - c. htec
 - d. hemorragia
- 38. Acalasia se define por:
 - a. falta de relajacion del EEI
 - b. falta de relajacion del cuerpo esofagico y del EEI
 - c. falta de relajacion del esfinter esof superior y del cuerpo (creo)
- 39. Sintoma mas frecuente de hipertiroidismo:
 - a. Taquicardia
 - b. Exoftalmos
 - c. Diarrea
 - d. perdida de pelo
- 40. Agente etiológico de FR: Streptococo B hemolitico del grupo A
- 41. Signo de parkinson:
 - a. bradicinesia
 - b. signo de la navaja
 - c. hiperreflexia
- 42. Niño con hematuria, orina espumosa: Sc nefrotico
- 43. Hacia donde se desvia el ojo en la parálisis del VI par: Hacia adentro
- 44. Cual de todas estas es una presentacion:
 - a. podalica
 - b. transversa
 - c. oblicua
- 45. Cual de estas es correcta sobre la sutura sagital: Va del bregma hacia la fontanela menor, el punto medio corresponde la vertice, algo así...
- 45. Que se afecta en la desnutricion aguda
 - a. peso
 - b. talla
 - c. peso y talla
 - d. perimetro cefalico
- 46. Causa de hipotiroidismo en lugares donde el yodo es suficiente: Autoinmune
- 47. Peritonitis bacteriana espontanea, en quienes se presenta?
 - a. cirrosis con ascitis
 - b. otras causas descabelladas que no son correctas ni a palos jaja
- 48. Cual es la tercer maniobra de leopold

49. Casito de hemorragia posparto con hipotension, utero blando: Atonia uterina
50. Arteria ovarica: Aorta
51. Factor de riesgo para placenta acreta
- a. primipara
 - b. cesarea previa
52. Itu baja se caracteriza por:
- a. ser mas frecuente en la mujer
 - b. causar fiebre 38
 - c. dolor lumbar
53. Que le solicitas a una mujer con feto muerto y retenido
- a. enzimas hepaticas
 - b. Fibrinogenemia
 - c. orina completa
54. Que hacer en un paciente con HDA activa?
- a. Canalizar y tt energico con ringer lactato
 - b. Balon
 - c. Angiografia...
55. Mujer 25 años con dolor abdominal y signos de shock. Hay que estabilizar hemodinamicamente
56. Caso paciente con dolor post defecacion, estrias de sangre en papel higienico: Fisura
57. Si una mujer de 40 años tiene antecedentes de abortos, parto prematuro, accidente isquemico transitorio, que pensas: Sindrome antifosfolipidos
58. Con que hb se diagnostica anemia en la embarazada
- a. 11
 - b. 12
 - c. 13
 - d. 14
59. Niño 13 años con dolor en escroto (creo que era) y reflejo cremasteriano ausente: Torsion testicular
60. Que produce la hipopotasemia en el ecg: Prolongacion del QT
61. Traumatismo cerrado en niño, produce mas daño en;:
- a. higado
 - b. bazo
62. Consentimiento informado
63. Autonomia
64. Historia clinica
65. Triada de charcot
66. Trada de beck
67. Cardiopatía congenita no cianozante
- a. CIA
 - b. Ventriculo unico
68. Paciente con asma parcialmente controlada y ataques en el ejercicio.
69. Marcar la incorrecta sobre hitos del desarrollo
70. En un paciente con abdomen agudo obstructivo con sospecha de CA de colon, en que porcion es mas frecuente: Descendente
71. Cuando esta contraindicada la colecistectomia por videolaparoscopia
72. Todos son complicacion de Chron excepto: Polipos
73. Lo correcto sobre convulsion febril: se presenta desde los 6 m hasta los 6a

74. Caso que esta en otros pregunteros del niño con PTI
75. Fiebre, aftas orales, manos y pies: Enterovirus no polio
76. Que produce el deficit de acido folico: Defectos en el tubo neural
77. Lo correcto sobre el cordon umbilical: Tiene dos arterias y una vena
78. Causa de neumotorax espontaneo: Bullas supleurales
79. Cancer de tiroides mas frecuente: Papilar
80. Correcto sobre sincope: Recuperacion espontanea
81. Correcto sobre addison: disminuye el cortisol plasmatico
82. Factor importante en ulcera peptica: pylori y aines
83. Patologia maligna de higado mas frecuente: metastasis
84. Mujer posmenopausica con dolor cervical que empeora con el movimiento y cede en reposo, rigidez de interfalangicas distales que a la mañana dura menos de una hora:
Artrosis primaria
85. Embarazada primer control con glucemia en ayunas menos de 100 mg/dl, sin factores de riesgo, que hacer
- a. PTOG a las 24-28 semanas
 - b. PTOG semana 33-...
 - c. Repetir glucemia basal a los 7 dias para descartar o confirmar diabetes gestacional.
86. Niño con mucosas semihumedas, sediento, examen fisico normal
- a. Deshidratacion leve
 - b. Deshidratacion moderada
 - c. Deshidratacion severa
87. Cancer de estomago, ubicacion mas frecuente: Antro
88. Cuando esta conraindicada la colecistectomia por video:
- a. coledociano
 - b. colecistitis
 - c. sospecha de cancer de vesicula
89. Bebe con ictericia, acolia: Atresia de vias biliares
90. Niño con diarrea sanguinolenta y oliguria: SUH
91. Complicacion mas frecuente en todas las tiroidectomias:
- a. Hipotiroidismo
 - b. Hipoparatiroidismo
92. Que se observa en el hiperaldosteronismo: Hipopotasemia por perdida urinaria