Chunk 44

CATEGORIA: Uso automático; Autorregulação; Desbloqueios frequentes

SITUAÇÃO: O usuário apresenta uma quantidade elevada de desbloqueios do smartphone ao longo do dia, distribuídos em sessões curtas, sem que o tempo total de uso seja necessariamente elevado.

ESTRATÉGIA: Propor um exercício de uso intencional: antes de desbloquear o aparelho, o usuário deve identificar qual atividade pretende realizar e, após concluí-la, bloquear novamente o dispositivo. O agente pode sugerir que o usuário registre por alguns dias os desbloqueios que ocorreram sem uma finalidade previamente identificada.

OBJETIVO: Aumentar a consciência sobre o comportamento de checagem e favorecer o uso do smartphone orientado por objetivos, em vez de acessos automáticos.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Keller et al. (2021) avaliaram uma intervenção de 20 dias, com cinco módulos de treinamento, em um ensaio randomizado com 232 participantes inscritos. A intervenção buscava promover uso orientado por objetivos e recursos psicológicos de autorregulação. Os dois grupos reduziram o uso problemático e o tempo de utilização, mas não houve redução no número diário de desbloqueios. A intervenção não foi superior ao controle ativo, que recebeu uma proposta de detox digital.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o diagnóstico mostra muitos desbloqueios curtos ou o usuário relata acessar o dispositivo sem saber exatamente o que pretendia fazer.

RESTRIÇÕES: A quantidade de desbloqueios não demonstra, isoladamente, que o acesso foi automático ou indesejado. O estudo não demonstrou redução dos desbloqueios com a intervenção avaliada.

ALTERNATIVAS: Planejar períodos de pausa sem o dispositivo ou utilizar estratégias de autorregulação orientadas por metas pessoais.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Keller, J., Roitzheim, C., Radtke, T., Schenkel, K., & Schwarzer, R. (2021). A Mobile Intervention for Self-Efficacious and Goal-Directed Smartphone Use in the General Population: Randomized Controlled Trial. JMIR mHealth and uHealth, 9(11), e26397. DOI: https://doi.org/10.2196/26397. Resumo e seção de resultados.

PubMed+1

Chunk 45

CATEGORIA: Uso automático; Controle de estímulos; Atrito ambiental

SITUAÇÃO: O usuário acessa repetidamente aplicativos de entretenimento ou redes sociais e relata que costuma permanecer neles mesmo quando pretendia realizar outra atividade.

ESTRATÉGIA: Introduzir atrito no acesso aos aplicativos, por exemplo, ativando a escala de cinza na tela do smartphone. A mudança reduz a presença de estímulos coloridos que

podem tornar a interface visualmente atraente, sem exigir que o usuário bloqueie completamente o aplicativo.

OBJETIVO: Diminuir a atratividade imediata do dispositivo e reduzir o tempo de utilização por meio de uma alteração no ambiente digital.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Zimmermann e Sobolev (2023) realizaram um experimento de campo pré-registrado com 112 participantes. A ativação da escala de cinza produziu redução imediata e significativa do tempo de tela medido objetivamente, em comparação ao grupo de automonitoramento. O efeito foi mais imediato do que o observado na intervenção de definição de metas. A redução do uso não produziu efeito causal imediato sobre bem-estar subjetivo ou desempenho acadêmico.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário relata dificuldade em interromper o uso de aplicativos visualmente estimulantes ou apresenta sessões prolongadas de uso recreativo.

RESTRIÇÕES: O estudo avaliou tempo de tela, não demonstrando que a escala de cinza resolva a causa do comportamento ou melhore necessariamente o bem-estar. A alteração pode também afetar a experiência de uso de aplicativos necessários.

ALTERNATIVAS: Definição de metas pessoais de tempo de uso e automonitoramento do tempo de tela.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Zimmermann, L., & Sobolev, M. (2023). Digital Strategies for Screen Time Reduction: A Randomized Field Experiment. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 26(1), 42–49. DOI: https://doi.org/10.1089/cyber.2022.0027. Resumo e resultados.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov+1

Chunk 46

CATEGORIA: Uso automático; Autorregulação; Consciência comportamental

SITUAÇÃO: O usuário relata que abre aplicativos de redes sociais sem uma intenção clara e percebe dificuldade em reconhecer quando deve encerrar a utilização.

ESTRATÉGIA: Utilizar uma intervenção de conscientização do uso do smartphone, ajudando o usuário a reconhecer os processos envolvidos no acesso ao dispositivo e a relacionar sua utilização com objetivos e valores pessoais. O agente pode propor que o usuário identifique, antes de iniciar uma sessão, o motivo do acesso e o que pretende realizar.

OBJETIVO: Favorecer decisões de uso mais conscientes e alinhadas às intenções do usuário.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Keller et al. (2021) avaliaram o aplicativo Not Less But Better, composto por cinco módulos de treinamento ao longo de 20 dias. Foram inscritos 232 participantes, mas 110 forneceram dados após a intervenção. Ambos os grupos reduziram o uso problemático e o tempo de utilização. As análises de mediação apontaram a

autoeficácia como um possível mecanismo relacionado à redução do uso problemático. A intervenção não foi superior ao grupo de controle ativo.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário relata discrepância entre o uso que pretende realizar e o comportamento observado.

RESTRIÇÕES: A intervenção não demonstrou superioridade em relação ao controle ativo. O agente não deve presumir que o usuário acessa aplicativos por impulso apenas com base na frequência de abertura.

ALTERNATIVAS: Planejamento de uso orientado por metas e períodos definidos de pausa do smartphone.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Keller et al. (2021). A Mobile Intervention for Self-Efficacious and Goal-Directed Smartphone Use in the General Population: Randomized Controlled Trial. JMIR mHealth and uHealth, 9(11), e26397. DOI: https://doi.org/10.2196/26397. Métodos, resultados e discussão.

PubMed+1

Distrações e interrupções

Chunk 47

CATEGORIA: Distrações; Notificações; Controle de estímulos

SITUAÇÃO: O usuário relata que interrompe atividades para verificar notificações de aplicativos que não exigem resposta imediata.

ESTRATÉGIA: Desativar notificações não essenciais, mantendo habilitados apenas os alertas considerados importantes pelo usuário. A seleção deve ser feita por aplicativo ou categoria de notificação, reduzindo a quantidade de estímulos que podem interromper atividades.

OBJETIVO: Diminuir interrupções provocadas por alertas e reduzir a exposição a estímulos que incentivam a checagem do smartphone.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Olson et al. (2022) avaliaram uma intervenção composta por dez estratégias de redução do uso problemático do smartphone, incluindo a desativação de notificações não essenciais. O estudo 1 utilizou um desenho pré e pós-intervenção com 51 participantes; o estudo 2 comparou a intervenção com um grupo de controle que realizou automonitoramento, com 70 participantes na amostra final. A intervenção combinada reduziu o uso problemático e o tempo de tela. Como as estratégias foram escolhidas e aplicadas em conjunto, não é possível atribuir o efeito exclusivamente à desativação das notificações.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário identifica notificações como motivo frequente de interrupção ou quando deseja reduzir alertas que não exigem atenção imediata.

RESTRIÇÕES: A evidência é referente a uma intervenção multicomponente. A desativação indiscriminada pode fazer o usuário perder comunicações importantes.

ALTERNATIVAS: Ativar modos de concentração ou períodos sem notificações durante atividades específicas.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Olson, J. A., Sandra, D. A., Chmoulevitch, D., Raz, A., & Veissière, S. P. L. (2022). A Nudge-Based Intervention to Reduce Problematic Smartphone Use: Randomised Controlled Trial. International Journal of Mental Health and Addiction. DOI: https://doi.org/10.1007/s11469-022-00826-w. Resumo e seção de métodos.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov+2

Chunk 48

CATEGORIA: Distrações; Concentração; Planejamento de uso

SITUAÇÃO: O usuário apresenta sessões de utilização de redes sociais durante horários que havia reservado para estudo, trabalho ou outras atividades prioritárias.

ESTRATÉGIA: Planejar períodos específicos para utilizar redes sociais e estabelecer pausas de uso do smartphone durante as atividades prioritárias. O planejamento deve partir da rotina e das metas definidas pelo próprio usuário, delimitando quando o acesso recreativo será permitido.

OBJETIVO: Reduzir conflitos entre o uso recreativo do smartphone e atividades que exigem atenção ou possuem prioridade pessoal.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Keller et al. (2021) compararam uma intervenção orientada à autorregulação com uma condição de controle ativo que incluía períodos diários de pausa do smartphone de pelo menos uma hora. Ambos os grupos apresentaram reduções no uso problemático e no tempo de utilização. Como não houve superioridade da intervenção principal sobre o controle, os resultados não permitem atribuir a melhora exclusivamente aos períodos de pausa.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando os horários de uso registrados coincidem com períodos que o usuário identifica como destinados a atividades prioritárias.

RESTRIÇÕES: O histórico de uso, isoladamente, não comprova que o usuário estava estudando ou trabalhando naquele horário. É necessário considerar a agenda ou o autorrelato.

ALTERNATIVAS: Desativar notificações não essenciais durante as atividades prioritárias ou estabelecer limites de tempo para aplicativos específicos.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Keller et al. (2021). A Mobile Intervention for Self-Efficacious and Goal-Directed Smartphone Use in the General Population: Randomized Controlled Trial. JMIR mHealth and uHealth, 9(11), e26397. DOI: https://doi.org/10.2196/26397. Métodos e resultados.

PubMed+1

Chunk 49

CATEGORIA: Distrações; Interrupções; Autorregulação

SITUAÇÃO: O usuário relata que verifica repetidamente o smartphone durante uma tarefa, mesmo quando não recebeu notificações ou não existe uma necessidade identificada de consultar o dispositivo.

ESTRATÉGIA: Estabelecer períodos de atividade sem smartphone, definindo previamente a duração e o momento em que o dispositivo poderá ser consultado novamente. A pausa deve ser planejada pelo próprio usuário e associada a uma atividade específica.

OBJETIVO: Reduzir a alternância entre a tarefa principal e o uso do smartphone, favorecendo períodos contínuos de atenção.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: No ensaio de Keller et al. (2021), a condição de controle ativo incluiu períodos diários de pausa do smartphone de pelo menos uma hora. O grupo apresentou redução no uso problemático e no tempo de utilização, assim como o grupo que recebeu a intervenção de uso orientado por objetivos. O estudo não isolou o efeito dos períodos de pausa como componente independente.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário relata checagens frequentes durante tarefas ou demonstra interesse em experimentar períodos delimitados sem o dispositivo.

RESTRIÇÕES: A duração de uma hora foi utilizada como parte de uma intervenção experimental e não deve ser tratada como intervalo obrigatório ou adequado para todos. O agente deve considerar as necessidades de comunicação do usuário.

ALTERNATIVAS: Desativação de notificações não essenciais e planejamento de horários específicos para consultar o dispositivo.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Keller et al. (2021). A Mobile Intervention for Self-Efficacious and Goal-Directed Smartphone Use in the General Population: Randomized Controlled Trial. JMIR mHealth and uHealth, 9(11), e26397. DOI: https://doi.org/10.2196/26397. Métodos e resultados.

PubMed+1

Uso excessivo de aplicativos e redes sociais

Chunk 50

CATEGORIA: Uso excessivo de aplicativos; Limites pessoais; Feedback em tempo real

SITUAÇÃO: O usuário permanece em um aplicativo de rede social por mais tempo do que havia planejado e ultrapassa frequentemente o limite de duração que estabeleceu para uma sessão.

ESTRATÉGIA: Definir um limite pessoal de duração para cada sessão ou aplicativo e apresentar um aviso em tela cheia quando esse limite for ultrapassado. O aviso pode oferecer ao usuário a opção de encerrar a sessão ou continuar conscientemente.

OBJETIVO: Interromper a continuidade automática de sessões prolongadas e permitir que o usuário reavalie sua intenção antes de continuar utilizando o aplicativo.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Um ensaio randomizado de 2026 avaliou o aplicativo Wellspent durante três semanas com 70 usuários de iPhone, com idade média de 26,2 anos. O grupo de intervenção recebeu lembretes personalizados em tela cheia quando ultrapassava limites definidos pelo próprio usuário. Houve redução aproximada de 29 minutos por dia no tempo gasto no aplicativo mais problemático, além de redução na percepção de uso problemático do smartphone. Não houve redução significativa na escala de uso problemático de redes sociais nem aumento significativo da autoeficácia.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário identifica aplicativos específicos nos quais costuma ultrapassar o tempo pretendido.

RESTRIÇÕES: O estudo foi curto e utilizou uma amostra pequena. Os resultados não demonstraram melhora significativa em todos os indicadores avaliados. A intervenção foi testada em iPhone.

ALTERNATIVAS: Definir limites diários de utilização por aplicativo ou utilizar automonitoramento do tempo de tela.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Promoting Self-Regulated Social Media Use on Smartphones With a Mobile Intervention App (Wellspent): Randomized Controlled Trial (2026). JMIR mHealth and uHealth, 14, e56824. DOI: https://doi.org/10.2196/56824. Métodos, resultados e conclusão.

pmc.ncbi.nlm.nih.gov+1

Chunk 51

CATEGORIA: Uso excessivo de redes sociais; Limites de utilização; Restrição de acesso

SITUAÇÃO: O usuário apresenta tempo elevado de utilização em redes sociais específicas e deseja reduzir o acesso a essas plataformas, mas não pretende abandonar completamente seu uso.

ESTRATÉGIA: Estabelecer um limite diário de utilização para os aplicativos selecionados. O limite deve permitir algum acesso às plataformas, mas restringir a continuidade após o tempo definido. O usuário pode escolher quais aplicativos serão incluídos na restrição.

OBJETIVO: Reduzir o tempo dedicado às redes sociais selecionadas sem exigir a interrupção completa de seu uso.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Collis e Eggers (2022) conduziram um ensaio randomizado com estudantes universitários, acompanhados ao longo de três períodos acadêmicos. O grupo de intervenção recebeu limite de 10 minutos por dia para Facebook, Instagram e Snapchat. A

restrição reduziu o uso dessas redes durante o período de intervenção, mas os participantes substituíram parte do tempo por aplicativos de mensagens instantâneas. Não houve redução do tempo total gasto em dispositivos digitais nem melhora significativa em bem-estar ou desempenho acadêmico. Após a retirada da restrição, o uso das redes sociais voltou a níveis semelhantes aos do grupo de controle.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário identifica redes sociais específicas como responsáveis por grande parte do tempo de uso e deseja reduzir sua utilização.

RESTRIÇÕES: O limite de 10 minutos foi uma condição experimental, não uma recomendação universal. A restrição pode provocar substituição por outros aplicativos e seus efeitos podem não persistir após a retirada.

ALTERNATIVAS: Limites personalizados por aplicativo e avisos apresentados quando o tempo de uso pretendido é ultrapassado.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Collis, A., & Eggers, F. (2022). Effects of restricting social media usage on wellbeing and performance: A randomized control trial among students. PLOS ONE, 17(8), e0272416. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272416. Métodos, resultados e discussão.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov+1

Chunk 52

CATEGORIA: Uso excessivo de aplicativos; Automonitoramento; Feedback comportamental

SITUAÇÃO: O usuário relata que perde a noção do tempo enquanto utiliza um aplicativo e só percebe que ultrapassou seu limite depois de encerrar a sessão.

ESTRATÉGIA: Apresentar feedback sobre o tempo de uso durante ou imediatamente após a sessão, permitindo que o usuário compare a duração observada com a meta que estabeleceu. O feedback pode ser apresentado por meio de indicadores visuais ou mensagens com o tempo acumulado.

OBJETIVO: Tornar a duração do uso mais perceptível e apoiar decisões de encerramento ou continuidade da sessão.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: A intervenção Wellspent, avaliada em um ensaio randomizado de três semanas com 70 participantes, utilizou lembretes personalizados e limites definidos pelos usuários. O grupo de intervenção reduziu o tempo diário no aplicativo mais problemático em aproximadamente 29 minutos. A intervenção também incluía recursos de monitoramento e feedback, portanto não é possível atribuir o resultado exclusivamente ao feedback em tempo real.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário relata dificuldade em perceber quanto tempo passou utilizando um aplicativo ou quando os registros mostram sessões prolongadas.

RESTRIÇÕES: O estudo avaliou uma intervenção multicomponente. O feedback não garante que o usuário encerre a sessão e pode perder utilidade se for excessivamente frequente.

ALTERNATIVAS: Avisos em tela cheia após ultrapassar um limite pessoal e definição de metas diárias por aplicativo.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Promoting Self-Regulated Social Media Use on Smartphones With a Mobile Intervention App (Wellspent): Randomized Controlled Trial (2026). JMIR mHealth and uHealth, 14, e56824. DOI: https://doi.org/10.2196/56824. Métodos e resultados.

pmc.ncbi.nlm.nih.gov+1

Chunk 53

CATEGORIA: Uso excessivo de aplicativos; Controle de estímulos; Fricção digital

SITUAÇÃO: O usuário apresenta tempo elevado de utilização do smartphone e relata dificuldade em reduzir o acesso a aplicativos mesmo quando reconhece que deseja utilizar menos o dispositivo.

ESTRATÉGIA: Introduzir alterações no ambiente digital que aumentem o esforço necessário para utilizar o smartphone ou reduzam a atratividade dos estímulos. Uma possibilidade avaliada experimentalmente é ativar a escala de cinza na tela do dispositivo.

OBJETIVO: Reduzir o uso por meio de mudanças no ambiente, sem depender exclusivamente de decisões conscientes tomadas durante cada sessão.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Zimmermann e Sobolev (2023) compararam escala de cinza, definição de metas e automonitoramento em um experimento de campo com 112 participantes. A escala de cinza levou a uma redução imediata e significativa do tempo de tela em comparação ao controle. A definição de metas apresentou redução menor e mais gradual.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário deseja uma intervenção ambiental simples e aceita alterar a aparência do dispositivo para reduzir o uso.

RESTRIÇÕES: A pesquisa avaliou escala de cinza como uma estratégia específica de fricção digital. Não demonstra que qualquer alteração ambiental produzirá o mesmo resultado nem que a redução de tempo de tela implica melhora de bem-estar.

ALTERNATIVAS: Definição de metas pessoais de utilização e automonitoramento do tempo de tela.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Zimmermann, L., & Sobolev, M. (2023). Digital Strategies for Screen Time Reduction: A Randomized Field Experiment. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 26(1), 42–49. DOI: https://doi.org/10.1089/cyber.2022.0027. Resumo e resultados.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov+1

Chunk 54

CATEGORIA: Uso excessivo de aplicativos; Metas pessoais; Autonomia

SITUAÇÃO: O usuário estabelece limites de tempo para o smartphone, mas demonstra dificuldade em manter metas que foram definidas sem considerar suas preferências ou sua rotina.

ESTRATÉGIA: Construir a meta de redução em conjunto com o usuário, permitindo que ele escolha o nível de redução que considera viável. O agente pode apresentar opções de metas e ajudar a comparar a meta escolhida com o histórico de utilização.

OBJETIVO: Aumentar a participação do usuário na definição do objetivo e estabelecer uma meta compatível com suas condições e preferências.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Zimmermann e Sobolev (2023) avaliaram uma intervenção de definição de metas por autocompromisso com limites de tempo. Em um experimento de campo com 112 participantes, a redução do tempo de tela foi menor e mais gradual do que na condição de escala de cinza, mas superior ao padrão de automonitoramento em alguns períodos. O estudo não estabelece que metas autodefinidas sejam sempre superiores a metas atribuídas.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário demonstra interesse em reduzir o uso, mas não consegue manter limites rígidos ou pouco compatíveis com sua rotina.

RESTRIÇÕES: O estudo avaliou metas de autocompromisso e não isolou todos os aspectos da autonomia na escolha de metas. A redução de tempo de tela não produziu efeito causal imediato sobre bem-estar subjetivo ou desempenho acadêmico.

ALTERNATIVAS: Alterações ambientais, como escala de cinza, ou automonitoramento sem estabelecimento inicial de metas.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Zimmermann, L., & Sobolev, M. (2023). Digital Strategies for Screen Time Reduction: A Randomized Field Experiment. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 26(1), 42–49. DOI: https://doi.org/10.1089/cyber.2022.0027. Resumo e resultados.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov+1

Uso noturno e sono

Chunk 55

CATEGORIA: Uso noturno; Sono; Planejamento de rotina

SITUAÇÃO: O usuário apresenta utilização recorrente do smartphone nos minutos que antecedem o horário habitual de dormir e relata dificuldade em encerrar o uso para iniciar sua rotina de sono.

ESTRATÉGIA: Planejar um período diário sem smartphone antes do horário de dormir. O usuário deve escolher um horário de encerramento do uso e estabelecer uma atividade alternativa para esse intervalo, como leitura ou outra atividade de relaxamento.

OBJETIVO: Reduzir a utilização do dispositivo no período anterior ao sono e criar uma transição planejada entre as atividades digitais e o momento de dormir.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Keller et al. (2021) utilizaram uma condição de controle ativo com períodos diários de pausa do smartphone de pelo menos uma hora. O grupo apresentou redução no tempo de uso e no uso problemático, mas o estudo não avaliou especificamente o uso noturno como intervenção isolada. Portanto, a aplicação ao período anterior ao sono é indireta.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o histórico de utilização mostra sessões frequentes próximas ao horário de dormir e o usuário relata que esse comportamento interfere na rotina desejada.

RESTRIÇÕES: O estudo citado não comprova que uma pausa de uma hora antes de dormir melhora o sono. O agente deve evitar apresentar esse intervalo como regra universal.

ALTERNATIVAS: Utilizar uma atividade de relaxamento antes de dormir ou definir limites de uso para aplicativos específicos.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Keller et al. (2021). A Mobile Intervention for Self-Efficacious and Goal-Directed Smartphone Use in the General Population: Randomized Controlled Trial. JMIR mHealth and uHealth, 9(11), e26397. DOI: https://doi.org/10.2196/26397. Métodos e resultados.

PubMed+1

Chunk 56

CATEGORIA: Uso noturno; Controle de estímulos; Notificações

SITUAÇÃO: O usuário relata que continua verificando o smartphone à noite após receber notificações de aplicativos que não exigem atenção imediata.

ESTRATÉGIA: Desativar notificações não essenciais durante o período noturno, mantendo habilitados os alertas considerados importantes pelo usuário. A configuração pode ser associada a um horário definido para iniciar a rotina de descanso.

OBJETIVO: Reduzir estímulos externos que incentivam a checagem do smartphone durante o período reservado ao descanso.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Olson et al. (2022) incluíram a desativação de notificações não essenciais em uma intervenção multicomponente para reduzir o uso problemático do smartphone. Os estudos apresentaram redução do tempo de tela e do uso problemático, mas não isolaram o efeito da desativação de notificações nem demonstraram especificamente seu efeito no uso noturno.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário relata que notificações noturnas desencadeiam acessos ao dispositivo ou interrompem sua rotina de descanso.

RESTRIÇÕES: A evidência é indireta para o sono e não permite atribuir resultados à desativação de notificações isoladamente. É necessário preservar alertas relevantes para o usuário.

ALTERNATIVAS: Estabelecer um período sem smartphone antes de dormir ou utilizar configurações de concentração programadas.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Olson, J. A., Sandra, D. A., Chmoulevitch, D., Raz, A., & Veissière, S. P. L. (2022). A Nudge-Based Intervention to Reduce Problematic Smartphone Use: Randomised Controlled Trial. International Journal of Mental Health and Addiction. DOI: https://doi.org/10.1007/s11469-022-00826-w. Resumo e métodos.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov+1

Construção e manutenção de hábitos

Chunk 57

CATEGORIA: Construção de hábitos; Consistência; Pistas contextuais

SITUAÇÃO: O usuário estabelece a intenção de realizar uma atividade alternativa ao uso do smartphone, mas não consegue incorporá-la regularmente à rotina.

ESTRATÉGIA: Associar a atividade desejada a uma pista recorrente do cotidiano, como um horário ou uma atividade que já faz parte da rotina. Repetir o comportamento após a ocorrência dessa pista, mantendo o contexto o mais estável possível.

OBJETIVO: Favorecer a associação entre um contexto recorrente e o comportamento desejado, facilitando sua repetição.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Zhu et al. (2024) realizaram uma revisão sistemática de 41 estudos de intervenções digitais para formação de hábitos, principalmente relacionados à atividade física. A revisão identificou intenções, pistas e reforço positivo como componentes recorrentes das estratégias de formação de hábitos. A aplicação específica à substituição de uso de smartphone é indireta.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário relata que esquece de realizar uma atividade planejada ou não consegue estabelecer regularidade em uma alternativa ao uso digital.

RESTRIÇÕES: A revisão não avaliou diretamente a substituição de redes sociais por atividades alternativas. A repetição em contexto estável é um fundamento de formação de hábitos, mas não garante que a atividade se torne automática em prazo determinado.

ALTERNATIVAS: Utilizar lembretes temporais, metas autodefinidas e automonitoramento do comportamento.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Zhu, Y., Long, Y., Wang, H., Lee, K. P., Zhang, L., & Wang, S. J. (2024). Digital Behavior Change Intervention Designs for Habit Formation: Systematic Review. Journal of Medical Internet Research, 26, e54375. DOI: https://doi.org/10.2196/54375. Resumo e resultados.

jmir.org+1

Chunk 58

CATEGORIA: Construção de hábitos; Metas; Planejamento comportamental

SITUAÇÃO: O usuário define que deseja reduzir o tempo de uso do smartphone, mas não estabelece um comportamento alternativo ou um plano concreto para os períodos em que normalmente utiliza o dispositivo.

ESTRATÉGIA: Transformar a meta de redução em um plano comportamental específico, definindo qual atividade será realizada no período liberado, quando ela ocorrerá e em qual contexto. A meta deve ser construída com o usuário e relacionada a uma atividade que ele considera relevante.

OBJETIVO: Evitar que a redução do tempo de tela seja apenas uma restrição sem direcionamento e facilitar a adoção de comportamentos alternativos.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: A revisão de Zhu et al. (2024), com 41 estudos sobre intervenções digitais para formação de hábitos, identificou definição de metas, automonitoramento e pistas como técnicas frequentemente utilizadas. Entretanto, os estudos revisados tinham como foco principal a atividade física, e não a substituição de uso de smartphone. A aplicação é indireta.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário manifesta intenção de reduzir o uso, mas não sabe como ocupar o tempo ou quais atividades deseja priorizar.

RESTRIÇÕES: A revisão não comprova que planejar uma atividade alternativa, isoladamente, reduz o uso de redes sociais. A atividade deve ser escolhida pelo usuário e compatível com sua rotina.

ALTERNATIVAS: Associar a atividade a uma pista recorrente ou utilizar metas progressivas de realização.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Zhu et al. (2024). Digital Behavior Change Intervention Designs for Habit Formation: Systematic Review. Journal of Medical Internet Research, 26, e54375. DOI: https://doi.org/10.2196/54375. Resumo, introdução e resultados.

jmir.org+1

Chunk 59

CATEGORIA: Construção de hábitos; Automonitoramento; Feedback

SITUAÇÃO: O usuário estabelece uma meta de redução do tempo de smartphone, mas não acompanha regularmente se está cumprindo o objetivo ao longo dos dias.

ESTRATÉGIA: Registrar o tempo de utilização diariamente e apresentar comparações entre o comportamento observado e a meta definida. O acompanhamento pode ser realizado por meio de gráficos ou resumos periódicos que mostrem a evolução do usuário.

OBJETIVO: Tornar o progresso visível, permitir a identificação de padrões e apoiar ajustes nas metas e estratégias utilizadas.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Zhu et al. (2024) identificaram o automonitoramento do comportamento em 25 dos 41 estudos analisados e feedback sobre o comportamento em 23 estudos. A revisão é centrada em intervenções digitais para atividade física. Zimmermann e Sobolev (2023), em experimento com 112 participantes, utilizaram automonitoramento como condição de controle para comparar estratégias de redução do tempo de tela. A redução observada no grupo de controle foi menor do que na condição de escala de cinza.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário não acompanha seu progresso ou não consegue identificar em quais dias e horários costuma ultrapassar suas metas.

RESTRIÇÕES: Automonitoramento não garante mudança comportamental por si só. Os registros devem ser apresentados de forma compreensível e sem transformar pequenas variações diárias em motivo de cobrança.

ALTERNATIVAS: Feedback em tempo real, metas autodefinidas e lembretes associados a horários específicos.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Zhu et al. (2024). DOI: https://doi.org/10.2196/54375. Resumo e resultados. Zimmermann & Sobolev (2023). DOI: https://doi.org/10.1089/cyber.2022.0027. Resumo.

jmir.org+1

Chunk 60

CATEGORIA: Construção de hábitos; Lembretes; Pistas temporais

SITUAÇÃO: O usuário define uma atividade que deseja realizar em substituição ao uso do smartphone, mas frequentemente esquece de iniciá-la no momento planejado.

ESTRATÉGIA: Configurar lembretes em horários escolhidos pelo usuário para sinalizar o início da atividade planejada. Sempre que possível, associar o lembrete a uma rotina já existente, de modo que o horário ou evento funcione como pista para a ação.

OBJETIVO: Aumentar a probabilidade de execução da atividade planejada por meio de pistas externas recorrentes.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Zhu et al. (2024) identificaram prompts e pistas entre as técnicas mais utilizadas nos estudos digitais de formação de hábitos. A revisão incluiu 41 estudos voltados principalmente à atividade física. Ela demonstra a frequência de utilização dessa

técnica nas intervenções, mas não comprova que lembretes isolados sejam eficazes para reduzir o uso de smartphones.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário já escolheu uma atividade alternativa e relata esquecer de realizá-la.

RESTRIÇÕES: O envio de lembretes em excesso pode gerar incômodo ou ser ignorado. A revisão não estabelece uma frequência universal de notificações.

ALTERNATIVAS: Associar a atividade a uma pista contextual recorrente ou utilizar metas e acompanhamento de progresso.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Zhu et al. (2024). Digital Behavior Change Intervention Designs for Habit Formation: Systematic Review. Journal of Medical Internet Research, 26, e54375. DOI: https://doi.org/10.2196/54375. Resumo e resultados.

jmir.org+1

Chunk 61

CATEGORIA: Construção de hábitos; Reforço positivo; Reconhecimento de progresso

SITUAÇÃO: O usuário consegue cumprir uma meta de redução do uso do smartphone em alguns dias, mas relata dificuldade em manter a motivação para continuar.

ESTRATÉGIA: Oferecer feedback positivo após a realização de uma meta definida pelo próprio usuário, reconhecendo o comportamento realizado e o progresso acumulado. O reforço pode ser uma mensagem de reconhecimento, um indicador visual de progresso ou uma recompensa virtual.

OBJETIVO: Reconhecer a realização do comportamento desejado e incentivar sua repetição.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Zhu et al. (2024) identificaram reforço positivo como um dos componentes utilizados em intervenções digitais de formação de hábitos. A revisão incluiu 41 estudos, principalmente de atividade física, e identificou recompensas virtuais e feedback como métodos recorrentes. A presença dessas técnicas nos estudos não demonstra, por si só, que recompensas virtuais sejam eficazes para reduzir o uso de smartphones.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário demonstra que o reconhecimento de pequenas conquistas contribui para sua motivação ou quando deseja acompanhar marcos de progresso.

RESTRIÇÕES: A evidência é indireta para bem-estar digital. Recompensas não devem incentivar metas excessivamente rígidas ou transformar o acompanhamento em competição indesejada.

ALTERNATIVAS: Feedback descritivo do progresso e metas progressivas definidas em conjunto com o usuário.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Zhu et al. (2024). Digital Behavior Change Intervention Designs for Habit Formation: Systematic Review. Journal of Medical Internet Research, 26, e54375. DOI: https://doi.org/10.2196/54375. Resumo e resultados.

jmir.org+1

Chunk 62

CATEGORIA: Construção de hábitos; Manutenção de metas; Progressão gradual

SITUAÇÃO: O usuário estabelece uma meta de redução do tempo de tela, mas não consegue cumpri-la repetidamente e demonstra frustração com a diferença entre o objetivo e o comportamento observado.

ESTRATÉGIA: Reavaliar a meta com base no histórico de utilização e estabelecer uma redução progressiva, em vez de insistir em um limite que o usuário não consegue cumprir. O agente pode ajudar a definir uma meta menor e revisar o objetivo após observar os resultados.

OBJETIVO: Tornar a mudança comportamental mais viável e favorecer a continuidade do esforço ao longo do tempo.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Zimmermann e Sobolev (2023) compararam a definição de metas com escala de cinza e automonitoramento em 112 participantes. A estratégia de metas produziu uma redução menor e mais gradual do tempo de tela do que a escala de cinza. O estudo não testou especificamente um algoritmo de progressão gradual de metas; portanto, a adaptação dinâmica da meta é uma aplicação conceitual, não um efeito diretamente demonstrado.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário ultrapassa repetidamente uma meta e relata que o limite atual é difícil de manter.

RESTRIÇÕES: Não há percentual universal de redução adequado a todos. O agente não deve interpretar o não cumprimento de uma meta como falta de esforço ou como evidência de dependência.

ALTERNATIVAS: Automonitoramento sem meta inicial e introdução de alterações ambientais, como escala de cinza.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Zimmermann, L., & Sobolev, M. (2023). Digital Strategies for Screen Time Reduction: A Randomized Field Experiment. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 26(1), 42–49. DOI: https://doi.org/10.1089/cyber.2022.0027. Resumo e resultados.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov+1

Chunk 63

CATEGORIA: Construção de hábitos; Prevenção de recaídas; Planejamento adaptativo

SITUAÇÃO: O usuário consegue manter uma redução no uso do smartphone durante um período, mas retorna ao padrão anterior quando deixa de utilizar limites ou mecanismos de controle.

ESTRATÉGIA: Planejar como manter o comportamento desejado após a retirada de uma intervenção temporária. O usuário pode identificar quais estratégias pretende continuar utilizando, quais situações costumam levar ao retorno do padrão anterior e como reagirá quando perceber aumento no uso.

OBJETIVO: Favorecer a manutenção da mudança comportamental após o encerramento de uma restrição temporária.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Collis e Eggers (2022) observaram que a redução do uso de redes sociais obtida durante o período de restrição não persistiu após a retirada do limite diário. O uso retornou a níveis semelhantes aos do grupo de controle. Esse resultado demonstra a limitação de depender exclusivamente de uma restrição temporária, mas não testa diretamente um plano de prevenção de recaídas.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário apresenta melhora durante o uso de limites ou bloqueios, mas retorna ao padrão anterior quando a intervenção deixa de estar ativa.

RESTRIÇÕES: O planejamento de manutenção é uma proposta comportamental baseada na limitação observada no estudo; sua eficácia específica não foi testada nesse ensaio.

ALTERNATIVAS: Manter metas pessoais de utilização, automonitoramento e feedback periódico sobre o comportamento.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Collis, A., & Eggers, F. (2022). Effects of restricting social media usage on wellbeing and performance: A randomized control trial among students. PLOS ONE, 17(8), e0272416. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272416. Resultados pós-intervenção e discussão.

pmc.ncbi.nlm.nih.gov+1

Procrastinação e busca de distração

Chunk 64

CATEGORIA: Procrastinação; Substituição de comportamento; Autorregulação

SITUAÇÃO: O usuário relata que abre redes sociais durante períodos destinados a tarefas importantes e que costuma utilizar o smartphone para adiar o início ou a continuidade dessas atividades.

ESTRATÉGIA: Planejar previamente uma resposta alternativa para os momentos em que surgir a intenção de abrir redes sociais durante a tarefa. O usuário pode definir uma ação curta e concreta para retomar a atividade principal antes de decidir se deseja utilizar o smartphone.

OBJETIVO: Reduzir a substituição de tarefas prioritárias por atividades digitais não planejadas e facilitar o retorno à atividade original.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Keller et al. (2021) avaliaram uma intervenção voltada ao uso do smartphone alinhado a metas e valores pessoais, com treinamento de autorregulação durante 20 dias. Os resultados indicaram redução do uso problemático e do tempo de utilização em ambos os grupos, mas não demonstraram superioridade da intervenção em relação ao controle ativo. O estudo não avaliou especificamente procrastinação acadêmica ou profissional.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário relata que utiliza redes sociais para adiar tarefas ou quando identifica esse padrão em autorrelatos associados ao histórico de uso.

RESTRIÇÕES: O histórico de abertura de aplicativos durante horários de estudo não comprova procrastinação. É necessário que o usuário confirme que estava realizando ou pretendia realizar uma tarefa naquele período.

ALTERNATIVAS: Planejar períodos sem smartphone durante tarefas e definir horários específicos para uso recreativo.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Keller et al. (2021). A Mobile Intervention for Self-Efficacious and Goal-Directed Smartphone Use in the General Population: Randomized Controlled Trial. JMIR mHealth and uHealth, 9(11), e26397. DOI: https://doi.org/10.2196/26397. Métodos e discussão.

PubMed+1

Chunk 65

CATEGORIA: Procrastinação; Controle de estímulos; Barreiras ambientais

SITUAÇÃO: O usuário relata que mantém o smartphone próximo durante tarefas importantes e acaba acessando aplicativos recreativos sempre que o dispositivo está ao alcance.

ESTRATÉGIA: Modificar o ambiente físico durante a realização da tarefa, deixando o smartphone fora do campo de visão ou em outro local, desde que isso seja compatível com as necessidades de comunicação e segurança do usuário.

OBJETIVO: Reduzir a exposição a pistas ambientais que podem desencadear o acesso não planejado ao dispositivo.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: A literatura de mudança comportamental e os modelos de intervenção adaptativa reconhecem a importância de modificar o contexto e as oportunidades de comportamento. Entretanto, as fontes consultadas nesta pesquisa não fornecem um ensaio específico que demonstre o efeito de colocar o smartphone fora do campo de visão sobre a procrastinação digital. A aplicação é indireta.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o próprio usuário identifica a presença física do dispositivo como estímulo para interromper uma tarefa.

RESTRIÇÕES: Não deve ser recomendada quando o usuário precisa do smartphone para autenticação, comunicação, acessibilidade ou execução da própria tarefa. Não é possível inferir esse gatilho apenas pelo tempo de uso.

ALTERNATIVAS: Desativar notificações não essenciais e estabelecer períodos de atividade sem smartphone.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Michie, S., van Stralen, M. M., & West, R. (2011). The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation Science, 6, 42. DOI: https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-42. Modelo COM-B e componentes de oportunidade. Evidência de aplicação ao uso digital: indireta.

Chunk 66

CATEGORIA: Procrastinação; Intervenção adaptativa; Momento oportuno

SITUAÇÃO: O usuário apresenta um padrão recorrente de acessar aplicativos recreativos em determinados horários ou contextos nos quais havia planejado realizar atividades prioritárias.

ESTRATÉGIA: Utilizar pontos de decisão para avaliar se uma intervenção deve ser apresentada naquele momento. O agente pode considerar o horário, o padrão de uso recente e a disponibilidade informada pelo usuário para selecionar uma mensagem ou sugestão de retorno à atividade planejada.

OBJETIVO: Oferecer suporte próximo ao momento em que o comportamento indesejado ocorre, em vez de enviar lembretes genéricos em horários fixos.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Hsu et al. (2024) revisaram 62 intervenções adaptativas realizadas no momento oportuno, voltadas a diferentes comportamentos de saúde em adultos. A revisão descreve o uso de pontos de decisão, variáveis de personalização, opções de intervenção e regras de decisão. Os ensaios randomizados incluídos apresentaram resultados variáveis conforme o comportamento trabalhado. A revisão não demonstra diretamente a eficácia desse mecanismo para procrastinação digital.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o agente possui histórico suficiente para identificar horários ou contextos recorrentes de uso e quando o usuário confirma a existência de uma tarefa prioritária naquele período.

RESTRIÇÕES: O horário de acesso a um aplicativo não demonstra, isoladamente, que o usuário está procrastinando. O agente precisa considerar autorrelatos e disponibilidade para evitar intervenções inadequadas.

ALTERNATIVAS: Lembretes programados pelo usuário e planejamento de períodos sem smartphone.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Hsu, T.-C. C., Whelan, P., Gandrup, J., Armitage, C. J., Cordingley, L., & McBeth, J. (2025). Personalized interventions for behaviour change: A scoping review of just-in-time adaptive interventions. British Journal of Health Psychology, 30(1), e12766. DOI: https://doi.org/10.1111/bjhp.12766. Resumo e estrutura JITAI.

PMC+1

Metas pessoais e dificuldade em respeitá-las

Chunk 67

CATEGORIA: Metas pessoais; Limites de utilização; Autorregulação

SITUAÇÃO: O usuário define um limite diário para um aplicativo, mas ultrapassa esse limite em vários dias consecutivos.

ESTRATÉGIA: Apresentar um aviso personalizado quando o limite definido pelo usuário for atingido, oferecendo a possibilidade de encerrar o aplicativo ou continuar após uma decisão consciente. O limite deve ser estabelecido pelo próprio usuário.

OBJETIVO: Criar um ponto de reflexão no momento em que o usuário ultrapassa sua meta, facilitando a decisão de encerrar ou continuar a sessão.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: O ensaio randomizado Wellspent (2026), com 70 usuários de iPhone durante três semanas, avaliou lembretes em tela cheia acionados quando o tempo de sessão ultrapassava o limite pessoal. O grupo de intervenção reduziu em aproximadamente 29 minutos por dia o tempo gasto no aplicativo mais problemático. Não houve redução significativa na medida de uso problemático de redes sociais.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário já possui uma meta clara e deseja receber um aviso no momento em que ela é ultrapassada.

RESTRIÇÕES: O estudo foi curto e utilizou uma amostra pequena. O aviso não deve impedir automaticamente usos necessários ou urgentes. O resultado não comprova que o recurso seja eficaz para todos os aplicativos e sistemas operacionais.

ALTERNATIVAS: Limites diários com bloqueio após o tempo definido e feedback sobre o progresso em relação à meta.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Promoting Self-Regulated Social Media Use on Smartphones With a Mobile Intervention App (Wellspent): Randomized Controlled Trial (2026). JMIR mHealth and uHealth, 14, e56824. DOI: https://doi.org/10.2196/56824. Métodos e resultados.

pmc.ncbi.nlm.nih.gov+1

Chunk 68

CATEGORIA: Metas pessoais; Restrição de uso; Substituição comportamental

SITUAÇÃO: O usuário reduz o tempo de utilização de uma rede social específica, mas passa a utilizar outro aplicativo de comunicação ou entretenimento durante o tempo que foi liberado.

ESTRATÉGIA: Acompanhar o uso de aplicativos relacionados e avaliar se a redução em um aplicativo está sendo acompanhada pelo aumento em outro. Se houver substituição, revisar a meta considerando o conjunto de atividades digitais que o usuário deseja modificar, em vez de avaliar apenas um aplicativo isoladamente.

OBJETIVO: Evitar que a redução de uso em uma plataforma seja interpretada como mudança global quando o comportamento apenas migra para outro aplicativo.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Collis e Eggers (2022) observaram que a restrição de Facebook, Instagram e Snapchat a 10 minutos diários levou os participantes a substituir parte do uso por aplicativos de mensagens instantâneas. O tempo total de utilização de dispositivos digitais não diminuiu. O estudo demonstra diretamente que a restrição de aplicativos específicos pode produzir substituição comportamental.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o histórico mostra redução em um aplicativo acompanhada de aumento em outro, especialmente quando ambos atendem a funções semelhantes.

RESTRIÇÕES: A substituição não é necessariamente prejudicial: aplicativos de mensagens podem ter funções sociais ou práticas diferentes das redes sociais. O agente deve considerar as metas e a percepção do usuário.

ALTERNATIVAS: Definir metas para categorias de aplicativos ou acompanhar o tempo total de uso em conjunto com o tempo por aplicativo.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Collis, A., & Eggers, F. (2022). Effects of restricting social media usage on wellbeing and performance: A randomized control trial among students. PLOS ONE, 17(8), e0272416. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272416. Resultados e discussão.

pmc.ncbi.nlm.nih.gov+1

Chunk 69

CATEGORIA: Metas pessoais; Intervenções adaptativas; Personalização

SITUAÇÃO: O usuário apresenta variações importantes no tempo de uso entre dias da semana e finais de semana, fazendo com que uma única meta diária seja difícil de cumprir em todos os contextos.

ESTRATÉGIA: Adaptar a meta de utilização de acordo com padrões de rotina identificados e preferências informadas pelo usuário. O agente pode ajudar a definir objetivos diferentes para dias úteis e finais de semana, desde que esses objetivos sejam escolhidos ou validados pelo próprio usuário.

OBJETIVO: Tornar as metas compatíveis com as variações reais da rotina, sem confundir diferenças contextuais com perda de autocontrole.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Hsu et al. (2025) identificaram, na revisão de 62 JITAIs, intervenções que utilizavam variáveis contextuais e regras de decisão para adaptar o suporte. A revisão demonstra que a adaptação ao contexto é um componente recorrente de intervenções adaptativas, mas não comprova especificamente que metas diferentes por dia da semana reduzam o uso de smartphones.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando os dados mostram padrões regulares de utilização diferentes entre dias úteis e finais de semana e o usuário deseja estabelecer metas compatíveis com essas diferenças.

RESTRIÇÕES: A variação de uso pode refletir necessidades legítimas da rotina. O agente não deve impor metas diferentes sem conhecer as atividades e intenções do usuário.

ALTERNATIVAS: Metas únicas com revisão periódica ou limites personalizados por aplicativo.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Hsu et al. (2025). Personalized interventions for behaviour change: A scoping review of just-in-time adaptive interventions. British Journal of Health Psychology, 30(1), e12766. DOI: https://doi.org/10.1111/bjhp.12766. Componentes JITAI e resultados.

PMC+1

Estímulos e notificações

Chunk 70

CATEGORIA: Notificações; Controle de estímulos; Interrupções

SITUAÇÃO: O usuário apresenta acessos ao smartphone logo após receber notificações de aplicativos específicos, mesmo quando os alertas não exigem uma resposta imediata.

ESTRATÉGIA: Identificar quais aplicativos geram notificações associadas a acessos frequentes e revisar as permissões de alerta desses aplicativos. O usuário pode desativar notificações não essenciais ou manter apenas aquelas que considera importantes.

OBJETIVO: Reduzir a exposição a estímulos que antecedem acessos não planejados ao smartphone.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Olson et al. (2022) incluíram a desativação de notificações não essenciais em uma intervenção multicomponente. Os estudos encontraram reduções no uso problemático e no tempo de tela, mas não isolaram o efeito dessa técnica. A evidência para a associação específica entre notificações e acessos posteriores deve ser interpretada como limitada a partir das fontes utilizadas nesta pesquisa.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário relata que determinados alertas o levam a abrir aplicativos ou quando identifica esse padrão por meio do próprio histórico e autorrelato.

RESTRIÇÕES: O histórico do Android pode registrar o uso e horários de utilização, mas não permite concluir, por si só, que uma notificação específica provocou a abertura do aplicativo. A relação deve ser confirmada pelo usuário ou por dados adicionais disponíveis.

ALTERNATIVAS: Desativar notificações não essenciais em períodos específicos ou utilizar modos de concentração.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Olson et al. (2022). A Nudge-Based Intervention to Reduce Problematic Smartphone Use: Randomised Controlled Trial. International Journal of Mental Health and Addiction. DOI: https://doi.org/10.1007/s11469-022-00826-w. Resumo e métodos.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov+1

Chunk 71

CATEGORIA: Notificações; Intervenções adaptativas; Receptividade

SITUAÇÃO: O usuário recebe lembretes ou notificações de intervenção em horários nos quais costuma estar ocupado, não responde às mensagens ou as considera inoportunas.

ESTRATÉGIA: Adaptar o momento de envio das notificações com base em pontos de decisão e variáveis de contexto. O agente pode considerar o horário, o comportamento recente e a disponibilidade informada pelo usuário antes de selecionar se deve enviar uma intervenção.

OBJETIVO: Aumentar a adequação temporal das notificações e evitar intervenções em momentos nos quais o usuário não está disponível ou receptivo.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Hsu et al. (2025) revisaram 62 intervenções JITAI em adultos. A revisão identificou diferentes pontos de decisão e variáveis de personalização, incluindo dados autorrelatados e monitoramento passivo. Os ensaios randomizados apresentaram resultados variáveis conforme o comportamento trabalhado. A revisão apoia a arquitetura adaptativa, mas não estabelece uma regra universal de horário ou receptividade para notificações de bem-estar digital.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o agente possui informações suficientes sobre a rotina e quando o usuário relata que notificações em determinados horários são inconvenientes.

RESTRIÇÕES: O horário de uso não revela necessariamente a disponibilidade do usuário. Dados de localização, agenda ou estado emocional não devem ser presumidos quando não estiverem disponíveis e autorizados.

ALTERNATIVAS: Permitir que o usuário escolha horários de recebimento ou ofereça períodos em que prefere não receber notificações.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Hsu et al. (2025). Personalized interventions for behaviour change: A scoping review of just-in-time adaptive interventions. British Journal of Health Psychology, 30(1), e12766. DOI: https://doi.org/10.1111/bjhp.12766. Resumo e componentes JITAI.

PMC+1

Chunk 72

CATEGORIA: Notificações; Dosagem de intervenção; Prevenção de sobrecarga

SITUAÇÃO: O usuário recebe lembretes frequentes sobre suas metas de utilização, mas deixa de responder ou relata que as notificações se tornaram repetitivas e incômodas.

ESTRATÉGIA: Revisar a frequência e a dosagem das notificações, considerando a resposta do usuário e a relevância de cada intervenção. O agente pode reduzir a frequência de mensagens repetidas e priorizar notificações acionadas por situações que realmente justifiquem suporte.

OBJETIVO: Manter a utilidade das intervenções sem sobrecarregar o usuário com alertas frequentes ou pouco relevantes.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Hsu et al. (2025) identificaram que a dosagem e o momento de entrega do suporte são componentes importantes das intervenções adaptativas. A revisão encontrou variação na frequência de pontos de decisão e destacou a necessidade de descrever as regras de decisão e as opções de intervenção. Não estabelece, contudo, um limite ideal de notificações para bem-estar digital.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário relata incômodo com lembretes ou quando a taxa de resposta às notificações diminui ao longo do tempo.

RESTRIÇÕES: A ausência de resposta não significa necessariamente incômodo; o usuário pode estar ocupado ou não ter visualizado a notificação. A decisão de reduzir a frequência deve considerar preferências e autorrelatos.

ALTERNATIVAS: Notificações sob demanda, lembretes em horários escolhidos pelo usuário ou intervenções acionadas por condições comportamentais específicas.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Hsu et al. (2025). Personalized interventions for behaviour change: A scoping review of just-in-time adaptive interventions. British Journal of Health Psychology, 30(1), e12766. DOI: https://doi.org/10.1111/bjhp.12766. Resumo e discussão dos componentes JITAI.

PMC+1

Chunk 73

CATEGORIA: Notificações; Personalização; Substituição de comportamento

SITUAÇÃO: O usuário ultrapassa o limite de tempo definido para um aplicativo e relata que, mesmo após receber um aviso, não sabe o que fazer em seguida ou retorna imediatamente ao mesmo aplicativo.

ESTRATÉGIA: Associar o aviso de limite a uma sugestão de comportamento alternativo previamente escolhido pelo usuário. A notificação pode apresentar a opção de encerrar a sessão e iniciar uma atividade alternativa, em vez de apenas informar que o limite foi ultrapassado.

OBJETIVO: Transformar o aviso em uma oportunidade de transição para outro comportamento, em vez de limitar a intervenção à interrupção do uso.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: O estudo Wellspent (2026) incorporou a substituição de comportamento entre as técnicas utilizadas na intervenção, permitindo que os usuários definissem alternativas para realizar quando recebessem um aviso. O ensaio randomizado com 70 participantes encontrou redução no tempo diário do aplicativo mais problemático, mas não isolou o efeito da substituição de comportamento em relação aos demais componentes.

ADEQUAÇÃO: Pode ser considerada quando o usuário reconhece que deseja interromper a sessão, mas não tem uma atividade alternativa definida.

RESTRIÇÕES: O estudo avaliou um conjunto de técnicas combinadas; não demonstra que a sugestão de atividade alternativa, isoladamente, produza redução de uso. A alternativa deve ser escolhida pelo usuário.

ALTERNATIVAS: Avisos personalizados com opção de encerrar ou continuar, definição de limites pessoais e feedback sobre o tempo de uso.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Promoting Self-Regulated Social Media Use on Smartphones With a Mobile Intervention App (Wellspent): Randomized Controlled Trial (2026). JMIR mHealth and uHealth, 14, e56824. DOI: https://doi.org/10.2196/56824