

Flucortan®

Solução Injetável

USO VETERINÁRIO

Fórmula: Cada mL contém:

Flumetasona 0,5 mg

Veículo q.s.p 1,0 mL

Flucortan® é uma solução injetável a base de flumetasona 0,5 mg/mL. **Flucortan®** possui potente ação anti-inflamatória, imunossupressora e antialérgica no tratamento de distúrbio que respondem aos corticosteróides. A flumetasona é um fármaco esteróide adrenocortical sintético com propriedades predominantemente glicocorticóides.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O ABATE DE ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 04 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.

SUÍNOS

ABATE: O ABATE DE ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 27 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

EQUINOS

ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS DESTINADOS AO ABATE PARA CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Modo de ação: A flumetasona bloqueia a via de metabolismo do ácido araquidônico através da inibição da fosfolipase A2, e inibe a ação da enzima cicloxi-genase e indiretamente inibe a lipoxigenase, o que caracteriza suas propriedades anti-inflamatórias, imunossupressoras e antialérgicas. Os glicocorticóides são capazes de bloquear desde as manifestações mais precoces do processo inflamatório como dor, rubor e calor e até as mais tardias, como reparação e proliferação tecidual. Os esteróides anti-inflamatórios afetam todos os tipos de respostas inflamatórias, sejam elas suscitadas por patógenos invasores, estímulos físicos ou químicos ou por uma reação imunológica inapropriada.

A inflamação é um dos meios naturais de defesa do organismo animal contra a infecção. É uma ação de defesa que tenta isolar ou encapsular o foco do resto do corpo. Entretanto, este processo bloqueia a penetração dos antibióticos na área de infecção. A flumetasona reduz a inflamação, permitindo que os antibióticos atinjam com mais rapidez e eficácia a área de infecção.

Indicações:

Flucortan® solução injetável é indicado como tratamento básico ou de suporte (associado à terapia específica), nos processos inflamatórios, nas infecções bacterianas, afecções alérgicas, toxemias e intoxicações.

Flucortan® é indicado para todos os casos em que se recomenda uma glicocorticoterapia, tais como inflamações articulares e musculoesqueléticas, dermatites, alergias, dor, prurido generalizado, picada de insetos, intoxicações, cetoses, além da terapia de suporte das infecções bacterianas (associado ao uso de antibióticos) e acidentales com animais peçonhentos.

Atenção: Nos casos de infecções ou na suspeita de infecção, **Flucortan®** deverá ser sempre usado concomitantemente com antibiótico ou quimioterápico específico. A Flumetasona, como a cortisona, devido à sua ação anti-inflamatória, pode mascarar os sintomas usuais de uma infecção.

Via de Administração e Posologia:

Flucortan® solução injetável deve ser administrado por via intramuscular. O produto deve ser injetado lentamente.

Posologia:

Bovinos: 0,02 mL de **Flucortan®** para cada kg de peso vivo equivalente a 0,01 mg de flumetasona / kg de peso vivo. O produto pode ser repetido a intervalos de 2 dias. Não exceder 3 aplicações.

Suínos: 0,08 mL de **Flucortan®** para cada kg de peso vivo equivalente a 0,04 mg de flumetasona / kg de peso vivo. O produto pode ser repetido a intervalos de 2 dias. Não exceder 3 aplicações.

Equinos: 0,01 mL de **Flucortan®** para cada kg de peso vivo equivalente a 0,005 mg de flumetasona / kg de peso vivo. O produto pode ser repetido a intervalos de 2 dias. Não exceder 2 aplicações.

Se após 6 dias de tratamento o animal não apresentar melhora, o diagnóstico deverá ser reconsiderado. Em caso de dúvida, consulte um Médico Veterinário.

Precauções:

1) A terapia contínua com **Flucortan®**, especialmente em doses elevadas, pode resultar em supressão da função adrenal. As costumeiras precauções e contra-indicações para os adrenocorticóides aplicam-se a este produto.

2) Os corticosteróides podem, em alguns casos, induzir o primeiro estágio de parto e, se administrados durante o último trimestre da prenhez, poderão provocar parto prematuro com todas as complicações decorrentes do mesmo.

O uso do produto mostrou-se seguro nas espécies suínos e bovinos, administrando pela via intramuscular, em três administração com intervalos de 2 dias entre elas.

Reações Adversas: **Flucortan®**, como qualquer produto corticóide, quando administrado a bovinos e suínos nas doses recomendadas, pode ocasionalmente provocar alterações transitórias, tais como edema de pálebra discreto, alterações gastrointestinais e leucocitose por neutrofilia.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar.

Após aberto, utilizar todo o conteúdo em até 30 dias.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Apresentação: Frasco-ampola de 10 mL.

Responsável Técnico: Dr. Renato Beneduzzi Ferreira - Médico Veterinário - CRMV-SP nº 1695