

MÉTODO DA SECANTE

O método da **secante** é um esquema usado para se obter a solução numérica de uma equação na forma $f(x) = 0$.

O método usa dois pontos na vizinhança da solução para determinar a nova solução estimada (**Fig. 1**). Os dois pontos (marcados como x_1 e x_2 na figura) são usados para definir uma linha reta (reta secante), e o ponto onde essa reta intercepta o eixo x (marcado como x_3 na figura) é a nova solução estimada.

Conforme ilustrado, ambos os pontos podem

- estar de um lado da solução (**Fig. 1a**),
- ou a solução pode estar entre os dois pontos (**Fig. 1b**).




Figura 1 Método da secante.

A inclinação da reta secante é dada por:

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{f(x_2) - 0}{x_2 - x_3} \quad (1)$$

que pode ser resolvida para x_3 :

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)(x_1 - x_2)}{f(x_1) - f(x_2)} \quad (2)$$

Assim que o ponto x_3 é determinado, ele é usado juntamente com o ponto x_2 para calcular a próxima estimativa da solução, x_4 .

A **Eq. (2)** pode ser generalizada para gerar uma fórmula iterativa na qual a nova estimativa da solução x_{i+1} é determinada a partir das duas soluções anteriores, x_i e x_{i-1} .

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)} \quad (3)$$

A **Fig. 2** ilustra o processo iterativo com o método da secante.




Figura 2 Método da secante: processo iterativo.

Neste método partimos das duas aproximações iniciais x_0 e x_1 e determinamos a reta que passa pelos pontos $(x_0, f(x_0))$ e $(x_1, f(x_1))$.

A intersecção desta reta com o eixo x fornece o ponto x_2 .

Em seguida é calculado uma nova aproximação para a raiz a partir dos pontos $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$.

O processo se repete até que seja satisfeito o critério de parada.

Observe que neste método não necessitamos da característica que é fundamental no método da falsa posição que exige que $f(x_n) f(x_{n-1}) < 0$.

É importante salientar também que a raiz não necessita estar entre as duas aproximações iniciais (x_0 e x_1).

Relação com os outros métodos

Quando os dois pontos que definem a reta secante são próximos entre si, esse método é na realidade uma forma aproximada do método de Newton.

A convergência deste método é mais rápida que o método da bisseção e o da falsa posição, contudo, pode ser mais lenta que o método de Newton.

Algoritmo para o método da secante

1. Escolha duas aproximações iniciais x_0 e x_1 como tentativas iniciais da solução.
2. Para $i = 1, 2, \dots$, até que o erro seja menor que um valor especificado, calcule x_{i+1} usando a seguinte fórmula

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

Critério de parada:

$$|x_{i+1} - x_i| \leq \epsilon$$

EXERCÍCIOS

Exercício 1:

Calcular a raiz da função $f(x) = x^2 + x - 6$, sendo $x_0 = 1,5$, $x_1 = 1,7$ e o erro $\leq 10^{-2}$ usando o método da secante.

$$x = 2,0000$$

Exercício 2:

Calcular a raiz da função $f(x) = 3x - \cos(x)$, sendo $x_0 = 0$, $x_1 = 0,5$ e o erro $\leq 10^{-4}$ usando o método da secante.

$$x = 0,31675$$

Exercício 3:

Calcular a raiz da função $f(x) = x^3 - 4$, sendo $x_0 = 1$, $x_1 = 2$ e o erro $\leq 0,05$ usando o método da secante.

$$x = 1,5914$$

Exercício 4:

Calcular a raiz da função $f(x) = x^3 - 9x + 3$ usando métodos

a) Secante ($x_0=0$ e $x_1=1$), com erro $\leq 0,0005$

$$x = 0,337609$$

b) Newton-Raphson ($x_0=0$), com erro $\leq 0,0001$

$$f'(x) = 3x^2 - 9$$

$$f''(x) = 6x$$

$$x = 0,337608$$

Pelo método de falsa posição (Unidade 2 – parte 1 – Exemplo 3) temos:

$$x = 0,337634$$