



Indicadores Biológico-Pesqueros: Langostino Colorado, Langostino Amarillo y Camarón Nailon

Boletín Técnico 11(2) | Lab. EPOMAR UdeC – CRUSTASUR SA | Abril 2026

ASPECTOS PESQUEROS

ASPECTOS BIOLÓGICOS


FAUNA ACOMPAÑANTE

ASPECTOS PESQUEROS

Actividad Pesquera: Distribución Espacial

Las operaciones de abril cubrieron los caladeros desde la región del Biobío hasta O'Higgins, con mayor concentración en los caladeros del Pichilemu, Carranza, Chanco e Itata.

Fig. 1: Distribución espacial del total de lances de pesca realizados durante abril de 2026.



Captura, Esfuerzo y Rendimientos de Pesca

Indicadores Operacionales — Abril 2026

Tabla 1. Indicadores operacionales de la pesquería de langostino colorado, langostino amarillo y camarón nílón, marzo 2026.

Recurso	Mes	N° de lances(n)	Cap. (kg)	Cap.lances (kg/n)	h ar-rast.(ha)	Rend. (kg/ha)	Prof.de fondo(m)
L.colorado	marzo	137	351754	2567	121	2907	249
	abril	162	384280	2372	230	1281	224
L.amarillo	marzo	83	42789	515	49	877	264
	abril	86	48702	566	138	352	238
Camarón	marzo	57	98820	1733	87	1138	324
	abril	37	46825	1265	67	693	283

Distribución de Lances

41%

Langostino colorado
(exclusivo)

13%

Camarón nílón
(exclusivo)

43%

Capturas mixtas
(colorado + Amarillo
+ camarón nílón)

3%

Langostino Amarillo
(exclusivo)

Distribución Espacial de Lances y Rendimientos




Fig. 2: Distribución del rendimiento de pesca (kg/ha) por especie, abril 2026.

Distribución Espacial de Lances y Rendimientos




Fig. 3: Distribución espacial de la composición de las capturas durante abril de 2025.




Fig. 4: Distribución espacial de la composición de las capturas durante abril de 2026.

ASPECTOS PESQUEROS

Esfuerzo y Rendimiento por Caladero





Fig. 5: Distribución de frecuencia del esfuerzo (horas de arrastre) y rendimiento (kg/ha) para las tres especies, abril 2026.

Fig. 6: Rendimiento de pesca por caladero para langostino colorado (A), langostino amarillo (B) y camarón nailon (C), abril 2026



ASPECTOS BIOLÓGICOS

Proporción Sexual y Talla Promedio




Fig. 7: Proporción sexual por especie, abril 2026.

Resultados por Especie

L. Colorado

51% hembras. Tallas promedio: 38 mm LC (♂) y 36 mm LC (♀).
 Tallas superiores a años anteriores (>37 mm LC).

L. Amarillo

68% machos. Tallas promedio: 40 mm LC (♂) y 32 mm LC (♀).
 Repunte de tallas respecto al mes pasado.

Camarón Nailon

70% hembras. Tallas promedio: 28 mm LC (♂) y 30 mm LC (♀).

ASPECTOS BIOLÓGICOS

Tendencia Histórica de Tallas (2016–2026)

- Las tallas medias de langostino colorado en abril 2026 se ubican **sobre los 36 mm LC**. En langostino amarillo, ambos sexos muestran aumento de sus tallas.




Fig. 8: Talla promedio (LC, mm) de langostino colorado y langostino amarillo por sexo, enero 2016 a abril 2026.

ASPECTOS BIOLÓGICOS

Aspectos Reproductivos


Estado Reproductivo — Abril 2026

Recurso	Estado	mar.	abr.
L.colorado	Normal	95%	79%
	Ovígeras	4%	20%
	Madura	1%	1%
Total n°		813	1508
L.amarillo	Normal	100%	100%
	Ovígeras	0%	0%
	Madura	0%	0%
Total n°		246	336
C.nailon	Inmadura	96%	73%
	Madura	4%	27%
Total n°		1221	700

Langostino colorado **20% de hembras ovígeras**, similar año anterior.

Langostino amarillo no registró hembras ovígeras (tendencia desde 2017).

Camarón Nailon **27% de hembras maduras**, predominando hembras inmaduras.



Composición de Tallas por Especie

No se evidenciaron diferencias significativas entre sexos en langostino colorado (talla media 36 y 37.7 mm LC). El langostino Amarillo y camarón nailon sí presentaron diferencias significativas: machos (40 mm) vs. hembras (32 mm LC) y machos (28 mm) vs. hembras (30 mm LC)




Fig. 9: Tallas *L. colorado* por sexo.




Fig. 10: Tallas *L. amarillo* por sexo.





Fig. 11: Tallas camarón nailon por sexo .

ASPECTOS BIOLÓGICOS

Composición de Tallas de L Colorado por Caladero

El langostino colorado mostró las **tallas modales más pequeñas** en San Vicente, mientras que las tallas más grandes se registraron en Pichilemu.

Fig. 12: Composición de tallas de langostino colorado en la UPS por zonas de pesca, abril 2026.




ASPECTOS BIOLÓGICOS

Composición de Tallas de L. Amarillo por Caladero

El langostino amarillo present distribuciones de talla relativamente similares entre San Vicente e Itata.

Fig. 13: Composición de tallas de langostino amarillo en la UPS por zonas de pesca, abril 2026.




ASPECTOS BIOLÓGICOS

Composición de Tallas de C. Nailon por Caladero

El camarón nailon, las mayores tallas se observaron en Chanco, especialmente en hembras.

Fig. 14: Composición de tallas de camarón Nailon en la UPS por zonas de pesca, abril 2026.



FAUNA ACOMPAÑANTE

Fauna Acompañante

Se registró presencia de **pejerrata** como principal fauna acompañante principal en las zonas de Carranza, Chanco e Itata representando el **1,94%** del total de capturas.






Fig. 15: Distribución de lances con captura de *pejerrata* y fracción en capturas totales, abril 2026.

Distribución Espacial de la Fauna Acompañante



Resumen Ejecutivo

Durante abril de 2026, las operaciones se realizaron entre las regiones del Biobío y O'Higgins, destacando los caladeros de Pichilemu, Iloca, Carranza, Chanco e Itata. El esfuerzo se dirigió principalmente a capturas de **langostino colorado** (41 % de los lances), seguido de capturas mixtas de langostino colorado y amarillo (37 %) y camarón nailon exclusivo (13 %).

384t

Langostino colorado

1281 kg/ha de rendimiento promedio

48t

Langostino amarillo

352 kg/ha de rendimiento promedio

46t

Camarón nailon

693 kg/ha de rendimiento promedio

1,9%

Pejerrata

Fauna acompañante principal (9 ton)