

KIDNEYSIS

FECHA: 08/01/2024 23:49:42

PROCEDENCIA:
EDAD: 62 años
SEXO: Masculino
PESO: 99 kg
ESTATURA: 167 cm

FOLIO: 12

PACIENTE: ID 92 (DATOS CONFIDENCIALES) **DOCTOR:** A QUIEN CORRESPONDA

DETECCIÓN DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Ecografía renal.



Descripción:

En el estudio de la ecografía renal del paciente 92 se examina un solo riñón. Los resultados muestran que el riñón estudiado tiene un ancho de 3.11404 cm, una altura de 0.977879 cm y un grosor renal de 0.879 cm. El volumen renal registrado es de aproximadamente 403.812 ml³. Durante la evaluación se detectaron lesiones en el seno renal. Con base en los datos anteriores, el pronóstico o diagnóstico presuntivo sugiere la PRESENCIA DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA.

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
Ancho renal	3.11404*	cm	9 -13
Alto renal	0.977879*	cm	5 - 7
Grosor cortical	0.879	cm	0.7 - 1
Volumen renal	403.812*	ml³	1688.6
Lesión renal	SI	SI / NO	NO

Los datos resultado del análisis son calculados con algortimos de aprendizaje de reconocimiento de patrones,

relación de correlaciones y valores de referencia asi como clasificadores de aprendizaje supervisado.

La interpretación de este análisis debe ser realizado por su médico tratante.

Diagnostico presuntivo, por lo que es obligatorio autenticarse por el médico tratante.

^(*) Resultado fuera de rango de referencia.

El volumen renal de referencia es calculado con datos antropometrícos, por lo que depende de cada paciente.

Si el resultado de volumen renal es menor a 90 ml³ respecto al valor de referencia, se considera parametro positivo a IRC, en otro caso negativo.



FOLIO: 12

PACIENTE: ID 92 (DATOS CONFIDENCIALES) **DOCTOR:** A QUIEN CORRESPONDA

KIDNEYSIS

FECHA: 08/01/2024 23:49:43

PROCEDENCIA:
EDAD: 62 años
SEXO: Masculino
PESO: 99 kg
ESTATURA: 167 cm

DETECCIÓN DE LESIONES EN SENO RENAL



En la imagen se muestra el seno renal en el cual existen lesiones renales delimitadas en contornos de color verde.

Los datos resultado del análisis son calculados con algortimos de aprendizaje de reconocimiento de patrones,

relación de correlaciones y valores de referencia así como clasificadores de aprendizaje supervisado.

La interpretación de este análisis debe ser realizado por su médico tratante.

Diagnostico presuntivo, por lo que es obligatorio autenticarse por el médico tratante.

^(*) Resultado fuera de rango de referencia.

El volumen renal de referencia es calculado con datos antropometrícos, por lo que depende de cada paciente.

Si el resultado de volumen renal es menor a 90 ml³ respecto al valor de referencia, se considera parametro positivo a IRC, en otro caso negativo.