



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD MADERO

Carrera: Sistemas Computacionales.

Materia: Matemáticas Discretas

Alumno: Luis Ricardo Reyes Villar

Numero de control: 21070343

Escuela de procedencia: Dirección General De Bachillerato | Centro De

Estudios De Bachillerato 6/15

Grupo: 1504D

Hora: 3:00-4:00

Semestre: Agosto 2021 - Enero 2022

Foto



Reyes Villar Luis Ricardo Examen Unidad 2 (Parte 2). Relaciones. Scan A=B= {1,2,3,+,5}, R= {(1,1),(1,3),(1,5),(2,2),(2,1),(3,1),(3,3),(3,5),(4,2),(4,4),(5,1),(5,3),(5,5)3. Determine utilizardo matrices si la relación es reflexiva, simétrica o transitiva. MR= 3 1 4 0 5 1 > La diagonal principal de la matriz confiere solamente 15, por lo tanto si es reflexiva La relación es reflexiva ya que aRa VacA se comple La relación es transitiva ya que se comele aRb enfonces bRa Sise comple a Rb entonces & Ra (4.4)-2 (4.4) (5.5)-7(5.5)

Key	les V	illa	~	20	°s.	R	car	do		2	100	14:	-	1	11/3	1	1 1	1	2.5	V
	1				5				A	(3		10	1				1		4/4	
(Tal f)	77	0	31	0	1								130	100	1		1			
MR=	20	1	0	1	0		1	1 13	1		Hd	1	19		186		1	13		130
	40	0	1	0	1	-	(du	3 8	P		10	P	1		1		1			1
	51	0 1 0	101	7	0	-							I		71	II,		30	To part of	
						200		1118	1		100	- CXX	I I	1		-		-	1	
Sie	1. (1.3)	-]-		OAC	000	56	5.1	2 mA	le	al	Pb	V	6/	C	en	ton	ce,	50	Re	1
(1)	1.01.3)=7	(1	3)	400	1	5.1) (13) =	19	3)	+	18	-		L		
(1,1)	1(1,5)=7	(1)	5)		(5.1)	, (1	(5)	=>	(5,	5)	1	0	1	15	V	1	. T	
(1,3	1(1,5), (3,1), (3,1)	50	1	1)									0		2	1	1	9	0	
(1,3	(3,3))=7	(9)	3).		6	2,3)	, 13	(3)	=7/	5,3	3)	1	0		N		P	8	-
	11/20	1=6	16	21		10	11/1	. 1 70	71:	-11	7	11	9	P	M	11		0	A	
(1,5	16,1)=7	1,		1-12	(6	25)	15,	1)=	26	2,1)_	4	0			1			
115	165,3	1=2	(1)	51		(5,5)	15,	3)=	20	15,)					-			
199) (5,5	1	119	12			13/25								188		Y		N S	1
), (4,2		12	2)		1 1			P					PY		-	10			
194	1. (4.4)=2	12	45												1	-	1		1
131	1 (7)	1=>	(3	1)	M				N		CIN		1	Pa		1	-			1
(3.1	1, (1,3)=1	(3	(3)												(In	1	1		7
(3,1), (1,5)=7	(3	5)												10		1	Provide A	
(3,3	2, (3t	()=7	De	()											1	10		1		
(3.3), (1,3), (1,5), (3,5), (3,5	1=1	(3)	1)											(1	1	1	-	
(35	101	1=7	(3)	6)											1	1		14		(
(200	1 (5	3)=2	13	3)											-(1		5	_	1
(At	3 /2	7)=	7 (4	2)												13	12	14	-1	7
149	3 (2	4)=	164	(4)													-			
194	(4,2)	=7	4,2	-)													-			
15),(1,1)	=7	15,	1)																

MR =	M	22.	+M	R							0		-		7		-57			S
	1	1	2	3	4	51	1	1	1	2	3	40	51	10	KOY!	10	10			
	2	A	1	0	1	0		2	0	1	0	1	0			1				
MR2.	= 3	1	0	1	0	1	0	3	1	0	1	0	1	=	X		2)(14	130	0,1
		0	1.		1	0	1	4	0	1	0	1	0	1	1/2	14				1
1.1	5	1		1000	0	1		5	11	0	1	0		166	RO		4			100
tila	1 1	. //	11/	2	0	121	~		מחמיני	1	1= (1910	1	TN	0	10	M		176	
(1)(1)	+ (1)((0)	-(1)	(1)	+(1)(0)+((1)(1):	=1	+0	+1	+0	1	1=	1	anni.	(S	1
1				6		1.0	103			13.7				1 3 3 3	A COLUMN	100		1-4 C	211	[3]
(1)(0)+(0)(1)-	+(1)(0) † (0)(1)-	t(1,	1(0)	=0) + (1+1	UT	0+() =		98.L		
(1)(1)	+11	1/1	1 (((1)	(1)	+10	1/0)+	(1)	(1)	=1	+0	+1	+0	+1	=1	100	10	100	
1111	The second	1		4	-													setto		-
(1)(0)	+ (0	5)(1) +	(1)	(0)	+[1)((1)+	(1)	(0)	= 0	+0	+0	+0	te) =	0	FI	10	114
fila1	X	100	M	111	11.	1) 1	(0)	(0)	11	061)=	1+	DI	11	0+	1=	1	15.4	636	
fila					1) 1	(')	(0).	1 (100		()		()		1		lo li	01	K
11.	7-	40	1. 1	1	1		9			d	1150				10	10	Ms	H		114
(0)(1)						+(1)(0	1+(2)(1)=	0+	0	10-	101	0=	0		ch		
(0)(0	X	110	mp	12	(1)	121	1/6	1) +	(0)	(0)	= 8.	111	0	11.	+0	= 1	118	al		
(0)(0	Y	11	m	10	30,	1	4) (1)	0)	(0)							Lies			
fila 2 (0)(1)	H(1)	10)+	(0)	(1)	+(1) (c	+	(0)	1)=	0+	0+	04	0+1) =	0	1011	M	100	THE STATE OF THE S
fil 2 (0)(0)	×	olu	ma	4		ſ.,	14) . 1		10	61	1 1	1-	1	1	1	1	COL		101
(0)(0)	1+(1	11	1+1	0)1	0)-	HU.)CL,	1+1	971	9)=	UF	(+()+	(+)	0 =	1	134			
fila (1+('	1)(01+	ina lo	170	+(1	(o)	+	6)()=	0+	0+	oto	0+	0=	0	IM		811	3/4
ajc		1,0			101	6	1		10							1	1000	wu	22	36

Reyo Villar Lois Ricardo 1) +(0)(0) +(1)(1)+(0)(0)+(1)(1)=1+0+1+0+1=1 (a) + (a) (1) + (n) (1) + (n) (0) = 0 + 0 + 0 + 0 = 0 file 3 < colomn 3 (1) (1) + (0)(0) + (0)(0) + (0)(0) + (1)(0) = 1+0+1+0+1=1 (26)+(0)(1)+(1)(0)+(0)(1)+(1)(0)=0+0+0+0=0 (1)(1)+(0)(0)+(1)(1)+(0)(0)+(1)(1)=1+0+1+0+1=1 fila 4 de MR2 4 x colomna (0)(1)+(1)(0)+(0)(1)+(1)(0)+(0)(1)+6+0+0+0+0+0=0 (a)(a)+(1)(1)+(6)(0)+(1)(1)+(0)(0)=(0+1+0+2+0=1 (a) (1) + (1)(0) + (b) (1)+(1)(0)+(0)(1) = 0+0+0+0+0=0 fila 4 x columna 4 (0) (0)+(1)(1)+(0) (0)+(1)(1)+(0) (0)=0+1+0+0=1 G(1)+(1)(0)+(0)(1)+(1)(0)+(0)(1)=0+0+0+0=0 fila 5 x colomna (7(1)+(0)(0)+(1)(1)+(0)(0)+(1)(1)=1+0+1+0+1=1 \$10 5 x colomno 2 (1)(0)+(0)(0)+(1)(0)+(0)(1)+(1)(0)=0+0+0+0+0=0 file 5 x colomna 3 (1)(1)+(0)(0)+(1)(1)+(0)(0)+(1)(1)= 1+0+1+0+1=1 file 3 x columna 7 (1) (0) + (0) (1) + (1) (0) + (0) (1) + (1) (0) = 6+0+0+0+0+0