1 Boolesche Algebra

- Aussagen haben einen Wahrheitswert (1 := true, 0 := false)
- Aussagen koennen durch Platzhalter symbolisiert werden
- Bezeichnungen fuer Wahrheitswerte
- Aussagen koennen miteinander verknuepft werden

1.1 Logische Verknuepfungen

1.1.1 Einstelliger Operator

- Negation: -a

1.1.2 Zweistellige Operatoren

- Und (Aussage ist wahr gdw. beide Teilaussagen wahr sind): $a \wedge b$
- Oder (Aussage ist wahr gdw. min. eine Teilaussage wahr ist): $a \vee b$
- Exklusives Oder, XOR (Aussage ist wahr gdw. nur eine Teilaussage wahr ist): $a~\otimes~b$
- NXOR (Aussage ist wahr gdw. beide Aussagen den gleichen Wahrheitswert haben): $a \equiv b$
- NAND (Aussage ist wahr gdw. nicht beide Aussagen wahr sind): -a \vee -b

1.2 Logiktabellen

Eingaben		AND	OR	XOR	XNOR	NAND	NOR
\mathbf{x}_1	x_2	$x_1 \land x_2$	$x_1 \lor x_2$	$x_1 \otimes x_2$	$x_1 \equiv x_2$	$-x_1 \lor -x_2$	$x_1 \lor x_2$
0	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	1	0	0