


## 1 Transformações lineares

- Definições básicas
- Matriz de uma transformação linear

Trata-se da projeção de um vetor do espaço  $\mathbb{R}^3$  no plano  $z = 0$ .



## Exemplo 1

Qual é a projeção de  $(1, 3, -1)$ ? E de  $(0, 1, 5)$ ?

E de  $(1, 3, -1) + (0, 1, 5)$ ? E de  $3(1, 3, -1)$ ?

Calcule a projeção dos vetores  $(1, 0, 0)$ ,  $(0, 1, 0)$  e  $(0, 0, 1)$ .

Qual é o resultado de  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ ?

## Definição

Diz-se que uma aplicação  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  é **uma transformação linear** se se verificam as seguintes propriedades:

- 1 para quaisquer  $u, v \in \mathbb{R}^n$ ,  $f(u + v) = f(u) + f(v)$ ;
- 2 para quaisquer  $\lambda \in \mathbb{R}$  e  $v \in \mathbb{R}^n$ ,  $f(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot f(v)$ .

Estas duas condições significam que  $f$  preserva a adição de vetores e a multiplicação por um escalar, respetivamente.

São designações equivalentes a transformação linear as expressões aplicação linear e homomorfismo entre espaços vectoriais.

## Exemplo 1 - continuação

$$\begin{aligned} \text{pr} : \quad \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (x, y, 0) \end{aligned}$$

Se  $\lambda \in \mathbb{R}$  e  $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3$ , então

$$\begin{aligned} \text{pr}((x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)) &= \text{pr}(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \\ &= ((x_1 + x_2), (y_1 + y_2), 0) \\ &= (x_1, y_1, 0) + (x_2, y_2, 0) \\ &= \text{pr}(x_1, y_1, z_1) + \text{pr}(x_2, y_2, z_2), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{pr}(\lambda(x_1, y_1, z_1)) &= \text{pr}(\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1) \\ &= (\lambda x_1, \lambda y_1, 0) \\ &= \lambda(x_1, y_1, 0) \\ &= \lambda \text{pr}(x_1, y_1, z_1). \end{aligned}$$

Logo,  $\text{pr}$  é uma transformação linear.

## Exemplo 2

$$\begin{aligned} \text{Seja } \psi : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto (2x + y, -y + 3z) \end{aligned} .$$

Será  $\psi$  uma aplicação linear?

$$\begin{aligned} \psi((x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)) &= \\ &\vdots \\ &= \psi(x_1, y_1, z_1) + \psi(x_2, y_2, z_2), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \psi(\lambda(x_1, y_1, z_1)) &= \\ &\vdots \\ &= \lambda \psi(x_1, y_1, z_1). \end{aligned}$$

Logo,  $\psi$  é uma transformação linear.

## Exemplo 3

Seja  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ . Considere-se a aplicação

$$\begin{aligned} \psi_A : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto (x', y') \end{aligned}$$

em que

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = A \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Assim, verifica-se que

$$\psi_A(x, y, z) = (2x + y, -y + 3z),$$

o que significa que  $\psi_A = \psi$ , onde  $\psi$  é a aplicação linear definida no exemplo anterior.

Genericamente, sendo  $m, n \in \mathbb{N}$ ,  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , define-se

$$f_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$f_A(x_1, \dots, x_n) = (x'_1, \dots, x'_m)$$

em que

$$A \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_m \end{bmatrix}.$$

$f_A$  é uma aplicação linear porque, para  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$  e  $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$ ,

verifica-se que

$$A(X + Y) = AX + AY \quad \text{e} \quad A(\lambda X) = \lambda(AX).$$



Considerem-se as seguintes funções:

4- a translação definida pelo vetor  $(1, 2, -1)$

$$\begin{aligned} t : \quad \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (1, 2, -1) + (x, y, z) \end{aligned} ;$$

$$\begin{aligned} 5- \quad d : \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\mapsto (x, |y|) \end{aligned} .$$

São aplicações lineares?

### Proposição

Seja  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  uma transformação linear. Então:

- 1  $f(0_{\mathbb{R}^n}) = 0_{\mathbb{R}^m}$ ;
- 2 para qualquer  $v \in \mathbb{R}^n$ ,  $f(-v) = -f(v)$ ;
- 3 para quaisquer  $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$  e  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  escalares,

$$f(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k) = \alpha_1 f(v_1) + \dots + \alpha_k f(v_k).$$

## Exemplo 6

Considere no espaço vetorial  $\mathbb{R}^3$  a base

$$\mathcal{B} = ((1, 0, 2), (1, 0, 1), (-1, 1, 0))$$

e admita-se que  $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$  é uma transformação linear tal que:

$$\phi(1, 0, 2) = (1, 2, 0, 1),$$

$$\phi(1, 0, 1) = (0, 1, 1, 1),$$

$$\phi(-1, 1, 0) = (1, 0, 0, 1).$$

Como calcular  $\phi(1, 2, 1)$ ?

$$(1, 2, 1) = -2(1, 0, 2) + 5(1, 0, 1) + 2(-1, 1, 0),$$

$$\begin{aligned}\phi(1, 2, 1) &= \phi(-2(1, 0, 2) + 5(1, 0, 1) + 2(-1, 1, 0)) \\ &= -2\phi(1, 0, 2) + 5\phi(1, 0, 1) + 2\phi(-1, 1, 0) \\ &= -2(1, 2, 0, 1) + 5(0, 1, 1, 1) + 2(1, 0, 0, 1) = (0, 1, 5, 5).\end{aligned}$$

## Exemplo 6

Será possível conhecer a imagem de um qualquer vetor de  $\mathbb{R}^3$ ?

Generalizando o procedimento anterior:

$$(a, b, c) = (-a - b + c)(1, 0, 2) + (2a + 2b - c)(1, 0, 1) + b(-1, 1, 0),$$

$$\begin{aligned}\phi(a, b, c) &= \phi((-a - b + c)(1, 0, 2) + (2a + 2b - c)(1, 0, 1) + b(-1, 1, 0)) \\ &= (-a - b + c)\phi(1, 0, 2) + (2a + 2b - c)\phi(1, 0, 1) + b\phi(-1, 1, 0) \\ &= (-a - b + c)(1, 2, 0, 1) + (2a + 2b - c)(0, 1, 1, 1) + b(1, 0, 0, 1) \\ &= (-a + c, c, 2a + 2b - c, a + 2b).\end{aligned}$$

## Exemplo 6

A aplicação

$$\begin{aligned}\phi : \quad \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^4 \\ (a, b, c) &\longmapsto (-a + c, c, 2a + 2b - c, a + 2b)\end{aligned}$$

é uma transformação linear nas condições do enunciado.

Será que existe outra transformação linear nas condições do enunciado?

Como  $\mathcal{B}$  é uma base, as coordenadas de cada  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  são únicas, pelo que o procedimento anterior conduz a um resultado único para  $\phi(a, b, c)$  e permite escrever

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -a - b + c \\ 2a + 2b - c \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a + c \\ c \\ 2a + 2b - c \\ a + 2b \end{bmatrix}.$$

## Definição

Sendo  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  uma transformação linear, chama-se **matriz de  $f$ , relativamente às bases  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$  de  $\mathbb{R}^n$  e  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^m}$  de  $\mathbb{R}^m$** , à matriz

$$\mathcal{M}(f; \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}^m}) = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \cdots & \alpha_{mn} \end{bmatrix},$$

cujas colunas são as coordenadas das imagens dos vetores da base  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$  na base  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^m}$ .

## Proposição

Sejam  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  uma transformação linear,  $v \in \mathbb{R}^n$ ,  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$  uma base de  $\mathbb{R}^n$  e  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^m}$  uma base de  $\mathbb{R}^m$ . Se as coordenadas de  $v$  na base  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$  são  $(x_1, \dots, x_n)$ , então a imagem  $f(v)$  tem coordenadas  $(y_1, \dots, y_m)$  na base  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^m}$  em que

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \mathcal{M}(f; \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}^m}) \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$