



Valores e Vetores Próprios

- Definições básicas
- Determinação de valores e vetores próprios

Definições

Sejam $n \in \mathbb{N}$ e A uma matriz quadrada de ordem n . Diz-se que uma matriz coluna X , de tipo $n \times 1$, é *vetor próprio (ou vetor caraterístico) de A* se:

- $X \neq 0_{n \times 1}$;
- existir um escalar λ tal que $AX = \lambda X$.

O valor λ designa-se *valor próprio (ou valor caraterístico) de A* e diz-se que o *vetor próprio X está associado ao valor próprio λ* .

Definição

Se λ é um valor próprio,

$$\mathcal{V}_\lambda = \{X \in \mathcal{M}_{n \times 1}(\mathbb{R}) \mid AX = \lambda X\}$$

designa-se o *subespaço próprio (ou subespaço caraterístico) associado ao valor próprio λ* .

Proposição

Sejam $n \in \mathbb{N}$ e A uma matriz quadrada de ordem n . Então λ é um valor próprio de A se e só se $\det(A - \lambda I_n) = 0$.

Definição

Sejam $n \in \mathbb{N}$ e A uma matriz quadrada de ordem n . Então o polinómio de grau n em λ $\det(A - \lambda I_n)$ designa-se *polinómio caraterístico de A* .

Assim, os valores próprios de A são as raízes do polinómio caraterístico de A e a multiplicidade de uma sua raiz λ_0 diz-se a *multiplicidade algébrica de λ_0* .

Resumo:

Dada uma matriz quadrada A , para determinar os valores e os vetores próprios de A deve-se:

- 1 calcular o polinómio caraterístico, $\det(A - \lambda I)$;
- 2 determinar as raízes do polinómio caraterístico, para obter os valores próprios;
- 3 para cada valor próprio λ resolver o sistema
$$(A - \lambda I)X = 0,$$
para obter os vetores próprios associados a λ .

► Exemplo 1

Considere-se a matriz

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(G - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}) = \det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 0 & 2 \\ 0 & -1 - \lambda & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{bmatrix} = -\lambda^3 + 3\lambda + 2$$

e as raízes do polinómio $-\lambda^3 + 3\lambda + 2$ são 2 e -1 . De facto

$$-\lambda^3 + 3\lambda + 2 = -(\lambda - 2)(\lambda + 1)^2$$

pelo que os valores próprios de A são 2, com multiplicidade algébrica 1, e -1 , com multiplicidade algébrica 2.

Para calcular os subespaços próprios é necessário resolver os sistemas:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{e}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Os subespaços próprios são:

$$\mathcal{V}_2 = \left\{ \alpha \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} : \alpha \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{e}$$

$$\mathcal{V}_{-1} = \left\{ \alpha \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} : \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

► Exemplo 2

Considere-se a matriz

$$M = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\det(M - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}) = \det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 2 - \lambda & -2 \\ 1 & -1 & -\lambda \end{bmatrix} = -\lambda^3 + 3\lambda^2$$

e as raízes do polinómio $-\lambda^3 + 3\lambda^2$ são 3 e 0. Dado que

$$-\lambda^3 + 3\lambda^2 = -\lambda^2(\lambda - 3),$$

os valores próprios de A são 0, com multiplicidade algébrica 2, e 3, com multiplicidade algébrica 1.

Os subespaços próprios são as soluções dos sistemas:

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad e$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

isto é,

$$\mathcal{V}_3 = \left\{ \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} : \alpha \in \mathbb{R} \right\} \quad e \quad \mathcal{V}_0 = \left\{ \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} : \alpha \in \mathbb{R} \right\}.$$

► Exemplo 3

Considere-se a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}) = 3 + \lambda^2$$

e as raízes do polinómio $3 + \lambda^2$ são $-i\sqrt{3}$ e $i\sqrt{3}$, ou seja, A não tem valores próprios reais. Consequentemente, também não existem vetores próprios com coordenadas reais.