Procedimento Operacional Padrão: Uso seguro de anestésicos

Segurança que se vê, cuidado que se sente.

VIVA
Estética Segura

Objetivo

Assegurar o uso de anestésicos em dose e via adequadas e o reconhecimento precoce de sinais de toxicidade sistêmica.

Antes da utilização

- Confirmar a ausência de história de alergia.
- Verificar a dose máxima recomendada em bula.
- Considerar o peso corporal do paciente e a extensão da área de aplicação.

Anestésicos tópicos

- Aplicar exclusivamente na área a ser tratada.
- Respeitar a quantidade e o tempo de exposição indicados em bula.
- Não aplicar sobre pele com solução de continuidade.
- Remover completamente antes do procedimento.

Sinais de toxicidade sistêmica – interromper e acionar o atendimento de emergência

- Parestesia perioral.
- Gosto metálico.
- Zumbido.
- Tontura ou confusão mental.
- Tremores ou convulsão.
- Arritmia cardíaca.

Cuidados importantes

- Registrar produto, concentração e volume no prontuário.
- Considerar a dose cumulativa de anestésicos utilizados no mesmo atendimento.
- Manter o paciente em observação após a utilização.
- Manter o kit de emergência conferido.

Referência: Ministério da Saúde/Anvisa/Fiocruz. Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, 2013; bula do produto.