

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Finančna matematika – 1. stopnja

Ime Priimek  
**NASLOV DELA**

Delo diplomskega seminarja

Mentorica: izr. prof. dr. Ime Priimek  
Somentor: doc. dr. Ime Priimek

Ljubljana, 2016



# Kazalo

<b>1</b>	<b>Drugi komplementarni zagrebški indeks</b>	<b>1</b>
1.1	k kot funkcija parametra n . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Naloga</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Uvod</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Zveznost</b>	<b>4</b>
4.1	Naslov morebitnega (pod)razdelka . . . . .	5
4.2	Pisanje algoritmov . . . . .	5
<b>5</b>	<b>Konec dela</b>	<b>5</b>
	<b>Literatura</b>	<b>9</b>



## Naslov dela

### POVZETEK

V povzetku na kratko opišemo vsebinske rezultate dela. Sem ne sodi razlaga organizacije dela – v katerem poglavju/razdelku je kaj, pač pa le opis vsebine.

## Angleški prevod slovenskega naslova dela

### ABSTRACT

Prevod slovenskega povzetka v angleščino.

**Math. Subj. Class. (2020):** 74B05, 65N99

**Ključne besede:** integracija, kompleks,  $C^*$ -algebre

**Keywords:** integration, complex,  $C^*$ -algebras



# 1 Drugi komplementarni zagrebški indeks

**Definicija 1.1.** Naj bo  $G$  graf ter  $E(G)$  množica njegovih povezav. Z  $d_G(u)$  označimo stopnjo vozlišča  $u \in E(G)$ . Tedaj definiramo drugi komplementarni zagrebški indeks kot:

$$cM_2(G) := \sum_{uv \in E(G)} |d_G(u)^2 - d_G(v)^2| \quad (1.1)$$

Do nedavnega je veljala naslednja domneva, ki pa jo je dokazal Gao [3].

**Trditev 1.2.** Naj bo  $\mathcal{G}_n$  množica povezanih grafov reda  $n$ ,  $K_m$  popoln graf, torej  $(m-1)$ -regularen, in  $\overline{K}_m$  njegov komplement, torej nepovezan graf z  $m$  vozlišči.

Tedaj za vsak  $n \geq 5$  velja, da če  $G^* \in \mathcal{G}_n$  doseže maksimalno vrednost drugega komplementarnega Zagrebškega indeksa  $cM_2(G)$ , potem obstaja  $k < \lceil n/2 \rceil$ , tak da je  $G^*$  izomorfen grafu  $K_k + \overline{K}_{n-k}$ :

$$\forall n \geq 5 : G^* \in \arg \max_{G \in \mathcal{G}_n} cM_2(G) \implies \exists k < \lceil \frac{n}{2} \rceil : G^* \cong K_k + \overline{K}_{n-k}, \quad (1.2)$$

kjer je operacija  $+$  definirana kot

$$G_1 + G_2 := (V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2 \cup \{\{v_1, v_2\} \mid v_1 \in V_1, v_2 \in V_2\}).$$

## 1.1 $k$ kot funkcija parametra $n$

Ker zdaj po Gao [3] vemo, da domneva 1.2 drži, si želimo izraziti  $k$  kot funkcijo parametra  $n$ . V tem razdelku bomo tako funkcijo izpeljali.

**Trditev 1.3.** Naj bo  $n \geq k$ , tedaj je drugi komplementarni zagrebški indeks grafa  $G = K_k + \overline{K}_{n-k}$  enak  $cM_2(G) = k(n-k)((n-1)^2 - k^2)$ .

*Dokaz.* Naj bo  $G = K_k + \overline{K}_{n-k}$ . Graf  $G$  je očitno dvodelen, zato njegove povezave razdelimo na notranje povezave podgrafa  $K_k$ , povezave med  $K_k$  in  $\overline{K}_{n-k}$  ter na notranje povezave podgrafa  $\overline{K}_{n-k}$ .

$$\begin{aligned} cM_2(G) &= \sum_{uv \in E(G)} |d_G(u)^2 - d_G(v)^2| \\ &= \sum_{uv \in E(K_k)} |((k-1) + (n-k))^2 - ((k-1) + (n-k))^2| + \\ &\quad \sum_{u \in V(K_k) \wedge v \in V(\overline{K}_{n-k})} |((k-1) + (n-k))^2 - k^2| + \\ &\quad \sum_{uv \in E(\overline{K}_{n-k})} |k^2 - k^2| \\ &= |V(K_k)| |V(\overline{K}_{n-k})| ((n-1)^2 - k^2) \\ &= k(n-k)((n-1)^2 - k^2) \end{aligned}$$

□

Za lažje nadaljevanje brez dokaza navedimo Cardanovo formulo, ki jo bomo uporabili pri naši funkcijski analizi.

**Izrek 1.4** (Cardanova formula). Naj bo  $ax^3+bx^2+cx+d=0$  splošna kubična enačba z  $a \neq 0$  ter naj bodo  $\Delta_0 = b^2 - 3ac$ ,  $\Delta_1 = 2b^2 - 9abc + 27a^2d$  in  $C = \sqrt[3]{\frac{\Delta_1 \pm \sqrt{\Delta_1^2 - 4\Delta_0^3}}{2}}$ . Potem so rešitve dane kubične enačbe enake:

$$x_k = -\frac{1}{3a} \left( b + \xi^k C + \frac{\Delta_0}{\xi^k C} \right), \quad (1.3)$$

za  $\xi = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ , ter  $k \in \{0, 1, 2\}$ .

**Trditev 1.5.** Za dani  $n \geq 5$  funkcija  $f(n, k) = k(n-k)((n-1)^2 - k^2)$  doseže maksimum pri

$$k = \frac{1}{72} * \left( 18n + \frac{\xi(n)}{\sqrt[3]{\psi(n)}} - 6\sqrt[3]{\psi(n)} \right), \quad (1.4)$$

kjer sta  $\xi$  ter  $\psi$  enaka:

$$\xi(n) = 6(-3)^{2/3} (8 + n(-16 + 11n)),$$

$$\psi(n) = -9(n-2)n(3n-2)$$

$$+ 4\sqrt{3} \sqrt{-(n-1)^2 (32 + n(-128 + n(201 + 2n(-73 + 34n))))}$$

. Velja tudi, da je  $f$  konkavna na intervalu

$$\left[ \frac{n}{4} - \frac{\sqrt{11n^2 - 16n + 8}}{4\sqrt{3}}, \frac{n}{4} + \frac{\sqrt{11n^2 - 16n + 8}}{4\sqrt{3}} \right]$$

in konveksna drugod.

*Dokaz.*

$$\frac{\partial f}{\partial k} = 4k^3 - 3nk^2 - 2(n-1)^2k + n(n-1)^2 \quad (1.5)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial k^2} = 12k^2 - 6nk - 2(n-1)^2 \quad (1.6)$$

- Ob razrešitvi neenačbe  $\frac{\partial^2 f}{\partial k^2} \leq 0$ , dobimo rešitev

$$k \in \left[ \frac{n}{4} - \frac{\sqrt{11n^2 - 16n + 8}}{4\sqrt{3}}, \frac{n}{4} + \frac{\sqrt{11n^2 - 16n + 8}}{4\sqrt{3}} \right],$$

$f$  je na tem intervalu torej res konkavna, drugod pa konveksna.

- uff ...

□

**Posledica 1.6.** Ker je ničla funkcije

$$f(n, k) = k(n-k)((n-1)^2 - k^2),$$



ki pripada območju  $[0, \infty)$  zgolj ena, ter je  $f$  v njeni okolici konkavna za vsak  $n \geq 5$ , je iskana funkcija  $k$  parametra  $n$  enaka:

$$\Gamma(n) = \arg \max_{x \in \{\lceil h(n) \rceil, \lfloor h(n) \rfloor\}} \text{cM}_2(x), \quad (1.7)$$

kjer so  $h$ ,  $\xi(n)$  in  $\psi(n)$  enaki:

$$\begin{aligned} h(n) &= \frac{1}{72} \left( 18n + \frac{\xi(n)}{\sqrt[3]{\psi(n)}} - 6\sqrt[3]{\psi(n)} \right), \\ \xi(n) &= 6(-3)^{2/3} (8 + n(-16 + 11n)), \\ \psi(n) &= -9(n-2)n(3n-2) \\ &\quad + 4\sqrt{3} \sqrt{-(n-1)^2 (32 + n(-128 + n(201 + 2n(-73 + 34n))))}. \end{aligned}$$

## 2 Naloga

### Group 11: The Complementary Second Zagreb Index (2 students, round 1)

The *Complementary Second Zagreb Index* (also CSZ index) of a graph  $G$  is defined as

$$\text{cM}_2(G) = \sum_{uv \in E(G)} |(d_G(u))^2 - (d_G(v))^2|,$$

where  $d_G(u)$  denotes the degree of a vertex  $u$  in  $G$  and  $E(G)$  represents the set of edges of  $G$ . Note that  $+$  is the operation join of two graphs in the following conjecture.

**Conjecture 9.** If  $G^*$  is a graph having the maximum value of  $\text{cM}_2$  among all connected graphs of order  $n$ , then  $G^*$  is isomorphic to  $K_k + \overline{K}_{n-k}$  for some  $k$  satisfying  $k < \lceil n/2 \rceil$ , where  $n \geq 5$  and the graph  $K_k + \overline{K}_{n-k}$ .

Your tasks are the following:

- Test the above conjecture.
- Assuming it is true, determine  $k$  as a function of  $n$ .
- Find which graphs have minimum and which have maximum among graphs on  $n$  vertices with cyclomatic number  $k$ .

In order to do so test systematically for smaller graphs. For larger graphs use some metaheuristic.

Slika 1: Problem

## 3 Uvod

Na začetku prvega poglavja/razdelka (ali v samostojnem razdelku z naslovom Uvod) napišite kratek zgodovinski in matematični uvod. Pojasnite motivacijo za problem, kje nastopa, kje vse je bil obravnavan. Na koncu opišite tudi organizacijo dela – kaj je v kakšnem razdelku.

Če se uvod naravno nadaljuje v besedilo prvega poglavja, lahko nadaljujete z besedilom v istem razdelku, sicer začnete novega. Na začetku vsakega razdelka/podrazdelka poveste, čemu se bomo posvetili v nadaljevanju. Pri pisanju uporabljajte ukaze za matematična okolja, med formalnimi enotami dodajte vezno razlagalno besedilo.

## 4 Zveznost

V tem poglavju bomo ponovili osnovne pojme, povezane z zveznostjo funkcij. Pri tem bomo sledili [4].

Viri se v seznamu literature prikažejo le, če jih uporabimo v besedilu, zato moramo citirati tudi [6, 2, 5, 7, 1].

**Definicija 4.1.** Funkcija  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  je *zvezna*, če ...

Podrobneje si pogledjmo naslednji rezultat. Ker se bomo kasneje nanj sklicevali, si pripravimo oznako z ukazom `\label{oznaka}`. Seveda morajo biti oznake različnih trditvev različne. Enako označujemo tudi druga okolja oziroma enote besedila.

**Izrek 4.2.** *Zvezna funkcija na zaprtem intervalu je enakomerno zvezna.*

*Dokaz.* Na začetku dokaza, če je to le mogoče in smiselno, razložite idejo dokaza.

Dokazovali bomo s protislovjem. Pomagali si bomo z definicijo zveznosti in s kompaktnostjo intervala. Izberimo  $\varepsilon > 0$ . Če  $f$  ni enakomerno zvezna, potem za vsak  $\delta > 0$  obstajata  $x, y$ , ki zadoščata

$$|x - y| < \delta \quad \text{in} \quad |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon. \quad (4.1)$$

□

V zgornjem primeru smo kvadratega za konec dokaza postavili v zadnjo vrstico besedila, ki je vrstična formula, s pomočjo ukaza `\qedhere`. Ta ukaz ustrezno deluje znotraj okolij *equation*, *align\** in podobnih, ne pa znotraj `$$ ... $$`.

Oglejmo si še enkrat neenačbi (4.1). Na formule se sklicujemo z ukazom `\eqref{oznaka}`, ki postavi zaporedno številko enačbe v oklepaje, na trditve in ostale enote pa z ukazom `\ref{oznaka}`. Črni pravokotnik ob robu strani označuje predolgo vrstico, kjer  $\LaTeX$ ni uspel pravilno postaviti besedila, zato mu morate pomagati, npr. tako, da stavek nekoliko preoblikujete, sami razdelite nedeljivo enoto (npr. razdelite matematično formulo na dva dela) ali pa ponudite možnosti za deljenje težavne besede s pomočjo znakov`\-`, ki jih postavite na mesto, kjer se besedo sme deliti, npr. `te\-\žav\-\nost\-\ni\-\ca`. Zgoraj bi tako lahko zapisali:

Oglejmo si še enkrat neenačbi (4.1). Za sklicevanje na označene enote besedila imamo na razpolago dva ukaza; na formule se sklicujemo z ukazom `\eqref{oznaka}`, ...

V predzadnjem odstavku je v oklepaju za okrajšavo npr. nastal predolg presledek sredi stavka, saj je  $\LaTeX$ zaradi pike sklepal, da je na tem mestu stavka konec. Tak predolg presledek preprečimo tako, da za piko sredi stavka postavimo poševnico in za njo presledek, torej `\ .`

Če dokaz trditve ne sledi neposredno formulaciji trditve, moramo povedati, kaj bomo dokazovali. To naredimo tako, da ob ukazu za okolje dokaz dodamo neobvezni

parameter, v katerem napišemo besedilo, ki se bo izpisalo namesto besede *Dokaz*, npr. `\begin{Dokaz}[Dokaz izreka \ref{izr:enakomerno}]`.

*Dokaz izreka 4.2.* Dokazovanja te trditve se lahko lotimo tudi takole ... □

## 4.1 Naslov morebitnega (pod)razdelka

Besedilo naj se nadaljuje v vrstici naslova, torej za ukazom `\subsection{}` ne smete izpustiti prazne vrstice.

Podobno kot lahko spremenimo ime dokaza, lahko dodamo komentar v ime trditve, torej s pomočjo neobveznega parametra; prvega od spodnjih izpisov dosežemo z ukazom `\begin{posledica}[izrek o vmesni vrednosti]`. Če želimo v parametru navesti vir, pri katerem bomo navedli podatek o tem, kje v viru to trditev najdemo, pa uporabimo ukaz `\begin{posledica}[\protect\cite{izrek 3.14}{glob}]]`.■  
Seveda lahko obe možnosti kombiniramo.

**Posledica 4.3** (izrek o vmesni vrednosti). *Naj bo  $f$  zvezna in ...*

Ali pa

**Posledica 4.4** (izrek o vmesni vrednosti [4, izrek 3.14]). *Naj bo  $f$  zvezna in ...*

Podobno lahko napovemo tudi vsebino primera.

**Primer 4.5** (nezvezna funkcija nima nujno lastnosti povprečne vrednosti). Naj bo  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dana s predpisom ... ◇

## 4.2 Pisanje algoritmov

Za pisanje algoritmov sta na voljo okolji `algorithm` in `algorithmic` iz paketov `algorithm` in `algorithmix`, ki sodelujeta podobno kot `table` in `tabular`. Algoritmi plavajo med tekstom, enako kot slike in tabele, nanje se lahko tudi sklicujemo, kot prikazano v izvorni kodi in v algoritmu 1. Sklicujemo se lahko tudi na pomembne vrstice, npr. na vrstico 19, ki predstavlja glavni del algoritma. Za primer pisanja algoritma se posvetujte s primerom v tem dokumentu, za bolj napredne primere uporabe, kot na primer razbijanje algoritma na več kosov, pa z (precej razumljivo) uradno dokumentacijo<sup>1</sup>. Če želite vključiti izvorno kodo nekega programa, priporočamo paket `minted`<sup>2</sup>.

## 5 Konec dela

Na konec dela sodita angleško-slovenski slovarček strokovnih izrazov in seznam uporabljene literature, morebitne priloge (programska koda, daljša ponovitev dela snovi, ki je bil obravnavan med študijem ...) pa neposredno pred ti enoti. Slovar naj vsebuje vse pojme, ki ste jih spoznali ob pripravi dela, pa tudi že znane pojme, ki ste jih spoznali pri izbirnih predmetih. Najprej navedite angleški pojem (ti naj bodo

<sup>1</sup><http://tug.ctan.org/macros/latex/contrib/algorithmicx/algorithmicx.pdf>

<sup>2</sup><https://github.com/gpoore/minted>

---

**Algoritem 1** Opis, ki ima enako funkcionalnost kot opis pod sliko.

---

**Vhod:** Števili  $n, m \in \mathbb{N}, n > m$ .

**Izhod:** Decimalno število  $x$ , ki aproksimira rešitev enačbe  $nx = m$ .

```
1: function REŠI( $n, m$ )                                ▷ Vsi vhodni parametri morajo biti opisani.
2:    $a \leftarrow []$                                        ▷ Spremenljivka  $a$  naj postane prazna kopica.
3:   for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
4:     if  $i \bmod 7 = 5$  then
5:       HEAPOP( $a$ )
6:     else if  $i < 5$  then
7:       HEAPPUSH( $a, \frac{i+12}{7} + \pi$ )                    ▷ Lahko uporabljamo matematiko.
8:     else
9:       HEAPPUSH( $a, i$ )
10:    end if
11:  end for
12:   $x \leftarrow 0$                                        ▷ Prazna vrstica
13:  for each  $e$  in  $a$  do                                ▷ To je primer komentarja.
14:     $x \leftarrow 1 + \sqrt[e]{x}$ 
15:  end for
16:  while  $|x| > \varepsilon$  do
17:     $x \leftarrow x/2$ 
18:  end while
19:   $x \leftarrow m/n$ 
20:  return  $x$       ▷ Vsi izhodni parametri morajo biti opisani nad algoritmom.
21: end function
```

---

urejeni po abecedi) in potem ustrezni slovenski prevod; zaželeno je, da temu sledi tudi opis pojma, lahko komentar ali pojasnilo. Slovarska gesla navajajte z ukazom `\geslo{ }{ }`, npr. `\geslo{continuous}{zvezen}`.

Pri navajanju literature si pomagajte s spodnjimi primeri; najprej je opisano pravilo za vsak tip vira, nato so podani primeri. Člen literature napišete z ukazom `\bibitem{oznaka}` podatki o viru, kjer mora *oznaka* enolično določati vir. Posebej opozarjam, da spletni viri uporabljajo paket url, ki je vključen v .cls datoteki. Polje “ogled” pri spletnih virih je obvezno; če je kak podatek neznan, ustrezno “polje” seveda izpustimo. Literaturo je potrebno urediti po abecednem vrstnem redu; najprej navedemo vse vire z znanimi avtorji (tiskane in spletne) po abecednem redu avtorjev (po priimkih, nato imenih), nato pa spletne vire brez avtorjev, urejene po naslovih strani. Če isti vir navajamo v dveh oblikah, kot tiskani in spletni vir, najprej navedemo tiskani vir, nato pa še podatek o tem, kje je dostopen v elektronski obliki.

## Slovar strokovnih izrazov

**continuous**    zvezen

**uniformly continuous**    enakomerno zvezen

**compact** kompakten – metrični prostor je kompakten, če ima v njem vsako zaporedje stekališče; podmnožica evklidskega prostora je kompaktna natanko tedaj, ko je omejena in zaprta

**glide reflection** zrcalni zdrs ali zrcalni pomik – tip ravninske evklidske izometrije, ki je kompozitum zrcaljenja in translacije vzdolž iste premice

**lattice** mreža

**link** splet

**partition**  $\sim$  of a set razdelitev množice;  $\sim$  of a number razčlenitev števila



## Literatura

- [1] P. Angelini, F. Frati in M. Kaufmann, *Straight-line rectangular drawings of clustered graphs*, Discrete Comput. Geom. **45**(1) (2011) 88–140.
- [2] S. E. Cappell in J. L. Shaneson, *Singularities and immersions*, Annals of Mathematics **105**(3) (1977) 539–552, [ogled 1.1.2023].
- [3] H. Gao, *Extremal graphs with maximum complementary second zagreb index*, AIMS Mathematics **10**(7) (2025) 16105–16116, dostopno na <https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/math.2025721>.
- [4] J. Globevnik in M. Brojan, *Analiza 1*, Matematični rokopisi **25**, DMFA – založništvo, Ljubljana, 2010.
- [5] J. Kališnik in J. Mrčun, *Upodobitev orbiterosti: diplomsko delo : Prešernova nagrada študentom*, J. Kališnik, 2004, dostopno na <https://books.google.si/books?id=yhI8NQAACAAJ>.
- [6] S. Lang, *Fundamentals of differential geometry*, Springer New York, 1999.
- [7] Wikipedia contributors, *Matrix (mathematics)* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, 2022, [ogled 1.1.2023], dostopno na [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Matrix\\_\(mathematics\)&oldid=1128559126](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Matrix_(mathematics)&oldid=1128559126).