

Apuntes Quantum

Lukas Wolff

1. Qubit

Un qubit se puede definir como:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (1)$$

Donde se debe cumplir por probabilidad que:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (2)$$

Ahora bien, se puede tener una superposicion de 2 o mas qubits, por ejemplo:

$$|\psi\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle \quad (3)$$

Por lo tanto, el espacio lineal de n qubits es:

$$|\psi\rangle = \sum \alpha_i |i\rangle \quad (4)$$

1.1. Angulos del qubit

Un qubit se puede representar en una esfera de radio 1, conocida como esfera de Bloch. Para esto, se definen dos angulos θ y ϕ :

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle \quad (5)$$

Donde, recordar que se un numero imaginario $a + bi$, se puede definir como:

$$a + bi = re^{i\phi} \quad \text{con} \quad r = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{y} \quad \phi = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) \quad (6)$$

2. Dual

Sea un qubit base:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (7)$$

El dual de este qubit es:

$$\langle\psi| = (\alpha^* \quad \beta^*) = \alpha^* \langle 0| + \beta^* \langle 1| \quad (8)$$

Donde la notacion $*$ denota el conjugado complejo, es decir, si $\alpha = a + bi$, entonces $\alpha^* = a - bi$. El espacio lineal de los duales es:

$$\langle\psi| = \sum \alpha_i^* \langle i| \quad (9)$$

3. Producto interno escalar o bra-ket

Sea el qubit:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \quad (10)$$

Y el dual:

$$\langle\phi| = (w_1^* \quad w_2^*) \quad (11)$$

El producto interno escalar entre un qubit y un dual es:

$$\langle\phi|\psi\rangle = \sum_i w_i^* v_i = w_1^* v_1 + w_2^* v_2 \quad (12)$$

Donde se cumple que:

$$\langle\phi|\psi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^* \quad (13)$$

Si dos vectores son ortogonales, se cumple que:

$$\langle\phi|\psi\rangle = 0 \quad (14)$$

Y si es un vector consigo mismo, se cumple que:

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1 \quad (15)$$

4. Estados ortogonales

Existen algunos estados que son ortogonales entre si, y conocidos como estados base. Estos son:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (16)$$

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (17)$$

$$|R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad |L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \quad (18)$$

5. Operadores

Los operadores son matrices que actúan sobre los qubits, generando una rotación del estado, o una transformación del mismo. Algunos operadores básicos son:

- Operador identidad:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (19)$$

- Operador X (NOT):

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (20)$$

- Operador Y:

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (21)$$

- Operador Z:

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (22)$$

- Operador Hadamard:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (23)$$