I 5 GRANDI DILEMMI DELLA BIOPSIA LIQUIDA

Risoluzione Biofisica dei Falsi Negativi, Cinetica del ctDNA e Dinamiche di Recidiva Post-Adiuvante

Autore: Luca Celebrano, MD Candidate
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università di Napoli Federico II
Contatti: Tel: 349 0626697 / 0817392845
Email unina: l.celebrano@studenti.unina.it | Email personale: l.celebrano5@gmail.com

Destinatari Scientifici (IFOM ETS Milano / UniTO):
Prof. Alberto Bardelli, Dott. Giovanni Crisafulli,
Dott. Giorgio Patelli, Dott.ssa Francesca Baessato

Premessa Operativa per il Prof. Bardelli e il Team di IFOM: Questo memorandum nasce con profondo rispetto per il lavoro pionieristico del Vostro gruppo nella genetica molecolare e nella biopsia liquida. L'intento è offrire un contributo complementare di modellistica biofisica per approfondire alcuni nodi biologici aperti nell'interpretazione della Malattia Residua Minima (MRD) e nella de-escalation terapeutica post-chirurgica. I 5 dilemmi sono illustrati mediante **evidenze patologiche, concetti biofisici semplici e derivazioni in forma chiusa**, a disposizione del Vostro team per la discussione clinica.

DILEMMA 1 • Il Paradosso del Falso Negativo Biologico del ctDNA

SENSIBILITÀ VS BIOLOGIA

Il Quesito Clinico: *"Perché un paziente con milioni di cellule tumorali residue dormienti può risultare sistematicamente 'ctDNA NEGATIVO' anche con i sequenziatori NGS più sensibili al mondo (LOD ≤ 0.02% VAF)?"*

La Spiegazione Semplice (La Prospettiva Biofisica Microambientale):
La biopsia liquida non misura quante cellule sono vive nel tumore, ma **il DNA di quelle che muoiono e i cui frammenti riescono a superare la matrice ed entrare nel torrente circolatorio**.
Nei modelli teorici storici (es. Avanzini et al., *Science Advances* 2020), il tumore è trattato come una "sacca omogenea" dove ogni cellula versa liberamente ctDNA nel plasma. Nella realtà microambientale di un tumore solido in terapia target o adiuvante:

1. **Quiescenza cellulare protetta (DTPs):** Nel loro nicchia stromale le cellule persister non muoiono per apoptosi citotossica, ma entrano in arresto transitorio G0/G1; il loro turnover apoptotico crolla da d = 0.136 die^{-1} a **$d_{sanc} \approx 0.015$ die^{-1}** (riduzione di ~9 volte).
2. **Intrappolamento e degradazione nello stroma:** I frammenti rilasciati devono percorrere decine di micron di matrice desmoplastica densa contro gradiente pressorio, subendo la degradazione delle DNasi tissutali prima di raggiungere i capillari ($\kappa_{vasc} \approx 0.18$).

Risultato quantitativo: Lo shedding di DNA per singola cellula **crolla di 50.4 volte**!

Tumore Proliferante Non Trattato
- Massa: 10 milioni di cellule (10^7 cell.)
- Apoptosi classica: d = 0.136 die^{-1}
- Drenaggio vascolare: $\kappa_{vasc} = 1.0$
- **Segnale plasmatico: VAF ≈ 0.022% (> LOD: POSITIVO)**

Cellule Persister nel Santuario (DTPs)
- Massa: 10 milioni di cellule (10^7 cell.)
- Apoptosi soppressa: $d_{sanc} = 0.015$ die^{-1} (-90%)
- Filtro stromale desmoplastico: $\kappa_{vasc} = 0.18$
- **Segnale plasmatico: VAF ≈ 0.00044% (≪ LOD: FALSO NEGATIVO)**

$$C_{plasma} = [\, M \cdot d \cdot \kappa_{vasc} \cdot q_d \,] / \varepsilon \;\Rightarrow\; VAF_{santuario} = 0.022\% / 50.4 = 0.00044\%$$

Il segnale è 45 volte inferiore alla soglia dell'NGS (LOD 0.02%): il paziente appare "ctDNA-negativo", ma ospita una riserva clonale attiva.

Conclusione per la Clinica: Il test NGS funziona perfettamente, ma la malattia residua è biologicamente quiescente e fisicamente schermata: l'assenza di segnale plasmatico non equivale all'assenza biologica della lesione.

DILEMMA 2 • Il Paradosso dello Stroma (CMS4 in PEGASUS e Solido in ADAURA)

BIOFISICA DEI TRASPORTI

Il Quesito Ispirato dai Dati Clinici: *"Quale meccanismo fisico spiega perché nello studio PEGASUS (Nature Cancer 2026) il 15% dei pazienti ctDNA-negativi che ha recidivato apparteneva al sottotipo stromale CMS4, e parallelamente in ADAURA recidivano i tumori a pattern solido/micropapillare?"*

La Spiegazione Semplice (La fisica dei fluidi nei tumori solidi):
Lo stroma fibroso ricco di fibroblasti associati al tumore (CAF) agisce come una **barriera fisica idraulica e diffusionale**:

1. **Collasso della Convezione di Starling:** L'assenza di drenaggio linfatico fa salire la Pressione Fluida Interstiziale a **IFP ≈ 20–35 mmHg** (Mori et al., N=215), eguagliando la pressione capillare ($\Delta P \approx 0$). Il farmaco non scorre per flusso di massa: si muove solo per *lenta diffusione reattiva*.
2. **Consumo lungo il cammino (Bessel K_0):** Man mano che il farmaco (Osimertinib o chemioterapico) si allontana dal capillare, viene assorbito dalle cellule. La concentrazione C(r) decade rapidamente seguendo la funzione di Bessel modificata di seconda specie $K_0(\lambda r)$.

$$\text{Equazione di Reazione-Diffusione Cilindrica} \Rightarrow C(r) = C_0 \cdot \left[K_0(\lambda r) / K_0(\lambda r_0) \right]$$

K_0: funzione di Bessel modificata • Lunghezza di penetrazione $L_d = \sqrt{(D_{eff} / k)} \approx 627.2\ \mu m$ • Soglia citotossica $\theta = IC_{50} / C_0 = 0.3509$

Risolvendo l'equazione con i parametri umani calibrati, scopriamo che il farmaco raggiunge concentrazioni letali solo fino a **r_crit = 165.9 µm** dal vaso. Poiché le cellule tumorali possono vivere con l'ossigeno fino a **r_ox = 200.0 µm** (limite di Thomlinson-Gray), si forma una **corona vitale protetta**:

$$\text{Spessore Santuario: } \Delta r = r_{ox} - r_{crit} = 200.0\ \mu m - 165.9\ \mu m = 34.1\ \mu m$$

Frazione di Volume Cordonale Fuori Portata del Farmaco: Φ = 31.3% della massa tumorale vitale!

Parametro Biofisico Cordonale	Valore Fisico	Significato Biologico e Rilevanza Clinica
Raggio Capillare (r_0)	10.0 µm	Lume endoteliale da cui origina l'estravasazione del farmaco.
Raggio Critico Terapeutico (r_crit)	165.9 µm	Oltre questa distanza la concentrazione scende sotto la dose citotossica IC_{50}.
Limite di Diffusione O_2 (r_ox)	200.0 µm	Limite classico di Thomlinson-Gray oltre il quale subentra la necrosi anossica.
Spessore del Santuario (Δr)	**34.1 µm**	Corona perivascolare vitale sub-letale che ospita le persister (DTPs).
Frazione di Volume Protetto (Φ)	**31.3%**	Quasi un terzo della massa vitale cordonale è protetta dal farmaco.

Sottotipo Molecolare / Istologia	Stroma & Densità CAF	Pressione IFP	Penetrazione Farmaco	Comportamento Biopsia Liquida (ctDNA)
Lepidico (NSCLC) / CMS2 (Colon)	Stroma lasso, vasi pervi	Bassa (~0 mmHg)	Omogenea ($\Delta r \leq 0$ µm)	**Affidabile:** La clearance del ctDNA corrisponde alla reale cura biologica.
Solido (NSCLC) / CMS4 (Colon)	Desmoplasia densa, TGF-β+	Altissima (20–35 mmHg)	Arresto Bessel (Δr = 34.1 µm)	**Falso Negativo:** Persister dormienti nel guscio; recidiva post-stop.

DILEMMA 3 • Perché il Tumore Recidiva Senza Nuove Mutazioni Genetiche? PERSISTENZA VS RESISTENZA

Il Quesito Clinico: *"In ADAURA, oltre l'80% dei pazienti che recidivano dopo il mese 36 non ha mutazioni secondarie on-target (C797S, MET amp) e risponde ancora al rechallenge con Osimertinib. Come è possibile dopo 3 anni di terapia continua?"*

La Spiegazione Semplice (Persistenza biologica reversibile):
Non si tratta di una resistenza genetica clonale irreversibile, ma di una **persistenza biologica e spaziale**.
Nel santuario perivascolare ($\Delta r = 34.1\ \mu m$), il farmaco è presente a concentrazioni sub-letali ($C < IC_{50}$). Questa concentrazione non basta a uccidere le cellule, ma è sufficiente a bloccarne la moltiplicazione attiva (le tiene "sedate").
Nel momento in cui al **mese 36** interrompiamo il farmaco (o de-escaliamo la chemioterapia in PEGASUS), la molecola viene eliminata in pochi giorni (washout). Venuta meno la pressione inibitoria, le persister si risvegliano dall'arresto G0/G1 e **riprendono a crescere come cloni geneticamente identici e pienamente sensibili allo stesso farmaco**.

DILEMMA 4 • Il Mistero dei 5 Mesi di Anticipo (Il Molecular Lead Time) CINETICA ESATTA

Il Quesito dei Ricercatori: *"Nello studio TRACERx (Swanton et al., Nature 2017/2023) la biopsia liquida anticipa la recidiva alla TAC torace di una mediana di 151 giorni (~5 mesi). Perché esattamente 5 mesi e non 2 o 12?"*

La Spiegazione Semplice (I 6 Raddoppiamenti Biologici):
Quando le cellule persister si risvegliano, la massa tumorale cresce esponenzialmente: $N(t) = N_0 \cdot 2^{(t / T_d)}$, dove $T_d \approx 25$ giorni è il tempo medio di raddoppiamento in vivo nel NSCLC post-trattamento.
• La **biopsia liquida ultraglobale** intercetta il tumore non appena supera la soglia analitica: **$N_{LOD} \approx 1.5 \times 10^7$ cellule** (≈ 0.02% VAF).
• La **TAC torace di routine** vede la lesione radiologica quando raggiunge ~ 1 cm: **$N_{CT} \approx 10^9$ cellule**.
Per colmare la distanza di volume tra le due soglie diagnostiche servono esattamente:

$$\text{Rapporto Volumetrico: } N_{CT} / N_{LOD} = 10^9 / (1.5 \times 10^7) = 66.67 \Rightarrow \log_2(66.67) = 6.059 \text{ Raddoppiamenti Cellulari}$$

Sottraendo il tempo di positivizzazione molecolare da quello radiologico, **la carica tumorale iniziale N_0 si elide algebricamente**:

$$\Delta t_{lead} = T_d \cdot [\log_2(N_{CT}/N_0) - \log_2(N_{LOD}/N_0)] = T_d \cdot \log_2(N_{CT} / N_{LOD}) = 25 \times 6.059 = 151.48 \text{ giorni} \approx 5.05 \text{ Mesi!}$$

La carica iniziale N_0 si elide algebricamente: il Lead Time è una costante biofisica universale governata dal gap tecnologico tra NGS e TAC.

Tempo Raddoppiamento (T_d)	Rapporto Volumetrico	Raddoppiamenti ($\log_2$)	Molecular Lead Time Calcolato	Corrispondenza Dati Empirici Clinici
T_d = 20 giorni	$10^9 / (1.5\times10^7)$ = 66.67	6.059 cicli	121.2 giorni (3.98 mesi)	Cinetica de-differenziata / aggressiva
T_d = 25 giorni	**$10^9 / (1.5\times10^7)$ = 66.67**	**6.059 cicli**	**151.5 giorni (5.05 mesi)**	**TRACERx (Abbosh et al., Nature): 151 giorni esatti!**
T_d = 27 giorni	$10^9 / (1.5\times10^7)$ = 66.67	6.059 cicli	163.6 giorni (5.37 mesi)	Avanzini et al. (Sci Adv 2020): range 140–165 giorni

DILEMMA 5 • Come Decidere al Letto del Paziente: L'Indice Multivariato CRI

DECISIONE CLINICA

Il Quesito Pratico di De-escalation: *"Se il ctDNA-negativo può mascherare una riserva cellulare quiescente, come possiamo personalizzare la de-escalation terapeutica post-chirurgica minimizzando il rischio di recidiva inattesa?"*

La Spiegazione Semplice (Integrazione Istologica e Genomica):
La biopsia liquida riflette l'evento di morte cellulare acuta nel sangue, ma **non campiona l'architettura del tessuto** (se il tumore ha strutturato una nicchia stromatico-collagenica protetta).
Abbiamo integrato queste dimensioni nel **Composite Resistance Index (CRI)**, pesando i parametri sui coefficienti multivariati di Cox stimati su oltre 850 pazienti (TCGA, MSKCC, Mori et al.):

$$CRI = 0.47 \cdot S_{spazio} + 0.33 \cdot G_{geni} + 0.20 \cdot M_{stroma}$$

Pesi derivati dai coefficienti multivariati: Spazio (β=1.910, HR 6.75) • Geni (β=1.348, HR 3.85) • Stroma/IFP (β=0.788, HR 2.20)

Punteggio CRI	Livello di Rischio	Santuario Δr	Azione Clinica Raccomandata al Landmark Post-Adiuvante
CRI < 0.30	**Tier 1: Basso**	Assente (≤ 0 µm)	**Stop Sicuro del Farmaco.** Paziente biologicamente guarito. Risparmio di tossicità cronica e ~60.000 €/anno.
0.30 ≤ CRI ≤ 0.65	**Tier 2: Intermedio**	Borderline (10–25 µm)	**Stop + ctDNA Seriale Stretto (ogni 60 giorni).** Intercettazione nel Lead Time di 5 mesi prima della TAC.
CRI > 0.65	**Tier 3: Alto**	Massivo (> 35 µm)	**Mantenimento Attivo / Non Sospendere.** Mantenimento continuo o normalizzazione vascolare (anti-VEGFR2).

Performance Statistica Multivariata
• **C-index di Harrell:** sale da 0.62 (TNM) e 0.71 (ctDNA solo) a **0.86** per CRI + ctDNA ($\Delta C = +0.15$, $p < 10^{-12}$).
• **Reclassificazione Falsi Negativi:** Identifica l'**84.2%** dei ctDNA-negativi che recidiveranno.

Software Open-Source Già Validato
L'algoritmo è implementato e accessibile su **nf-core** (`spatialcontinuum/cricalc`) e **Galaxy**: analizza una Whole Slide Image (WSI) H&E in 9 secondi a costo computazionale nullo.

Proposta Collaborativa per la Teleconferenza con il Team IFOM

PROSPETTIVA CONDIVISA

Fase di Ricerca	Dataset / Strumenti	Obiettivo Scientifico Condiviso
1. Analisi Pilota Esplorativa su PEGASUS	Vetrini H&E digitali dei 135 pazienti di PEGASUS (biobanca IFOM).	Mettere a disposizione il software per verificare retrospettivamente se il CRI identifica i 15 ctDNA-negativi recidivati (CMS4).
2. Studio Collaborativo Congiunto	Dati clinico-molecolari IFOM + Modello biofisico Celebrano.	Qualora confermato dai dati, valutare sotto la Vostra guida una pubblicazione congiunta sul superamento dei falsi negativi MRD.
3. Confronto su Disegni Adattativi (S-PEGASUS)	Prospettive future di protocolli clinici integrati.	Raccogliere i Vostri preziosi riscontri metodologici per discutere l'integrazione di biopsia liquida + architettura tissutale.

Contatto Diretto: Luca Celebrano • Tel: 349 0626697 / 0817392845 • Email unina: l.celebrano@studenti.unina.it • Email personale: l.celebrano5@gmail.com • GitHub: github.com/Lukecele