
Omgånsrikt problem: Mätning med märkning

Lukas Anderson

Maj 2023

1 Problemförklaring

Ett företag ska designa en serie nya skålar. En av skålarna ska ha en cirkulär bottenyta med radien med radien 7 cm och en cirkulär öppning med radien 12 cm. Skålens höjd ska vara 13 cm och dess ytterkant sedd från sidan ska kunna approximeras med kurvan $y = kx^2 - m$ som visas i Figur 1.



Figur 1: Skålens utseende

Uppgifter

- Bestäm skålens volym med hjälp av skivmetoden.
- Designa två liknande skålar vars respektive volym är 3 liter.
- Eftersom skålarna är tänkta att användas vid bakning, så vill företaget att man på insidan av skålen ska kunna läsa av volymen. En av dina treliters-skålar ska ha sådana märkningar för varje liter. Bestäm på vilka höjder dessa märkningar ska sitta.
- Ta reda på hur man anvönder integraler för att beräkna volym med hjälp av *skalmetoden*.Redogör för hur metoden fungerar och lista ut hur du kan använda den för att beräkna volymen av någon av skålarna ovan. Beräkna också den volymen.
- Du behärskar nu två olika metoder för att beräkna volymen av en rotationskropp: *skivmetoden* och *skalmetoden*. Diskutera metodernas föroch nackdelar.

2 Uppgift 1

Bestäm skålens volym med hjälp av skivmetoden.

Formeln för skivmetoden är $V = \pi \int_0^{13} g(y)^2 dy$ Där funktionen g(y) är f(x) uttryckt som en funktion av y.

För att finna g(y) identifierar vi först funktionen f(x) = y som beskriver skålens form och kan beskrivas som $y = kx^2 - m$. Att skålen har radien 7 cm innebär att f(x) har rötterna (7,0)(-7,0) För att finna k och m löser ställer vi upp följande ekvation:

$$kx^{2} - m = k(x - 7)(x + 7)$$
$$kx^{2} - m = k(x^{2} - 49)$$
$$kx^{2} - m = kx^{2} - 49k$$
$$m = 49k$$

Vilket ger oss att m = 49k och att $f(x) = y = kx^2 - 49k$.

För att finna k löser vi följande ekvation:

$$f(12) = 13$$

$$13 = k(12)^{2} - 49k$$


$$13 = 144k - 49k$$

$$13 = 95k$$

$$k = \frac{13}{95}$$

Vilket ger oss att $k = \frac{13}{95}$ och att $f(x) = y = \frac{13}{95}x^2 - \frac{637}{95}$.

Detta visas i Figur 2.



Figur 2: Skålens utseende med f(x) uttryckt som en funktion

Med $f(x) = \frac{13}{95}x^2 - \frac{637}{95}$ kan vi räkna ut $g(y)^2$ då g(y) = x och f(x) = y:

$$\frac{13}{95}x^2 - \frac{637}{95} = y$$

$$\frac{13}{95}x^2 = y + \frac{637}{95}$$

$$x^2 = \frac{y + \frac{637}{95}}{\frac{13}{95}}$$

$$g(y)^2 = \frac{y + \frac{637}{95}}{\frac{13}{95}}$$

$$g(y)^2 = \frac{95y + 637}{13}$$

Vilket ger oss att $g(y)^2 = \frac{95y+637}{13}$. För att räkna ut volymen med formeln $V = \pi \int_0^{13} g(y)^2 dy$ måste vi först bestämma den primitiva funktionen H(y) till funktionen $h(y) = g(y)^2 = \frac{95y+637}{13}$.

$$h(y) = \frac{95y + 637}{13}$$

$$h(y) = \frac{95}{13}y + \frac{637}{13} \Rightarrow H(y) = \frac{95/13}{2}y^2 + \frac{637}{13}y + C$$

$$H(y) = \frac{95}{26}y^2 + \frac{637}{13}y + C$$

Vilket ger oss att $H(y) = \frac{95}{26}y^2 + \frac{637}{13}y + C$.

Vi kan nu skriva om formeln $V = \pi \int_0^{13} g(y)^2 dy$:

$$V = \pi \int_0^{13} g(y)^2 dy$$

$$V = \pi \int_0^{13} h(y) dy$$

$$V = \pi \int_0^{13} h(y) dy \Rightarrow V = \pi [H(y)]_0^{13}$$

$$V = \pi [H(y)]_0^{13} = \pi \left(\frac{95}{26}(13)^2 + \frac{637}{13}(13) - \frac{95}{26}(0)^2 - \frac{637}{13}(0)\right)$$

$$V = \pi \left(\frac{95}{26}(13)^2 + \frac{637}{13}(13)\right)$$

$$V = \pi \left(\frac{95}{26}(169) + \frac{637}{13}(13)\right)$$

$$V = \pi \left(\frac{16055}{26} + \frac{8271}{13}\right)$$

$$V = \frac{16055\pi}{26} + \frac{8271\pi}{13}$$

$$V \approx 3938.7 \text{ cm}^3$$

Skalmetoden get oss att skålen har volymen $V \approx 3938.7 \text{ cm}^3$.

3 Uppgift 2

Designa två liknande skålar vars respektive volym är 3 liter.

För att designa två liknande skålar vars respektive volym är 3 liter använder vi processen för uppgift 1 omvänd. Vi börjar med att ställa upp en ekvation för volymen av skålen, V som i detta fall är 3 liter eller 3000 cm³:

$$V = 3000$$

$$V = \pi \int_0^{13} g(y)^2 dy$$

$$3000 = \pi \int_0^{13} g(y)^2 dy$$