


# Omfångsrikt problem: Mätning med märkning

Lukas Anderson

Maj 2023

## Problemförklaring

Ett företag ska designa en serie nya skålar. En av skålarna ska ha en cirkulär bottenyta med radien 7 cm och en cirkulär öppning med radien 12 cm. Skålens höjd ska vara 13 cm och dess ytterkant sedd från sidan ska kunna approximeras med kurvan  $y = kx^2 - m$  som visas i Figur 1.



Figur 1: Skålens utseende

## Uppgifter

- Bestäm skålens volym med hjälp av *skivmetoden*.
- Designa två liknande skålar vars respektive volym är 3 liter.
- Eftersom skålarna är tänkta att användas vid bakning, så vill företaget att man på insidan av skålen ska kunna läsa av volymen. En av dina treliters-skålar ska ha sådana märkningar för varje liter. Bestäm på vilka höjder dessa märkningar ska sitta.
- Ta reda på hur man använder integraler för att beräkna volym med hjälp av *skalmetoden*. Redogör för hur metoden fungerar och lista ut hur du kan använda den för att beräkna volymen av någon av skålarna ovan. Beräkna också den volymen.
- Du behärskar nu två olika metoder för att beräkna volymen av en rotationskropp: *skivmetoden* och *skalmetoden*. Diskutera metodernas för- och nackdelar.

## Uppgift 1

### Bestäm skålens volym med hjälp av *skivmetoden*.

Formeln för skivmetoden är  $V = \pi \int_0^{13} g(y)^2 dy$  Där funktionen  $g(y)$  är  $f(x)$  uttryckt som en funktion av  $y$ .

För att finna  $g(y)$  identifierar vi först funktionen  $f(x) = y$  som beskriver skålens form och kan beskrivas som  $y = kx^2 - m$ . Att skålen har radien 7 cm innebär att  $f(x)$  har rötterna  $(7, 0)(-7, 0)$  För att finna  $k$  och  $m$  löser ställer vi upp följande ekvation:

$$kx^2 - m = k(x - 7)(x + 7)$$

$$kx^2 - m = k(x^2 - 49)$$

$$kx^2 - m = kx^2 - 49k$$

$$m = 49k$$

Vilket ger oss att  $m = 49k$  och att  $f(x) = y = kx^2 - 49k$ .

För att finna  $k$  löser vi följande ekvation:

$$f(12) = 13$$

$$13 = k(12)^2 - 49k$$


$$13 = 144k - 49k$$

$$13 = 95k$$

$$k = \frac{13}{95}$$

Vilket ger oss att  $k = \frac{13}{95}$  och att  $f(x) = y = \frac{13}{95}x^2 - \frac{637}{95}$ .

Detta visas i Figur 2.



Figur 2: Skålens utseende med  $f(x)$  uttryckt som en funktion

Med  $f(x) = \frac{13}{95}x^2 - \frac{637}{95}$  kan vi räkna ut  $g(y)^2$  då  $g(y) = x$  och  $f(x) = y$ :

$$\begin{aligned}\frac{13}{95}x^2 - \frac{637}{95} &= y \\ \frac{13}{95}x^2 &= y + \frac{637}{95} \\ x^2 &= \frac{y + \frac{637}{95}}{\frac{13}{95}} \\ g(y)^2 &= \frac{y + \frac{637}{95}}{\frac{13}{95}} \\ g(y)^2 &= \frac{95y + 637}{13}\end{aligned}$$

Detta ger oss att  $g(y)^2 = \frac{95y+637}{13}$ . För att räkna ut volymen med formeln  $V = \pi \int_0^{13} g(y)^2 dy$  måste vi först bestämma den primitiva funktionen  $H(y)$  till funktionen  $h(y) = g(y)^2 = \frac{95y+637}{13}$ .

$$\begin{aligned}h(y) &= \frac{95y + 637}{13} \\ h(y) &= \frac{95}{13}y + \frac{637}{13} \Rightarrow H(y) = \frac{95/13}{2}y^2 + \frac{637}{13}y + C \\ H(y) &= \frac{95}{26}y^2 + \frac{637}{13}y + C\end{aligned}$$

Detta ger oss att  $H(y) = \frac{95}{26}y^2 + \frac{637}{13}y + C$ .

Vi kan nu skriva om formeln  $V = \pi \int_0^{13} g(y)^2 dy$ :

$$V = \pi \int_0^{13} g(y)^2 dy$$

$$V = \pi \int_0^{13} h(y) dy$$

$$V = \pi \int_0^{13} h(y) dy \Rightarrow V = \pi [H(y)]_0^{13}$$

$$V = \pi [H(y)]_0^{13} = \pi \left( \frac{95}{26}(13)^2 + \frac{637}{13}(13) - \frac{95}{26}(0)^2 - \frac{637}{13}(0) \right)$$

$$V = \pi \left( \frac{95}{26}(13)^2 + \frac{637}{13}(13) \right)$$

$$V = \pi \left( \frac{95}{26}(169) + \frac{637}{13}(13) \right)$$

$$V = \pi \left( \frac{16055}{26} + \frac{8271}{13} \right)$$

$$V = \frac{16055\pi}{26} + \frac{8271\pi}{13}$$

$$V \approx 3938.7 \text{ cm}^3$$

Skivmetoden ger oss att skålen har volymen  $V \approx 3938.7 \text{ cm}^3$ .


## Uppgift 2

**Designa två liknande skålar vars respektive volym är 3 liter.**


För att designa två liknande skålar vars respektive volym är 3 liter börjar med att bestämma radien av skålens bottenyta. För den första skålen Skål 1, bestämmer jag att radien ska vara 4 cm. För den andra skålen Skål 2, bestämmer jag att radiens ska vara 6 cm.

### Skål 1:

För att bestämma skålens form börjar jag med att bestämma funktionen  $f(x)$  som beskriver skålens form. Jag bestämmer att skålen ska ha en bottenyta med radien 4 cm. Detta innebär att  $f(x)$  har rötterna  $(4, 0)(-4, 0)$  och att  $f(x) = k(x - 4)(x + 4)$ .  $k$  i funktionen bestämmer hur aggressiv lutningen är på skålens sidor. Sambandet mellan  $k$  och skålens form visas i Figur 3a och 3b.



Figur 3a: Skålens form uttryckt som  $f(x)$  då  $k$  går från 0.01 till 0.3.



Figur 3b: Skålens form uttryckt som  $f(x)$  då  $k$  går från 0.01 till 0.3.

Jag bestämmer att  $k = 0.1$  vilket ger  $f(x) = 0.1(x - 4)(x + 4)$ .


Funktionen  $f(x)$  kan då skrivas i formen  $kx^2 - m$ :

$$f(x) = 0.1(x - 4)(x + 4)$$

$$f(x) = 0.1(x^2 - 16)$$

$$f(x) = 0.1x^2 - 1.6$$

Detta ger oss att  $f(x) = 0.1x^2 - 1.6$  som visas i Figur 4.



Figur 4: Skålens utseende med  $f(x)$  uttryckt som en funktion

Då vi har funktionen  $f(x)$  kan vi räkna ut  $g(y)^2$  då  $g(y) = x$  och  $f(x) = y$ :

$$\begin{aligned} 0.1x^2 - 1.6 &= y \\ 0.1x^2 &= y + 1.6 \\ x^2 &= \frac{y + 1.6}{0.1} \\ g(y)^2 &= \frac{y + 1.6}{0.1} \\ g(y)^2 &= 10y + 16 \end{aligned}$$

Detta ger oss att  $g(y)^2 = 10y + 16$ . Vi bestämmer att funktionen  $h(y) = g(y)^2$  och söker nu den primitiva funktionen  $H(y)$  till  $h(y)$ . Vi finner  $H(y)$ :

$$\begin{aligned} h(y) &= 10y + 16 \Rightarrow H(y) = 5y^2 + 16y + C \\ H(y) &= 5y^2 + 16y + C \end{aligned}$$

Detta ger oss att  $H(y) = 5y^2 + 16y + C$ .

Vi kan nu skriva om formeln  $V = \pi \int_0^l g(y)^2 dy$  där  $l$  är skålens höjd och



volymen  $V$  är  $3000 \text{ cm}^3$ :

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^l g(y)^2 dy \\ 3000 &= \pi \int_0^l h(y) dy \\ 3000 &= \pi \int_0^l h(y) dy \Rightarrow 3000 = \pi [H(y)]_0^l \\ 3000 &= \pi (5l^2 + 16l - 5(0)^2 - 16(0)) \\ 3000 &= \pi (5l^2 + 16l) \end{aligned}$$

Detta ger oss andragradsekvationen  $3000 = \pi (5l^2 + 16l)$ . Denna löser vi för  $l$  med hjälp av PQ-formeln:

$$\begin{aligned} 3000 &= \pi (5l^2 + 16l) \\ 0 &= 5\pi l^2 + 16\pi l - 3000 \\ 0 &= 5l^2 + 16l - \frac{3000}{\pi} \\ 0 &= l^2 + \frac{16}{5}l - \frac{3000}{\pi 5} \\ 0 &= l^2 + \frac{16}{5}l - \frac{600}{\pi} \\ l &= -\frac{\frac{16}{5}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\frac{16}{5}}{2}\right)^2 + \left(\frac{600}{\pi}\right)} \\ l &= -\frac{8}{5} \pm \sqrt{\left(\frac{8}{5}\right)^2 + \left(\frac{600}{\pi}\right)} \\ l &= -\frac{8}{5} \pm \sqrt{\frac{64\pi + 15000}{25\pi}} \\ l_1 &\approx 12.3 \text{ cm} \\ l_2 &\approx -15.5 \text{ cm} \end{aligned}$$

Detta ger att  $l_1 \approx 12.3 \text{ cm}$  och  $l_2 \approx -15.5 \text{ cm}$ . Då  $l$  är skålens höjd kan vi förkasta  $l_2$  då den är negativ. Detta ger oss att höjden  $l \approx 12.3 \text{ cm}$ .

Skål 1 har då en bottenyta med radien 4 cm, en höjd på 12.3 cm samt en volym på 3 liter.

### **Skål 2:**

Vi följer samma process för denna skål. Vi börjar med att bestämma att bottenytan har en radie på 8 cm. Detta ger oss att  $f(x)$  har rötterna  $(8, 0)(-8, 0)$  och att  $f(x) = k(x - 8)(x + 8)$ .  $k$  bestämmer vi är 0.2 vilket ger  $f(x) = 0.2(x - 8)(x + 8)$ . Denna funktion kan skrivas om till  $f(x) = 0.2x^2 - 6.4$  som visas i Figur 5.