

Анализ и применение многофакторных моделей динамики лекарственных средств в медицинских исследованиях

Лазар Владислав Игоревич

Кафедра математической статистики

e-mail: vlad.lazar.ik528@yandex.ru

Научный руководитель — к.ф.-м.н. доц. Захарова Татьяна Валерьевна

Научный консультант — д.ф.-м.н. проф. Ефимов Иван Влеревич

В работе рассматривается задача проверки лекарственных препаратов на биоэквивалентность. Исследования биоэквивалентности лежат в основе воспроизведения лекарственных препаратов, подтвердивших свою эффективность и безопасность. Основным методом проверки гипотезы биоэквивалентности является процедура двух односторонних тестов Шуирманна. Она используется в течение многих лет и подтвердила свою пригодность для доказательства эквивалентной биодоступности.

В исследованиях биоэквивалентности одной из используемых сравнительных характеристик лекарств является площадь под кривой (AUC) «концентрация—время». Основной проблемой классического критерия является нечувствительность к форме этой кривой, что может влечь за собой некорректную оценку действия воспроизведенного лекарства.

Авторами предложен новый подход в оценке параметров исследуемых лекарств. В качестве основы берётся оценка траектории с помощью математической модели **PBFTPK**, описанной в статье (). В оригинальной статье предлагается оценка параметров модели по конечному числу наблюдений методом минимизации среднеквадратичной функции потерь. В работе представлены модификации оригинальной модели устойчивые к проблемам возникающим в реальных данных - неравномерности наблюдений по времени и наличию более одного пика траектории. Неоднородность наблюдений влечёт за собой уменьшение значимости более редких наблюдений и как следствие худшее качество модели на соответствующих участках. В случае многих пиков классические алгоритмы рассматривают побочные пики как шум в данных, вследствие чего теряется важная для пролонгированных форм информация о действии лекарства.

На начальном этапе исследований проводилась оценка траектории с помощью оригинальной модели. Методом последовательного квадратичного программирования (**SLSQP**) проводилась оценка параметров следующей параметризованной функции:

$$\begin{cases} C(t) = \frac{FD}{V_d} \frac{e^{-k_{el}t} - e^{-k_a t}}{k_a - k_{el}}, & 0 \leq t \leq \tau, \\ C(t) = C(\tau)e^{-k_{el}(t-\tau)}, & \tau < t < +\infty \end{cases}$$

Для дальнейшей работы важно выделить два этапа - этап абсорбции ($t \leq \tau$) и этап элиминации ($t > \tau$).

Для устранения первой проблемы авторами предложен метод взвешивания функции потерь в соответствии с фазой действия лекарственного вещества. Для этого рассматривается λ -взвешенная среднеквадратичная функции потерь ($\mathbf{WMSE}_\lambda$):

$$L_\lambda(t, C, \hat{C}) = \frac{1}{\#(t)} \sum_{t_i \in t} \left(C(t_i) - \hat{C}(t_i) \right)^2 \cdot \begin{cases} 1, & t_i \leq \tau \\ \lambda, & t_i > \tau \end{cases}$$

Такой метод взвешивания объясняется особенностями используемых данных, а конкретно – малой длительностью фазы абсорбции относительно фазы элиминации и большей плотностью наблюдений именно на этапе абсорбции.




Рис. 1: Пример данных для исследования

Для сохранения информации о множественных пиках траектории был предложен метод ансамблирования математических моделей. Под ансамблированием понимается следующий алгоритм действий:

1. Задаётся размер ансамбля - количество базовых моделей.
2. На вход первой модели для оценивания подаются данные.
3. Вычисляется разность оценивания и исходных данных, такую разность будем называть **остатком**.
4. Полученный остаток подаётся на вход следующей модели в ансамбле, после чего процесс повторяется начиная с пункта 2.

Помимо повышения точности оценивания (оценивание остатка модели вместо его отбрасывания) полученный алгоритм не теряет физической интерпретируемости. В данном случае каждую модель в ансамбле можно рассматривать

как отдельную независимо действующую фракцию исходного вещества. Тогда полная оценка траектории получается как сумма оценок всех моделей в ансамбле, то есть концентрация вещества в крови есть сумма концентраций его частей, что соотносится с физическим смыслом исследуемого явления.