Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Escuela de Ingeniería y Ciencias

Título Completo del Reporte

Angel E. Luna
Ing. Ciencias de datos y Matematicas
a00842657@tec.mx

Fulano Rodriguez
Ing. Tecnologias Computacionales
a00000002@tec.mx

Nombre Autor Tres
IMT
a00000003@tec.mx

Nombre Autor Cuatro
a0000004@tec.mx

Nombre Autor Cinco
a0000005@tec.mx

MA1234 — Nombre del Curso | Nombre del Profesor

Campus

Documento compuesto en LaTeX.

3 de abril de 2026

Resumen

En este reporte se estudian las propiedades analíticas fundamentales de las funciones reales, con énfasis en la noción de límite, continuidad y diferenciabilidad. Se presentan las definiciones formales en el marco de la topología estándar de $\mathbb{R}$, junto con los resultados principales que garantizan la unicidad del límite y su compatibilidad con las operaciones algebraicas elementales. Los métodos numéricos de cuadratura sirven como motivación aplicada para evaluar la precisión de las aproximaciones obtenidas. Los resultados confirman que la regla del trapecio compuesta alcanza un error de orden $\mathcal{O}(h^2)$, en concordancia con la teoría clásica de integración numérica.

Índice

1. Introducción **3**

2. Marco Teórico **3**

2.1. Límites y continuidad 3

2.2. Diferenciabilidad y suavidad 5

2.3. Ejemplos y observaciones 5

3. Resultados **6**

3.1. Fórmula del trapecio y estimación del error 6

3.2. Regla compuesta y convergencia 6

3.3. Resultados numéricos 7

4. Conclusiones **7**

Referencias **8**

1. Introducción

El análisis matemático constituye el fundamento sobre el cual se construyen buena parte de las herramientas de la ciencia aplicada y la ingeniería. En particular, los conceptos de límite y continuidad permiten formalizar la intuición de proximidad y comportamiento local de funciones, dotando de rigor a procedimientos que de otro modo solo podrían justificarse heurísticamente [1].

La motivación central de este trabajo es el estudio de funciones $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ bajo condiciones de regularidad progresivamente más fuertes: primero acotación local, luego continuidad y finalmente diferenciabilidad. Este enfoque estratificado permite identificar con precisión qué propiedades adicionales se ganan al imponer cada condición, y es consistente con la metodología empleada en trabajos previos sobre análisis real [2, 3].

Como aplicación directa, se evalúa la regla del trapecio como método de integración numérica para $f \in C^2([a,b])$. El error de aproximación se controla mediante el segundo momento de la segunda derivada de f, y los experimentos numéricos presentados en la cuadro 1 confirman la tasa de convergencia teórica. A lo largo del documento se utiliza la notación estándar: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ denotan los conjuntos de números naturales, enteros, racionales, reales y complejos, respectivamente.

El documento se organiza del siguiente modo. La apartado 2 establece las definiciones y resultados teóricos necesarios. La apartado 3 presenta los experimentos numéricos y el análisis de error. Finalmente, la apartado 4 resume las conclusiones y propone líneas de investigación futura.

2. Marco Teórico

Esta sección recoge las definiciones y resultados que fundamentan el análisis posterior. Se parte de la definición épsilon-delta del límite y se deducen las propiedades de continuidad y derivabilidad que se utilizarán en los cálculos de error de cuadratura.

2.1. Límites y continuidad

Definición 2.1 — (Límite de una función).

Sea $f\colon A \to \mathbb{R}$ con $A \subseteq \mathbb{R}$, y sea a un punto de acumulación de A. Decimos que $L \in \mathbb{R}$ es el *límite* de f en a, y escribimos $\lim_{x\to a} f(x) = L$, si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

La siguiente propiedad es elemental pero estratégica: garantiza que toda función con límite finito queda localmente acotada, hecho que se invocará de manera recurrente en las demostraciones de la sección siguiente.

Lema 2.1 — (Acotación local).

Sea $\lim_{x\to a} f(x) = L$. Entonces existe $\delta > 0$ tal que f está acotada en $(a-\delta,\, a+\delta) \setminus \{a\}$.

Demostración. Tomando $\varepsilon = 1$ en la definición de límite, existe $\delta > 0$ con $|f(x) - L| < 1$ siempre que $0 < |x-a| < \delta$. Por la desigualdad triangular,

$$|f(x)| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|,$$

de modo que f queda acotada por $1 + |L|$ en dicho intervalo. □

Teorema 2.2 — (Unicidad del límite).

Si $\lim_{x\to a} f(x) = L$ y $\lim_{x\to a} f(x) = M$, entonces $L = M$.

Demostración. Supóngase que $L \neq M$ y sea $\varepsilon = \frac{|L-M|}{2} > 0$. Por hipótesis existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que

$$\begin{aligned} 0 < |x-a| < \delta_1 &\implies |f(x) - L| < \varepsilon, \\ 0 < |x-a| < \delta_2 &\implies |f(x) - M| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Para $0 < |x-a| < \delta := \min(\delta_1, \delta_2)$, la desigualdad triangular da

$$|L - M| \leq |f(x) - L| + |f(x) - M| < 2\varepsilon = |L - M|,$$

una contradicción. Luego $L = M$. □

Corolario 2.3.

El límite de una función, cuando existe, es único. En consecuencia, la notación $\lim_{x\to a} f(x) = L$ está bien definida (véase el teorema 2.2).

Definición 2.2 — (Continuidad puntual).

Una función $f\colon A \to \mathbb{R}$ es *continua en* $a \in A$ si

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a),$$

es decir, para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|x-a| < \delta$ implica $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Si f es continua en todo punto de A, se escribe $f \in C(A)$.

2.2. Diferenciabilidad y suavidad

Definición 2.3 — (Derivada).

Sea $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ y $x_0 \in (a,b)$. La *derivada* de f en x_0 es el límite

$$f'(x_0) := \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h},$$

siempre que exista y sea finito. Decimos que f es diferenciable en x_0 si dicho límite existe.

Proposición 2.4 — (Diferenciabilidad implica continuidad).

Si f es diferenciable en x_0, entonces f es continua en x_0.

Demostración. Escribimos $f(x_0+h)-f(x_0) = h \cdot \dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$. Tomando límite cuando $h \to 0$,

$$\lim_{h\to 0}\big[f(x_0+h)-f(x_0)\big] = \lim_{h\to 0} h \cdot f'(x_0) = 0,$$

lo que prueba la continuidad. □

Proposición 2.5 — (Desigualdad triangular en $\mathbb{R}^n$).

Para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$ se tiene

$$\|x+y\| \le \|x\| + \|y\|.$$

Demostración. Se sigue directamente de la identidad de polarización y la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2 \le \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = \big(\|x\| + \|y\|\big)^2. \qquad \square$$

2.3. Ejemplos y observaciones

Ejemplo 2.1 — (Cálculo directo de un límite).

Calcular $\lim\limits_{x\to 2}(3x^2-1)$.

Dado $\varepsilon > 0$, se busca $\delta > 0$ tal que $|x-2| < \delta$ implique $|(3x^2-1)-11| < \varepsilon$. Observar que

$$|3x^2-12| = 3|x^2-4| = 3|x-2||x+2|.$$

Si $|x-2| < 1$, entonces $|x+2| < 5$, luego $|3x^2-12| < 15|x-2|$. Basta tomar $\delta = \min\big(1, \frac{\varepsilon}{15}\big)$.

Observación 2.1 — (Continuidad de polinomios).

Todo polinomio $p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continuo en $\mathbb{R}$, pues el argumento del ejemplo 2.1 se generaliza por inducción al grado del polinomio. Asimismo, toda función racional es continua en su dominio natural.

Ejercicio 2.1 — (Para el lector).

Sea $f, g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con $\lim_{x\to a} f(x) = L$ y $\lim_{x\to a} g(x) = M$. Demostrar que

$$\lim_{x\to a}\big[f(x) + g(x)\big] = L + M.$$

Sugerencia: usar el teorema 2.1 para controlar cada término por separado.

3. Resultados

3.1. Fórmula del trapecio y estimación del error

Sea $f \in C^2([a,b])$. La regla del trapecio aproxima la integral definida mediante la interpolación lineal de f en los extremos del intervalo. La siguiente identidad cuantifica el error exacto de dicha aproximación.

$$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{b-a}{2}\big[f(a) + f(b)\big] - \frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi) \tag{1}$$

para algún $\xi \in (a,b)$ (regla del trapecio con término de error exacto de Hermite). El desarrollo completo de la demostración es:

$$\begin{aligned}
\int_a^b f(x)\,dx &= \int_a^b \Big[f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\xi_x)}{2}(x-a)^2\Big]dx \\
&= f(a)(b-a) + \frac{f'(a)(b-a)^2}{2} + \frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi_x)(x-a)^2\,dx \\
&= \frac{b-a}{2}\big[f(a) + f(b)\big] - \frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi).
\end{aligned} \tag{2}$$

3.2. Regla compuesta y convergencia

Para la regla del trapecio compuesta con n subintervalos de longitud $h = (b-a)/n$, el error total satisface la cota

$$E_n(f) := \left|\int_a^b f(x)\,dx - T_n(f)\right| \le \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max_{\xi\in[a,b]} |f''(\xi)|, \tag{3}$$

donde $T_n(f) = h\left[\dfrac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(a+kh)\right]$ es la suma de trapecios. La ecuación (3) muestra que el error decae como $\mathcal{O}(h^2) = \mathcal{O}(n^{-2})$, lo que clasifica al método como de orden dos.

Adicionalmente, la siguiente identidad de Euler-Maclaurin relaciona la suma discreta con la integral continua mediante correcciones de orden superior:

$$\sum_{k=0}^{n}{}'' f(a+kh) = \frac{1}{h}\int_a^b f(x)\,dx + \sum_{j=1}^{p} \frac{B_{2j}}{(2j)!}\, h^{2j-1}\left[f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a)\right] + R_p, \tag{4}$$

donde B_{2j} son los números de Bernoulli, las comillas dobles en la suma indican que los términos extremos se toman con peso 1/2, y $R_p = \mathcal{O}(h^{2p})$ es el término de resto.

3.3. Resultados numéricos

La cuadro 1 resume los errores obtenidos al aplicar la regla del trapecio simple y compuesta ($n = 4$ subintervalos) a $f(x) = \operatorname{sen}(x)$ en distintos intervalos.

Cuadro 1: Error de la regla del trapecio para $f(x) = \operatorname{sen}(x)$. La columna E_{comp} corresponde a $n = 4$ subintervalos.

Intervalo $[a, b]$	Valor exacto	T_1 (simple)	E_1	E_{comp}
$[0,\ \pi/2]$	1.000000	0.785398	2.15×10^{-1}	1.34×10^{-2}
$[0,\ \pi/4]$	0.292893	0.277785	1.51×10^{-2}	9.48×10^{-4}
$[0,\ \pi/8]$	0.076120	0.075566	5.54×10^{-4}	3.46×10^{-5}
$[0,\ \pi/16]$	0.019122	0.019087	3.51×10^{-5}	2.19×10^{-6}

Los resultados de la cuadro 1 son consistentes con la cota teórica de la ecuación (3): al reducir el paso h a la mitad, el error E_{comp} disminuye aproximadamente en un factor de cuatro, confirmando la convergencia de orden dos.

4. Conclusiones

En este reporte se estudiaron las propiedades fundamentales del límite de funciones reales —incluyendo su unicidad (teorema 2.2) y su comportamiento bajo operaciones algebraicas— y se demostró que la diferenciabilidad es una condición más fuerte que la continuidad (teorema 2.4). Los resultados numéricos de la cuadro 1 confirman que la regla del trapecio compuesta con n subintervalos produce un error de orden $\mathcal{O}(n^{-2})$, en acuerdo con la estimación analítica de la ecuación (3).

Las implicaciones de estos resultados son relevantes para el diseño de algoritmos de cuadratura adaptativa: la rapidez de convergencia cuadrática hace al método del trapecio competitivo en problemas donde f'' es uniformemente pequeña, mientras que métodos de mayor orden (e.g., Simpson, cuadratura gaussiana) son preferibles cuando f admite muchas derivadas. Como trabajo futuro se

propone extender el análisis al caso multidimensional mediante la fórmula de Stokes y estudiar la estabilidad numérica de las correcciones de Euler-Maclaurin en presencia de singularidades de borde.

Referencias

Referencias

---

[1] Rudin, W. (1976). *Principles of Mathematical Analysis* (3rd ed.). McGraw-Hill.

[2] Apostol, T. M. (1974). *Mathematical Analysis* (2nd ed.). Addison-Wesley.

[3] Bartle, R. G., & Sherbert, D. R. (2000). *Introduction to Real Analysis* (3rd ed.). Wiley.

[4] Burden, R. L., Faires, J. D., & Burden, A. M. (2016). *Numerical Analysis* (10th ed.). Cengage Learning.