

4. Polyporales

miércoles, 10 de abril de 2024 12:33

4.1. Cerrena unicolor

Pregunta	Respuesta
¿Tiene sombrero?	no
¿Tamaño del sombrero? (Diámetro)	n/a
¿Forma del sombrero?	n/a
¿Color del sombrero?	n/a
¿Superficie del sombrero?	n/a
¿Forma del carpóforo? (en el caso de no tener sombrero)	semicircular
¿Color del carpóforo?	pardo gris
¿Superficie del carpóforo?	aterciopelada
¿Tipo de himenio?	poroso
¿Color de himenio?	blanquecino
¿Tipo de láminas? (en el caso de tener láminas)	n/a
¿Tiene pie?	no
¿Pie con anillo?	n/a
¿Color de pie?	n/a
¿Tipo de pie?	n/a



Anotaciones:

- Hábitat:  
Se ha encontrado al menos en el Hemisferio Norte. Crece sobre troncos muertos, generalmente de planifolios. Los cuerpos fructíferos son anuales y pueden aparecer en cualquier época del año.
- Comestible:  
Es demasiado fibroso y coriáceo para ser comestible. Además debido a que se suele encuentra en troncos muertos y tiene relaciones simbióticas con las avispas puede presentar parásitos o contaminaciones no deseadas. Es recomendable no consumirlo.

4.2. Pycnoporus cinnabarinus

Pregunta	Respuesta
¿Tiene sombrero?	no
¿Tamaño del sombrero? (Diámetro)	n/a
¿Forma del sombrero?	n/a
¿Color del sombrero?	n/a
¿Superficie del sombrero?	n/a
¿Forma del carpóforo? (en el caso de no tener sombrero)	semicircular
¿Color del carpóforo?	rojo cinabrio
¿Superficie del carpóforo?	rugosa
¿Tipo de himenio?	poroso
¿Color de himenio?	rojo cinabrio
¿Tipo de láminas? (en el caso de tener láminas)	n/a
¿Tiene pie?	no
¿Pie con anillo?	n/a
¿Color de pie?	n/a
¿Tipo de pie?	n/a



Anotaciones:

- Hábitat:  
Aparece por todo el Hemisferio Norte. Fructifica sobre madera muerta con preferencia por árboles de hoja caduca como los géneros *Fagus* o *Quercus*. Puede aparecer en cualquier época del año siempre y cuando haya humedad.
- Comestible:  
Su carne, fibrosa con humedad y leñosa en seco, es mal comestible.

4.3. Fomes fomentarius

Pregunta	Respuesta
¿Tiene sombrero?	no
¿Tamaño del sombrero? (Diámetro)	n/a
¿Forma del sombrero?	n/a
¿Color del sombrero?	n/a
¿Superficie del sombrero?	n/a
¿Forma del carpóforo? (en el caso de no tener sombrero)	pezuña
¿Color del carpóforo?	grisáceo
¿Superficie del carpóforo?	seca
¿Tipo de himenio?	poroso
¿Color de himenio?	gris claro
¿Tipo de láminas? (en el caso de tener láminas)	n/a
¿Tiene pie?	no
¿Pie con anillo?	n/a
¿Color de pie?	n/a
¿Tipo de pie?	n/a



Anotaciones:

- Hábitat:  
Un hongo que suele parasitar abedules (Betula sp) o hayas (Fagus sp) y que puede encontrarse tanto en Eurasia como Norteamérica. Puede vivir tanto en árboles vivos, comportándose como parásito, como en estos mismos árboles tras morir, pasando a una vida saprofítica.
- Comestible:  
La seta tiene una textura muy dura y leñosa, lo que la hace desagradable al paladar y difícil de digerir.

#### 4.4. Fomitopsis pinicola

Pregunta	Respuesta
¿Tiene sombrero?	no
¿Tamaño del sombrero? (Diámetro)	n/a
¿Forma del sombrero?	n/a
¿Color del sombrero?	n/a
¿Superficie del sombrero?	n/a
¿Forma del carpóforo? (en el caso de no tener sombrero)	semicircular
¿Color del carpóforo?	pardo rojizo
¿Superficie del carpóforo?	resinosa
¿Tipo de himenio?	poroso
¿Color de himenio?	blanquecino
¿Tipo de láminas? (en el caso de tener láminas)	n/a
¿Tiene pie?	no
¿Pie con anillo?	n/a
¿Color de pie?	n/a
¿Tipo de pie?	n/a



##### Anotaciones:

- Hábitat:  
Se ha encontrado por todo el Hemisferio Norte, creciendo sobre troncos de coníferas o planifolios, tanto en árboles vivos como muertos. Cuando crece sobre árboles vivos se comporta como parásito, pudiendo llegar a matarlos.  
Existen varias especies similares a Fomitopsis pinicola. Ganoderma tsugae es una especie anual, con textura de corcho. Heterobasidion annosum tiene la cara superior marrón menos definida.
- Comestible:  
No es comestible por su sabor y consistencia dura y fibrosa.

#### 4.5. Trametes hirsuta

Pregunta	Respuesta
¿Tiene sombrero?	no
¿Tamaño del sombrero? (Diámetro)	n/a
¿Forma del sombrero?	n/a
¿Color del sombrero?	n/a
¿Superficie del sombrero?	n/a
¿Forma del carpóforo? (en el caso de no tener sombrero)	semicircular
¿Color del carpóforo?	pardo gris
¿Superficie del carpóforo?	aterciopelada
¿Tipo de himenio?	poroso
¿Color de himenio?	pardo gris
¿Tipo de láminas? (en el caso de tener láminas)	n/a
¿Tiene pie?	no
¿Pie con anillo?	n/a
¿Color de pie?	n/a
¿Tipo de pie?	n/a



##### Anotaciones:

- Hábitat:  
Es una especie de distribución mundial, especialmente en climas templados. Aparece en cualquier época del año sobre madera en descomposición, especialmente no de coníferas.
- Comestible:  
Es demasiado dura y correosa para ser comestible.

## 4.6. Trametes versicolor

Pregunta	Respuesta
¿Tiene sombrero?	no
¿Tamaño del sombrero? (Diámetro)	n/a
¿Forma del sombrero?	n/a
¿Color del sombrero?	n/a
¿Superficie del sombrero?	n/a
¿Forma del carpóforo? (en el caso de no tener sombrero)	semicircular
¿Color del carpóforo?	Círculos concéntricos pardos y blanquecinos
¿Superficie del carpóforo?	aterciopelada
¿Tipo de himenio?	poroso
¿Color de himenio?	gris claro
¿Tipo de láminas? (en el caso de tener láminas)	n/a
¿Tiene pie?	no
¿Pie con anillo?	n/a
¿Color de pie?	n/a
¿Tipo de pie?	n/a

### Anotaciones:

- Hábitat:  
Es una especie que fructifica sobre madera de árboles planifolios, coníferas, e incluso sobre algunos frutales, provocando en el árbol una podredumbre blanca. Es un hongo muy frecuente y extendido que puede hacer acto de aparición en cualquier época del año si las condiciones ambientales son adecuadas.
- Comestible:  
No comestible, es dura y correosa por lo que resulta desagradable al paladar y difícil de digerir.

