### 12:33

# 6.1. Cantharellus cibarius

Pregunta	Respuesta
¿Tiene sombrero?	sí
¿Tamaño del sombrero? (Diámetro)	(1-12) cm
¿Forma del sombrero?	centro hundido
¿Color del sombrero?	amarillento
¿Superficie del sombrero?	lisa
¿Forma del carpóforo? (en el caso de no tener sombrero)	n/a
¿Color del carpóforo?	n/a
¿Superficie del carpóforo?	n/a
¿Tipo de himenio?	plegado
¿Color de himenio?	amarillento
¿Tipo de láminas? (en el caso de tener láminas)	n/a
¿Tiene pie?	sí
¿Pie con anillo?	no
¿Color de pie?	amarillento
¿Tipo de pie?	grueso



### Anotaciones:

### - Hábitat:

Habita en bosques variados e incluso zonas de matorral. Tiene una distribución prácticamente mundial.

### - Comestible:

Es una especie comestible, que suele fructificar desde finales de primavera hasta finales de otoño.

# 6.2. Craterellus cinereus

Pregunta	Respuesta
¿Tiene sombrero?	sí
¿Tamaño del sombrero? (Diámetro)	(3-5) cm
¿Forma del sombrero?	centro hundido
¿Color del sombrero?	negruzco
¿Superficie del sombrero?	aterciopelada
¿Forma del carpóforo? (en el caso de no tener sombrero)	n/a
¿Color del carpóforo?	n/a
¿Superficie del carpóforo?	n/a
¿Tipo de himenio?	plegado
¿Color de himenio?	pardo gris
¿Tipo de láminas? (en el caso de tener láminas)	n/a
¿Tiene pie?	sí
¿Pie con anillo?	no
¿Color de pie?	negruzco
¿Tipo de pie?	fino

### Anotaciones:

### - Hábitat:

La localizamos durante el otoño bajo árboles planifolios, sobre todo bajo Fagus sylvatica, curiosamente en los mismos lugares donde fructifica el Craterellus cornucopioides, al igual que este sale en placas, si bien menos numerosas y copiosas.

### - Comestible:

Es un buen comestible, menos apreciado que el Craterellus cornucopioides, con el cual se confunde a menudo, que tiene un color más negruzco y cuyo himenio es más liso, sin pliegues tan definidos como esta seta.



# 6.3. Craterellus cornucopioides

Pregunta	Respuesta
¿Tiene sombrero?	sí
¿Tamaño del sombrero? (Diámetro)	(4-10) cm
¿Forma del sombrero?	centro hundido
¿Color del sombrero?	pardo gris
¿Superficie del sombrero?	escamada
¿Forma del carpóforo? (en el caso de no tener sombrero)	n/a
¿Color del carpóforo?	n/a
¿Superficie del carpóforo?	n/a
¿Tipo de himenio?	liso
¿Color de himenio?	pardo gris
¿Tipo de láminas? (en el caso de tener láminas)	n/a
¿Tiene pie?	sí
¿Pie con anillo?	no
¿Color de pie?	grisáceo
¿Tipo de pie?	grueso

# Taxateca, con

### Anotaciones:

- Hábitat:

La recolectamos en bosque de robles y hayas, donde aparece sobre todo en los meses otoñales, en placas de numerosos ejemplares. Le gustan los terrenos muy húmedos.

- Comestible:

Excelente comestible a pesar de su aspecto, ideal para el acompañamiento como guarnición de todo tipo de guisos.

# 6.4. Craterellus tubaeformis

Pregunta	Respuesta
¿Tiene sombrero?	sí
¿Tamaño del sombrero? (Diámetro)	(2-6) cm
¿Forma del sombrero?	centro hundido
¿Color del sombrero?	ocre
¿Superficie del sombrero?	seca
¿Forma del carpóforo? (en el caso de no tener sombrero)	n/a
¿Color del carpóforo?	n/a
¿Superficie del carpóforo?	n/a
¿Tipo de himenio?	plegado
¿Color de himenio?	gris claro
¿Tipo de láminas? (en el caso de tener láminas)	n/a
¿Tiene pie?	sí
¿Pie con anillo?	no
¿Color de pie?	amarillento
¿Tipo de pie?	fino

## Anotaciones:

- Hábitat

La recolectamos en bosque de robles y hayas, donde aparece sobre todo en los meses otoñales, en placas de numerosos ejemplares. Le gustan los terrenos muy húmedos.

- Comestible

Excelente comestible a pesar de su aspecto, ideal para el acompañamiento como guarnición de todo tipo de guisos.

