

3. Boletales

miércoles, 10 de abril de 2024 12:33

3.1. Boletus aereus

Pregunta	Respuesta
¿Tiene sombrero?	Si
¿Tamaño del sombrero? (Diámetro)	(10-20) cm
¿Forma del sombrero?	convexo
¿Color del sombrero?	pardo oscuro
¿Superficie del sombrero?	aterciopelada
¿Forma del carpóforo? (en el caso de no tener sombrero)	n/a
¿Color del carpóforo?	n/a
¿Superficie del carpóforo?	n/a
¿Tipo de himenio?	poroso
¿Color de himenio?	blanquecino
¿Tipo de láminas? (en el caso de tener láminas)	n/a
¿Tiene pie?	Si
¿Pie con anillo?	no
¿Color de pie?	ocre
¿Tipo de pie?	grueso



- Anotaciones:
- Hábitat:
Es una especie que sale en árboles de hoja caduca, como por ejemplo castaño, roble o haya, además de en encinares y alcornocales. Es bastante termófila, por lo que gusta de salir en los meses estivales o en principio del otoño. Adaptada al clima mediterráneo, es abundante en algunas regiones.
 - Comestible:
Es un comestible excelente, una de las especies más codiciadas por los buscadores de setas.

3.2. Boletus lupinus

Pregunta	Respuesta
¿Tiene sombrero?	Si
¿Tamaño del sombrero? (Diámetro)	(3-15) cm
¿Forma del sombrero?	convexo
¿Color del sombrero?	rosa claro
¿Superficie del sombrero?	aterciopelada
¿Forma del carpóforo? (en el caso de no tener sombrero)	n/a
¿Color del carpóforo?	n/a
¿Superficie del carpóforo?	n/a
¿Tipo de himenio?	poroso
¿Color de himenio?	anaranjado
¿Tipo de láminas? (en el caso de tener láminas)	n/a
¿Tiene pie?	Si
¿Pie con anillo?	no
¿Color de pie?	amarillento
¿Tipo de pie?	grueso



- Anotaciones:
- Hábitat:
Esta seta se la puede encontrar desde finales de primavera hasta el otoño, casi siempre ligada a bosques de caducifolios.
 - Comestible:
A pesar de no ser popular por el color rojo de los poros e intenso azuleamiento de la carne, de joven y bien cocinado, resulta excelente.

3.3. Boletus queletii

Pregunta	Respuesta
¿Tiene sombrero?	Si
¿Tamaño del sombrero? (Diámetro)	(6-12) cm
¿Forma del sombrero?	convexo
¿Color del sombrero?	anaranjado o pardo rojizo
¿Superficie del sombrero?	seca
¿Forma del carpóforo? (en el caso de no tener sombrero)	n/a
¿Color del carpóforo?	n/a
¿Superficie del carpóforo?	n/a
¿Tipo de himenio?	poroso
¿Color de himenio?	amarillento
¿Tipo de láminas? (en el caso de tener láminas)	n/a
¿Tiene pie?	Si
¿Pie con anillo?	no
¿Color de pie?	amarillento
¿Tipo de pie?	grueso



- Anotaciones:
- Hábitat:
Fructifica en verano y sobre todo en otoño, más habitual en bosques de caducifolios, la encontramos tanto en hayedos como en robledales. Es una especie relativamente frecuente.
 - Comestible:

Comestible, aunque carece del aroma de los *Boletus* del grupo edulis.

3.4. Hygrophoropsis pallida

Pregunta	Respuesta
¿Tiene sombrero?	Sí
¿Tamaño del sombrero? (Diámetro)	(1.5-5) cm
¿Forma del sombrero?	convexo o plano
¿Color del sombrero?	ocre
¿Superficie del sombrero?	aterciopelada
¿Forma del carpóforo? (en el caso de no tener sombrero)	n/a
¿Color del carpóforo?	n/a
¿Superficie del carpóforo?	n/a
¿Tipo de himenio?	laminado
¿Color de himenio?	blanquecino
¿Tipo de láminas? (en el caso de tener láminas)	bifurcadas
¿Tiene pie?	Sí
¿Pie con anillo?	no
¿Color de pie?	amarillento
¿Tipo de pie?	fino



- Anotaciones:
- Hábitat:
Aparece al menos en Europa, aunque se desconoce su distribución completa. Es una especie poco común que crece en bosques y praderas arboladas, sobre suelos ricos en restos vegetales.
 - Comestible:
Hygrophoropsis pallida es una especie raramente registrada cuya comestibilidad desconocemos.

3.5. Chroogomphus fulmineus

Pregunta	Respuesta
¿Tiene sombrero?	Sí
¿Tamaño del sombrero? (Diámetro)	(4-8) cm
¿Forma del sombrero?	convexo
¿Color del sombrero?	pardo rojizo
¿Superficie del sombrero?	lisa
¿Forma del carpóforo? (en el caso de no tener sombrero)	n/a
¿Color del carpóforo?	n/a
¿Superficie del carpóforo?	n/a
¿Tipo de himenio?	laminado
¿Color de himenio?	pardo rojizo
¿Tipo de láminas? (en el caso de tener láminas)	separadas
¿Tiene pie?	Sí
¿Pie con anillo?	no
¿Color de pie?	pardo rojizo
¿Tipo de pie?	proporcional



- Anotaciones:
- Hábitat:
Esta seta mediterránea parece en otoño e invierno solitariamente o en grupos, generalmente ligado al árbol Pinus pinaster.
 - Comestible:
Comestible. Sin olor significativo; sabor dulce pero no distintivo.

3.6. Suillus luteus

Pregunta	Respuesta
¿Tiene sombrero?	Sí
¿Tamaño del sombrero? (Diámetro)	(4-12) cm
¿Forma del sombrero?	convexo
¿Color del sombrero?	pardo oscuro
¿Superficie del sombrero?	viscosa
¿Forma del carpóforo? (en el caso de no tener sombrero)	n/a
¿Color del carpóforo?	n/a
¿Superficie del carpóforo?	n/a
¿Tipo de himenio?	poroso
¿Color de himenio?	amarillento
¿Tipo de láminas? (en el caso de tener láminas)	n/a
¿Tiene pie?	Sí
¿Pie con anillo?	sí
¿Color de pie?	amarillento
¿Tipo de pie?	proporcional



¿Tiene pie?	sí
¿Pie con anillo?	sí
¿Color de pie?	amarillento
¿Tipo de pie?	proporcional

Anotaciones:

- Hábitat:
Es nativa de las zonas templadas y frías de Europa y Asia, pero ha sido introducido en todo el mundo. Vive en simbiosis con las raíces de algunas especies de pino (género Pinus). Puede ser muy común en su hábitat.
- Comestible:
Es una especie comestible si se elimina la cutícula, que es laxante, pero no es una seta valorada.

