
DOSSIER LYCAN

SYNTHETIC BIOLOGICAL RESEARCH DIVISION

COLDWATER PROJECT - COMPARTIMENT LYCAN

Dossier composite : SBR-CW-LY/75-89

Période couverte : 3 janvier 1975 - 11 août 1989

Classification d'origine : SECRET / ACCÈS RESTREINT NIVEAU 4

Statut : PROGRAMME SUSPENDU - ARCHIVES INCOMPLÈTES

État du document récupéré : trente et un feuillets provenant de plusieurs rapports, réunis dans une chemise qui n'est pas celle d'origine. Traces d'humidité, perforations et agrafes incompatibles entre elles. Le tampon DECLASSIFIED apposé sur la couverture a été barré à la main. Deux notes Ridge 12 datées de 1987 ont été glissées entre les rapports LYCAN-II et LYCAN-III ; leur rattachement administratif au compartiment LYCAN n'est pas établi. Plusieurs annotations au crayon sont postérieures à la clôture du programme.

1. Note de synthèse - 11 août 1989

Le programme LYCAN a été ouvert en janvier 1975 dans le cadre du contrat fédéral DOD-SCI-74-8812-C. Son mandat initial consistait à étudier plusieurs cas humains présentant simultanément :

- une cicatrisation exceptionnellement rapide ;
- une résistance anormale aux infections et aux traumatismes ;
- des épisodes périodiques de désorientation, d'hyperthermie et d'agressivité ;
- des modifications transitoires de la densité osseuse et musculaire.

Les premiers dossiers utilisent les expressions syndrome de Coldwater, complexe V ou phénotype loup. La désignation Marqueur V n'a été normalisée qu'en septembre 1979. Elle ne désigne pas un gène unique, mais un ensemble de résultats biologiques récurrents dont le mécanisme demeure inexpliqué.

Mandat initial

1. Identifier les caractéristiques communes aux cas recensés.
2. Déterminer si ces caractéristiques peuvent être provoquées chez un sujet ordinaire.
3. Évaluer leurs applications médicales et militaires.
4. Mettre au point des moyens de contention et de neutralisation adaptés.

Conclusion de clôture

Les propriétés observées chez les porteurs spontanés n'ont jamais été reproduites de façon stable. Les protocoles d'induction ont produit une accélération de la cicatrisation, suivie dans la majorité des cas d'altérations morphologiques incontrôlées, de lésions neurologiques et d'une perte progressive des fonctions cognitives supérieures.

Recommandation : suspension immédiate des essais d'induction humaine. Conservation des archives, des souches et des sujets résiduels en attente d'une décision fédérale.

Signataire : Dr Helen A. Kessler, directrice scientifique du site Coldwater.

Annotation au crayon, ajoutée des années plus tard : Ils ont conclu à un défaut de stabilité parce qu'ils mesuraient le produit et non le passage. - M.M.

2. Chronologie abrégée

Période	Désignation interne	Travaux	Résultat administratif
1975-1977	Recensement C-V	Étude de 16 cas médicaux atypiques et de leurs familles	Corrélation confirmée, cause inconnue
1977-1979	Essais V-A	Transfusions, greffes et fractions sériques sur 12 volontaires militaires	9 échecs graves, 3 réponses transitoires
1979-1983	LYCAN-I	Formalisation du Marqueur V et induction par le composé LX-7	Viabilité insuffisante
1983-1987	LYCAN-II	Stabilisation chimique et conditionnement comportemental	Contrôle temporaire seulement
1987-1989	LYCAN-III	Protocoles combinés ; premières lignées animales ; échanges non documentés avec Ridge 12	Incidents répétés ; retrait du financement

Note de classement : les numéros LY identifient des dossiers expérimentaux, non une cohorte unique. Un même porteur naturel peut apparaître comme donneur dans plusieurs dossiers. Les séries animales utilisent les préfixes LA et G.

Programme contemporain non résolu - RATTUS / LUPUS

Deux documents portant les références Ω-15 et Ω-17 établissent qu'en mai et juin 1987, le Dr Maxwell Merrill dirige à Ridge 12, niveau B1, un projet désigné alternativement SM-Ω, LUPUS × RATTUS et adaptation comportementale croisée.

Les documents décrivent l'injection du sérum SM-Ω à une lignée murine, son exposition à des stimuli lupins puis une cohabitation forcée avec des échantillons LUP-α et LUP-β. Le sujet RAT-κ-06 développe croissance accélérée, vocalisations structurées et comportements de groupe inhabituels. LUP-β-02 présente au contraire une frénésie prolongée et ne retrouve plus son calme après l'attaque.

Les codes LUP ne figurent dans aucun registre principal de LYCAN. Toutefois, la date, le vocabulaire de « transfert », la proximité des essais LYCAN-III et une mention de LUP-β-02 dans un bordereau incomplet rendent improbable une coïncidence.

Trois hypothèses demeurent recevables :

1. RATTUS / LUPUS constituait un sous-projet non déclaré de LYCAN confié à Merrill ;
2. il s'agissait d'un programme parallèle recevant des échantillons de LYCAN sans partager sa chaîne de commandement ;
3. Merrill a détourné des échantillons ou des résultats sous couvert d'une étude approuvée à Ridge 12.

La note Ω-17 porte la mention OPÉRATION SUSPENDUE et un ordre de scellement daté du 14 juin 1987. Aucun document ne confirme la destruction des animaux ni du sérum SM-Ω.

3. Recensement des porteurs spontanés

Entre 1975 et 1986, vingt-trois personnes ont été considérées comme porteuses spontanées probables. Onze seulement ont fait l'objet d'observations prolongées. Le recrutement s'est effectué par l'intermédiaire de dossiers hospitaliers, de médecins militaires et de signalements d'accidents dont les blessures ne correspondaient pas à l'évolution clinique constatée.

Critères retenus après la révision de 1979

Indicateur	Valeur diagnostique	Limites connues
Cicatrisation accélérée documentée	Forte	Variable après exposition à certains toxiques
Profil enzymatique SBR-V	Moyenne	Présent chez certains parents asymptomatiques
Variations périodiques de température et cortisol	Moyenne	Cycle irrégulier chez plusieurs sujets
Remodelage osseux transitoire	Très forte	Mesurable seulement pendant un épisode actif
Antécédents familiaux concordants	Moyenne	Témoignages souvent incomplets ou dissimulés

Le test sanguin SBR-7, utilisé de 1976 à 1979, produisait trop de faux positifs pour servir de critère autonome. La présence d'un profil compatible n'établit ni l'existence d'une manifestation active, ni la capacité d'un individu à survivre à une induction.

Annotation en encre noire : Compatibilité n'est pas transmission. Transmission n'est pas éveil. Reprendre les dossiers des survivants exposés. - M.M.

4. Essais d'induction humaine

4.1 Composé LX-7 - « vecteur »

Le LX-7 est une suspension de fractions sanguines, de facteurs de croissance et d'adjuvants immunitaires dérivés de porteurs spontanés. Vingt-quatre receveurs ont été exposés entre 1979 et 1983.

Issue observée	Nombre de sujets
Décès pendant la réaction aiguë	7
Décès dans les douze semaines suivantes	5
Altération persistante, non viable hors contention	6
Réponse transitoire suivie d'une régression	4
Stabilisation partielle au-delà de six mois	2

Les deux stabilisations partielles se sont accompagnées d'une dépendance au protocole chimique et d'une dégradation cognitive progressive. Aucun sujet induit n'a présenté le contrôle morphologique décrit chez les porteurs spontanés.

Extrait - incident LY-09, 22 août 1979

À 02 h 14, le sujet a rompu trois sangles de contention de type B. Deux techniciens et un infirmier ont été blessés. L'administration de sédatifs conventionnels a aggravé l'agitation. Le sujet a été neutralisé à 02 h 23 conformément au protocole d'urgence. Recommandation : abandon des alliages ordinaires pour les éléments de contact. Les essais comparatifs indiquent une réaction douloureuse immédiate aux dispositifs à forte teneur en argent.

4.2 Composé LX-12 - « supprimeur »

Le LX-12 est un dérivé concentré d'Aconitum napellus mis au point comme agent de contention. Il réduit temporairement la régénération et l'expression des modifications morphologiques, mais sa marge thérapeutique est étroite.

- délai d'action : 4 à 18 minutes selon le mode d'exposition ;
- durée mesurée : 18 à 61 heures ;
- risques : arythmie, paralysie respiratoire, atteinte hépatique ;
- danger particulier : accumulation rapide lors d'expositions répétées.

Le LX-12 n'est pas un antidote au Marqueur V. Il constitue un toxique à effet suppressif et peut être mortel pour un porteur spontané comme pour un sujet induit.

Annotation au crayon : Mélange microencapsulé efficace par morsure. La salive des séries G devrait assurer la diffusion. - M.M.

4.3 Fraction LX-19 - « liant »

Les feuillets consacrés au LX-19 ont été retirés du dossier avant archivage. L'index technique le décrit comme un adjuvant de fixation neuro-endocrinienne, destiné à prolonger la réponse au LX-7 sans augmenter la dose de vecteur.

Une note de clôture indique :

Les essais in vitro ne permettent pas de déterminer si la cohésion observée relève d'une stabilisation réelle ou d'une simple persistance de la réaction. Aucun essai humain supplémentaire n'est autorisé.

Annotation en encre noire : Le liant ne stabilise pas le corps. Il maintient l'état assez longtemps pour que quelque chose s'y installe. - M.M.

5. Lignées animales et séries G

À partir de 1984, Coldwater a tenté de dissocier les applications de terrain des essais d'induction humaine. Les séries G combinaient sélection canine, stimulation hormonale et greffes de tissus provenant des essais LYCAN. Les notes de Ridge 12 montrent qu'en 1987 Merrill explorait, en parallèle ou à la périphérie de ce programme, une autre voie : transférer à une colonie murine la coordination sociale et l'intuition territoriale observées chez les sujets lupins.

Les séries G-0 et G-1 ont présenté :

- une croissance accélérée ;
- une forte résistance à la douleur ;
- une réponse correcte aux signaux sonores et radio ;
- une durée de vie réduite ;
- des défaillances organiques après interruption du traitement.

La série G-1 a été officiellement détruite en novembre 1988. Aucun dossier de Coldwater ne fait mention d'une série G-2.

Annotation récente, écrite au stylo-feutre : Ridge 12 avait démontré la coordination sans stabiliser l'individu. Coldwater a stabilisé l'individu sans obtenir la coordination. Reprendre les deux : relais implanté, hémolymph synthétique et LX-12 salivaire. Produire selon le besoin. - M.M.

6. Extrait du registre des dossiers

Référence	Ouverture	Catégorie	Statut en 1989	Observation
LY-001	1975	Porteur spontané	Dossier clos	Observation seulement
LY-004	1977	Receveur expérimental	Décédé	Réaction aiguë
LY-009	1979	Receveur LX-7	Neutralisé	Incident du 22/08/79
LY-017	1981	Receveur LX-7	Décédé	Défaillance multiviscérale
LY-023	1983	Porteur spontané	Perdu de vue	Rupture de surveillance, 03/06/85
LY-031	1985	Receveur LX-7/LX-19	Transféré	Destination absente du registre
LY-038	1987	Série animale	Détruite	Matériel biologique conservé
LY-044	1988	Protocole combiné	Dossier retiré	Bordereau de transfert manquant

Les lignes LY-018 à LY-022 ne sont pas expurgées : elles ont été découpées du feuillet. Les bords portent des traces de lame récentes.

7. Suspension et conservation

Le financement fédéral a été retiré le 11 août 1989 après trois incidents de confinement et un audit financier défavorable. SyntheCo a reçu mandat de :

1. détruire les composés actifs non nécessaires à l'expertise ;
2. remettre les sujets humains survivants aux autorités désignées ;
3. conserver les archives brutes pendant vingt-cinq ans ;
4. condamner les secteurs 4 à 7 du site Coldwater.

Les bordereaux joints ne permettent pas de confirmer l'exécution complète des points 1 et 2. La dernière inspection fédérale consignée date du 4 février 1990.

Annotation finale, encre noire : Suspendu n'est pas détruit. Conservé n'est pas perdu. - M.M.