

Cálculos Computacionales en Plasmas Producidos por Cavitación Láser y colapso de burbujas - trabajo realizado hasta 27 de Octubre de 2022

Pablo Chehade

pablo.chehade@ib.edu.ar

Instituto Balseiro, CNEA-UNCuyo, Bariloche, Argentina, 2022

- Se estudió numéricamente la expansión de una burbuja de cavitación láser. **y la compresión**
- La evolución temporal se divide en dos partes, cada una de ellas gobernada por fenómenos físicos distintos.
- La primera consta desde la creación de la burbuja hasta la expansión rápida al radio máximo. El fenómeno que creemos ocurre es la interacción del láser con los electrones de burbujas microscópicas (bubston) para dar lugar a una avalancha de electrones impulsora de la expansión (fenómeno electromagnético y fluidodinámico). El fenómeno se debe principalmente a la acción de los electrones y las moléculas ionizadas que rodean exteriormente la burbuja.
- La segunda, desde el radio máximo hasta su implosión al radio mínimo. En este momento el efecto de los electrones se diluye y comienzan a preponderar efectos de conducción del calor, cambios en la masa contenida dentro de la esfera debido a reacciones químicas, difusión y condensación/evaporación, entre otros. El fenómeno se debe principalmente a la acción de los iones y moléculas dentro y fuera de la burbuja (fenómeno fluidodinámico, termodinámico y químico).
- Se exploraron además distintos métodos numéricos y técnicas de resolución computacionales para resolver este problema complejo que inherentemente es del tipo stiff debido a las diferencias de órdenes de magnitud entre las constantes de tiempo involucradas.

ÍNDICE

A. Situación física inicial

Buscar en internet cómo hacer un índice en Latex

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I: EVOLUCIÓN HASTA EL RADIO MÁXIMO

1 [Resumen del capítulo]

- En este capítulo se discute el proceso a partir del cual un láser incidente en un medio líquido es capaz de producir una burbuja de cavitación
- El proceso se desarrolla en **Referencia al Bunkin**
- Se parte de un medio líquido, en nuestro caso agua deuterada, en el cual se asume existen micro burbujas de gas (bubstons) agrupadas en clusters en la zona focal del haz de luz.
- Se asume que dentro de cada bubston hay inicialmente un electrón libre
- Bajo estas condiciones, se demuestra en el paper que bajo determinadas condiciones de la burbuja y de la intensidad del haz, se desarrolla una avalancha de electrones
- Esta produce una presión eléctrica que expande el bubston hasta que los bubstons del cluster se fusionan entre sí y forman una gran burbuja o "núcleo".
- Este efecto se denomina SOC
- Explicar brevemente qué ocurre luego
- Las cuentas se hacen en el sistema CGS

Armo el cuento hasta la coalescencia

- Resumen: en esta sección se explica la situación física inicial antes de la incidencia del láser.
- Se parte de un medio líquido en el que se encuentran clusters de burbujas estables (bubstons) de radio R_0 .
- Explicar cómo calcular R_0 y dar el valor aproximado
- La estabilidad de los bubstons se basa en la condición $R_0 l_{em}$. Explicar
- Se considera que dentro de la burbuja hay al menos un electrón libre
- Definir R_0 en algún lado

B. Avalancha de electrones dentro de los bubston

2 [Resumen]

- En esta sección se explicará el proceso a través del cual aumenta la cantidad de electrones N_e dentro de cada bubston al incidir un láser.
- También se verá que para que ocurra la avalancha es necesario que el haz supere una intensidad mínima I_0 **dada por qué parámetros? del líquido?**
- Además, se concluirá que en la avalancha no aumenta indefinidamente el número de electrones, sino que se llega a un valor máximo en un tiempo relativamente corto, a partir del cual N_e se mantiene constante.

3 [La avalancha comienza con un electrón dentro de la burbuja inmerso en el campo electromagnético producido por el láser]

- Se parte de la hipótesis de que existe al menos un electrón libre dentro de cada bubston.
- Al incidir el láser, el electrón interactúa con el campo electromagnético oscilatorio y se acelera.
- En su movimiento choca con las paredes de la burbuja

con una frecuencia $\nu_{ew} = \bar{\nu}_e/R_0$ donde $\bar{\nu}_e$ es la velocidad media aritmética de los electrones.

- En cada choque existe una probabilidad de que ione alguna molécula de la pared, extrayendo un electrón que contribuye a la avalancha, y una probabilidad de que se quede adherido a alguna de ellas, en decremento de la avalancha.
- El primer caso ocurre con frecuencia $\nu_i = \dot{\mathcal{E}}_e/\Delta$ donde $\dot{\mathcal{E}}_e$ es la velocidad media de aumento de la energía cinética del electrón \mathcal{E}_e debido al movimiento caótico. Mientras que Δ es la energía de ionización de una molécula de la pared. Esta puede ser mucho menor que la energía de ionización de una molécula individual del líquido y se estima en ~ 6 eV. **Leer la referencia 4 en el Bunkin.**
- El segundo caso ocurre con frecuencia $\nu_{loss} = (\bar{\nu}_e/R_0)w_{a,e}$ donde $w_{a,e}$ es la probabilidad de adhesión a la pared.
- De este modo, el número de electrones en el tiempo se encuentra determinado por la ecuación
- (a tiempos cortos) **(para los que no creció demasiado el radio y se puede asegurar que solo ocurren los dos fenómenos anteriores?)**

$$\frac{dN_e}{dt} = \nu_i N_e - \nu_{loss} N_e \quad (1)$$

- A continuación se determinará la relación entre ν_i y las propiedades del láser.

4 [Determinación de la frecuencia de ionización]

- Asumiendo que el efecto del campo eléctrico es mayor al magnético, la velocidad $\dot{\mathcal{E}}_e$ corresponde a la potencia promedio $\langle P \rangle$ entregada por el haz de luz a un electrón.
- Además, considerando que la amplitud de oscilación del electrón es mucho menor a la longitud de onda del haz, el campo eléctrico se puede considerar uniforme.
- De este modo, este se puede expresar como $E(t) = E_0 \sin(wt)$, con w frecuencia del haz y E_0 amplitud.
- En base a esto, la posición del electrón está dada clásicamente por la ley de Newton
- $m\dot{v} = -eE(t) - m\nu_{ew}v$
- donde m es la masa del electrón, v su velocidad, e su carga y el término de fricción $m\nu_{ew}v$ representa las colisiones con la pared.
- Para tiempos largos $t\nu_{ew} \gg 1$ se puede resolver la ecuación diferencial obteniendo la velocidad

$$v(t) = \frac{eE_0}{m(\nu_{ew}^2 + w^2)} [w \cos(tw) - \nu_{ew} \sin(tw)]$$

- en base a la cual se puede calcular la potencia promedio entregada al electrón

$$\langle P \rangle = \langle -eE(t)v(t) \rangle = \nu_{ew} \frac{e^2 E_0^2}{2mw^2} = \nu_{ew} \frac{I}{cn_{e,cr}}$$

- donde $n_{e,cr} = mw^2/4\pi e^2$ es la densidad de electrones crítica e $I = \frac{c}{8\pi} E_0^2$ es la intensidad del haz.

- De este modo, la frecuencia de ionización se puede expresar como $\nu_i = \frac{\nu_{ew}}{\Delta} \frac{I}{cn_{e,cr}}$

5 [Determinación del nro de electrones en función del tiempo]

- Reemplazando la expresión anterior en ??, se obtiene

$$\frac{dN_e}{dt} = \beta N_e, \quad (2)$$

- con
-

$$\beta = \nu_{ew} w_{a,e} \left(\frac{I}{I_0} - 1 \right),$$

- donde $I_0 = cn_{e,cr} \Delta w_{a,e}$ es la intensidad mínima del haz necesaria para que $\beta > 0$ y, por lo tanto, se produzca la avalancha de electrones.
- **Vale la pena hacer la cuenta con el láser del laboratorio?**

6 [Aumento indefinido de electrones?]

- Se logró demostrar que bajo determinadas condiciones del haz de luz, aumenta N_e . Debido a esto se forma un gas de electrones dentro de la burbuja con carga eN_e y una esfera de carga uniforme positiva fuera de la burbuja de carga opuesta debido a los iones.
- Sin embargo, N_e no aumenta indefinidamente.
- El análisis anterior vale cuando la densidad media de electrones \bar{n}_e es pequeña y por lo tanto se pueden despreciar las colisiones entre electrones, es decir, el camino libre medio de colisión entre electrones l_{ee} es más grande que el tamaño de la burbuja R_0 que se asume que no varía.
- Cuando esto deja de valer, las colisiones de los electrones con la pared comienzan a disminuir, como así también ν_{ew} y, por lo tanto, el factor β en ??.
- En la competencia de ambos procesos se llegaría a un equilibrio en el que la cantidad de electrones no aumenta. El tiempo en el que ocurre este proceso y la cantidad de electrones en el equilibrio $N_{e,max}$ serán determinadas a continuación.

7 [Cálculo de la densidad media máxima]

- Para determinar $N_{e,max}$ es necesario conocer la densidad de electrones n_e dentro del bubston.
- Asumiendo la validez de la distribución de Boltzmann **y qué otras hipótesis??** y aplicando la ecuación de Poisson, esta densidad es solución del sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{cases} n_e(r) = n_e(0)e^{e\phi/T_e}, 0 \leq r \leq R_0 \\ \nabla^2 \phi = 4\pi e n_e(r) \end{cases}$$

- donde ϕ es el potencial producido por la densidad de carga y T_e es la temperatura del gas de electrones.
- **Por qué el 3/2?? Sacar el 3/2**
- Realizando la aproximación

$$e^{e\phi/T_e} \approx 1 + e\phi/T_e$$

se logra despejar la ecuación diferencial para el potencial

$$\nabla^2 \phi - \phi/a_e^2 = 4\pi n_e(0)$$

donde $a_e = \sqrt{T_e/4\pi e^2 n_e(0)}$ es el **electron Debye radius. Es lo mismo que el radio de Debye en un plasma?**

- Imponiendo $\phi(0) = 0$ se obtiene la solución

$$\phi(r) = \frac{T_e}{e} \left(\frac{\sinh r/a_e}{r/a_e} - 1 \right), \quad 0 \leq r \leq R_0$$

- y la distribución de electrones

$$n_e(r) = n_e(0) \frac{\sinh r/a_e}{r/a_e}$$

- **Corroborar las expresiones! La definición de a_e es distinta que en el paper**
- **Este problema se conoce como el problema de Debye. Esto se discute en https://en.wikipedia.org/wiki/Debye_length**
- **Gráfico de la densidad de electrones. Se pueden poner letras como ticklabels en matplotlib https://www.tutorialspoint.com/matplotlib/matplotlib_setting_ticks_and_tick_labels.htm**

- Relación entre $n_e(R_0)$ y \bar{n}_e .
 - La densidad máxima se alcanza en la condición límite $l_{ee} = a_e$, obteniendo el valor máximo de la densidad y, por lo tanto, de la cantidad de electrones.
 - Explicar en algún lado la la formación de la capa superficial y su justificación a partir del camino libre medio
- 8 **[Cálculo del tiempo al que se alcanza la densidad media máxima t_0]**

- **Basta decir que son tiempos cortos del orden de $6 \cdot 10^{-11}$? O tengo que hacer la cuenta? La cuenta es específica para esto y es muy larga**

C. Coalescencia de los burbustones y formación del núcleo

- Hasta ahora se vio que la cantidad de electrones dentro de la burbuja aumenta y al mismo ritmo se forma una capa superficial de cargas positivas debido a las moléculas ionizadas que rodean la burbuja.
- Cabe preguntarse qué efecto tiene la distribución de carga sobre la dinámica de la burbuja.
- Su efecto es el de producir una presión eléctrica sobre la pared de la burbuja, provocando su expansión. Tal presión p_e se encuentra dada por

$$p_e =$$

$$p_{gas} + p_{coul}$$

- donde $p_{gas} = (2/3)n_e(R)T_e(R)$ es la presión producida por el gas de electrones **por qué ese valor?** y $p_{coul} = E^2(R)/8\pi$ es la presión debido a la repulsión coulombiana entre las cargas positivas y negativas. En esta última,

$$E(R) = -d\phi/dr = \dots$$

es el campo eléctrico dentro de la burbuja.

- **Tengo que agregar bien cómo se hace la cuenta? No recuerdo bien el argumento de Fabián**
- De este modo,
- **Expresión para la presión eléctrica final sin introducir el x**
- **Gráfico de la presión para ver su dependencia con $1/R^4$**

Presentación de la ecuación diferencial de evolución de $R(t)$

- A continuación se verá que la presión eléctrica produce que el burbustón se expanda. Se parte de la ecuación de evolución de $R(t)$
- Esta es una aproximación de la ecuación de momento **Referencial el libro "The Acoustic Bubble" de T.G.Leighton**

$$R\ddot{u} + \frac{3}{2}u^2 = \frac{p_e}{\rho} \quad (3)$$

- donde $u = \dot{R} = dR/dt$ y se consideró que $p_e p_0$ presión hidrostática.)
- Lo único que queda determinar para resolver la ecuación diferencial es la dependencia $n_e(R)$ y $T_e(R)$. Definición del régimen de autoconsistencia
- Hay que suponer que τt_0
- El proceso de expansión se considera como cuasiestático. Esto implica que la temperatura del gas depende del radio $T = T(R)$ y que la distribución de electrones cambia con R y $T(R)$ solamente.
- Bajo estas condiciones, el número máximo de electrones $N_{e,max}(R)$ **verificar fórmula. cambié la def de a_e debería cambiar para cada valor de $R = R(t)$.**
- Sin embargo, físicamente se espera que no cambie en el tiempo debido a los argumentos presentados anteriormente y a la consideración del proceso como cuasiestático.
- En base a esto, se define el proceso de expansión como un régimen de autoconsistencia.^{en} el que la cantidad de electrones no cambia con el tiempo.
- Para que esto ocurra, se debe cumplir que

$$T_e(R) = T_e(R_0) \frac{R_0}{R}$$

- donde $T_e(R_0) = \Delta/3$
- Dinámica de la burbuja para $R > R_0$
- Dada la funcionalidad conocida de $p_e(R)$, lo único que queda es resolver la ecuación diferencial ??.
- Esto se hizo numéricamente mediante el método Runge-Kutta-4.

- Tengo que explicar en detalle cómo resolví numéricamente el problema?
- Figura de $R(t)$ marcando el límite en el que hay coalescencia
- Esta evolución no vale indefinidamente, sino hasta que se produce la coalescencia de los bubstons del mismo cluster. Esto ocurre cuando $R(t) = R_1 = l/2$ donde l es la distancia entre los centros de los bubstons. Esta longitud se puede estimar como $l \approx 2a_i$
- Revisar referencia y definir a_i
- Numéricamente se obtuvo que el tiempo en el que ocurre este proceso t_{coal} es del orden de valor?

I. EVOLUCIÓN DE LA BURBUJA

Armo el cuento desde la coalescencia hasta llegar a los resultados importantes de radio máximo y el tiempo al que se da

- Luego del tiempo de coalescencia se asume que todos los bubstons se fusionan para formar una burbuja grande, a partir de ahora denominada "núcleo".
- Condiciones iniciales de la burbuja
- Calculo los distintos parámetros en función de las fórmulas presentadas
-
- Se busca calcular la presión eléctrica en $R = R_{cl}$ a tiempo inicial. La presión eléctrica está dada por la ecuación (17) del Bunkin

$$p_e = \frac{2}{3} \bar{n}_e T_e \frac{x}{3} \left[1 + \pi \left(\frac{x-1}{x} \right)^2 \frac{e^2 R_{cl}^2 \bar{n}_e}{T_e} \right]$$

donde $\bar{n}_e = 3.4 * 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ es la densidad media de electrones en el cluster, $T_e \approx 0.1 \text{ eV}$ es la temperatura de los electrones, $x \approx 17.9$ es un parámetro, e es la carga eléctrica y R_{cl} es el radio del cluster que a $t = 0$ es $R_{cl} \approx 10^{-2} \text{ cm}$.

- A partir de ahora puede dejar de valer el régimen de autoconsistencia", por lo que la dependencia de $T(R)$ presentada en referencia? podría dejar de valer. En este sentido, se asume que los electrones del núcleo se encuentran a la misma temperatura correspondiente al instante anterior a la coalescencia, es decir, $T(R_1) \approx 0.1 \text{ eV}$.
- Debido a que no se conoce el proceso por el cual los bubstons forman el núcleo, tampoco se puede asumir que la distribución de electrones $n_e(r)$ mantenga la funcionalidad de la expresión referencia. Consecuentemente, la expresión para la presión eléctrica también deja de valer. Aún más, la ecuación de evolución ?? deja de valer debido a que durante la dinámica del clúster podría ocurrir que la presión eléctrica sea comparable con la hidrostática externa.
- Sin embargo, sí se puede asumir ... para continuar tengo que repasar las condiciones de la fórmula de Willis
- condiciones para la fórmula de Willis. Buscar bien y explicar por qué se plantea la igualdad de energías a

tiempo inicial. No me queda claro por qué deja de valer la evolución que hicimos con la presión de electrones.

■

$$R\dot{u} + \frac{3}{2}u^2 = \frac{p_0}{\rho} \quad (4)$$

- La velocidad inicial está dada por
- fórmula de la velocidad inicial en función de la energía
-
- Mientras que las condiciones iniciales son
- Se obtuvo el radio máximo $R_{\max} = \text{valor?}$ cm a tiempo $t_{\max} = \text{valor?}$ s.

CAPÍTULO II: EVOLUCIÓN DESDE EL RADIO MÁXIMO

A. Resumen del capítulo

- Resumen de los fenómenos que participan en esta parte de la evolución (están en la tesis de Gabriela).
- El objetivo es calcular la evolución del radio $R(t)$ de la burbuja desde su valor máximo.
- Hay que resolver la ecuación de movimiento Presentar ecuación, de dónde se obtuvo, qué es cada factor y de dónde se sacan los valores, son los mismos para deuterio e hidrógeno?
- La variación de masa \dot{m} está dada por 3 fenómenos: reacciones químicas, difusión y condensación y evaporación. Por qué en la tesis de gabriela solo hay variación de mp por condensación y evaporación
- Comentar que en este trabajo se logró implementar el código de reacciones y de condensación/evaporación.
- Por otro lado, para calcular la variación de p_B es necesario calcular dT/dt para lo cual se necesita una expresión. Aquí es donde se introduce la conservación de la energía.
- Comentar qué modelo se considera para la presión de los gases dentro de la burbuja y qué modelo para la energía
- Comentar que se trata de un problema del tipo stiff y deberá ser trabajado con cuidado. No definir problemas stiff, eso conviene hacerlo en otra sección.

B. Fenómenos físicos

1. Condensación y Evaporación

- Tengo que repasar la tesis de Gabriela y el paper de Yasui para comenzar a escribir esto
- Sí se podría hacer mención a las ecuaciones para calcular la conducción de calor.

2. Reacciones químicas

Gabriela obtuvo el modelo de reacciones qcas del paper de Yasui 1997. **Podría verificar si no hay un mejor modelo.** Yasui escribió un libro sobre burbujas. Quicás sea útil leerlo. Mi principal foco estaría en el capítulo 2. Se desarrollan no solo las reacciones químicas sino también los demás fenómenos.

Toegel Phase diagrams for sonoluminescing bubbles: A comparison between experiment and theory. En este se desarrolla el modelo hidrodinámico de la burbuja, junto tmb a modelos de transferencia de calor. En cuanto a las reacciones químicas en particular, el modelo no es exactamente el de la ecuación de Arrhenius, sino de la "ley de Arrhenius modificada". En teoría esto se explica en mayor detalle en el libro "Gas-Phase Combustion Chemistry" de W. C. Gardiner pero no me puse a buscarlo

- Releer la parte de reacciones químicas de la tesis de Gabriela y el paper de Yasui al que se hace referencia. Esta sección intenta resumir eso.
- **DUDA: en el código de Gabriela, n es nro de partículas o concentración? En la tesis es concentración**
- **Vale la pena agregar acá la contribución de las reacciones químicas a la conservación de la energía?**
- Las reacciones químicas dentro de la burbuja son de no equilibrio **Referencia al libro de Yasui** y es necesario emplear un modelo de cinética química
- Ocurren cuando las temperaturas en el interior de la burbuja son elevadas
- En este trabajo se consideró sólo la presencia inicial de moléculas de H_2O , O_2 y H_2 , lo cual da lugar a **8** reacciones+
- El cambio total

C. Método numérico

- Mencionar que es un problema del tipo stiff. Explicar brevemente de qué se trata esto
- Historia de cómo el código pasó de ejecutar en días (el mío) o minutos (el de Gabriela) a segundos (el mío):
- Comentar que ya se contaba con un código en C++ programado en Borland por Gabriela (y en qué año), pero que resolvía el sistema de ecuaciones diferenciales usando Runge-Kutta Ferhber **corroborar cómo se escribía.** Comentar qué complicaciones tenía y que se progrmó toro código en C++
- Se usó el cluster.
- Se optó por python. Se usó la librería scipy. Nuevamente el código era muy lento con RK45 pero con el método de Radau todo mejoró. **Explico esto?**

CONCLUSIONES

1. Se calculó numéricamente el radio máximo de la burbuja, obteniendo un valor 10 veces mayor a los resultados experimentales (y teóricos del Bunkin)
2. Se calculó numéricamente el tiempo al que la burbuja alcanza el radio máximo, obteniendo un valor 10 veces mayor a los resultados experimentales (y teóricos del Bunkin)
3. Ídem para la energía, salvo por un factor 600
4. Se encontró que el problema es de naturaleza stiff, lo cual permitió elegir un mejor método numérico que el que se venía usando. Esto permitió disminuir enormemente el tiempo de cómputo
5. Se logró calcular la evolución de un único bubston, obteniendo los mismos resultados que el paper de Bunkin
6. Se logró implementar un módulo de reacciones, de conducción del calor y de condensación y evaporación.
7. Se pudo usar el cluster de MECOM para agilizar las cuentas del código en C++, aunque luego se decidió trabajar en python
8. Se lograron reproducir las cuentas más importantes del Bunkin con Mathematica