

**TESTE TÉCNICO — NÃO UTILIZAR**

PACIENTE: Paciente fictício  
ESPÉCIE: gato  
SEXO: fêmea

RESPONSÁVEL: Tutor fictício  
RAÇA: SRD  
IDADE / PESO: 5 anos • 4 kg

**USO ORAL****1. PREDNISOLONA — SOLUÇÃO ORAL 3 MG/ML (FOSFATO SÓDICO ACHÉ / PRENI S... ..... SOLUÇÃO ORAL**

Administrar 1,333 mL, por via oral, a cada 12 horas, durante 7 dias; reavaliar antes de reduzir a dose.

**USO INALATÓRIO****2. PROPIONATO DE FLUTICASONA — FLIXOTIDE — FLIXOTIDE® SPRAY 250 MCG/DOSE (GSK... ..... SPRAY**

Administrar 1 jato, por via inalatória, a cada 12 horas, em uso contínuo.

**3. SALBUTAMOL — AEROLIN® SPRAY 100 MCG/JATO (GSK BRASIL) — 100 MCG/JATO ..... SPRAY**

Administrar 1 jato, por via inalatória, conforme crise de chiado ou falta de ar, para uso pontual de resgate.

Usar a bombinha de resgate com espaçador e máscara conforme a demonstração da equipe. Se necessário, repetir somente uma vez após 20 a 30 minutos enquanto leva o gato para atendimento. Não ficar repetindo doses em casa para adiar o atendimento.

Se houver falta de ar intensa, respiração de boca aberta ou língua azulada, procurar atendimento imediatamente. Não substituir a bombinha diária por esta medicação.

**RECOMENDAÇÕES DA DOENÇA**

- Eliminar exposição a fumaça de cigarro, incenso, perfumes, sprays, aromatizadores e produtos de limpeza voláteis.
- Para usar a bombinha prescrita, utilizar espaçador com máscara própria para gatos ou máscara que vede suavemente o focinho; pedir demonstração à equipe antes da primeira aplicação.
- Acostumar o gato à máscara aos poucos, com carinho e recompensa, sem forçar quando ele estiver com falta de ar.
- Agitar a bombinha conforme a bula, encaixar no espaçador, ajustar a máscara ao focinho e disparar somente um jato por vez.

## TESTE TÉCNICO — NÃO UTILIZAR

- Manter a máscara vedada por 7 a 10 respirações; observar o indicador do espaçador. Se houver outro jato prescrito, aguardar cerca de 30 segundos e repetir.
- Limpar delicadamente o focinho com pano úmido após a aplicação; lavar e secar o espaçador conforme o fabricante.
- A bombinha de uso diário previne crises e deve continuar mesmo sem tosse. Ela não substitui o remédio de alívio rápido prescrito para crises.
- Não reduzir nem suspender o remédio oral por conta própria: a bombinha pode levar uma a duas semanas para atingir o efeito esperado. Reavaliar em 7 dias para definir os próximos passos.
- Respiração de boca aberta, língua azulada, desmaio ou grande esforço para respirar exigem atendimento imediato; manter o gato calmo e não forçar comida, água ou comprimidos.
- Preferir areia sanitária sem perfume e com baixa produção de poeira.
- Evitar varrer ou usar aerossóis no mesmo ambiente do gato.
- Controlar o peso corporal.
- Registrar a frequência das crises, tosse, chiado e uso do salbutamol.
- Contar periodicamente a frequência respiratória durante o sono.
- Uso de salbutamol mais de duas ou três vezes por semana indica controle inadequado e necessidade de reavaliação.

## SINAIS PARA RETORNO

Retornar diante de Respiração de boca aberta, língua ou gengivas azuladas (mucosas ou língua azuladas), Intenso esforço abdominal, Incapacidade de permanecer deitado ou Fraqueza ou ausência de resposta ao resgate.