

TESTE TÉCNICO — NÃO UTILIZAR

PACIENTE: Paciente fictício
ESPÉCIE: cão
SEXO: fêmea

RESPONSÁVEL: Tutor fictício
RAÇA: SRD
IDADE / PESO: 5 anos • 10 kg

USO ORAL

1. HIDROCODONA MEDICAMENTO

Administrar 2,2 mg, por via oral, a cada 6 a 8 horas, durante 7 a 14 dias.

RECOMENDAÇÕES DA DOENÇA

- Substituir imediatamente a coleira cervical por peitoral.
- Evitar qualquer pressão sobre o pescoço.
- Promover perda de peso gradual nos pacientes com sobrepeso ou obesidade.
- Evitar calor, umidade intensa, fumaça de cigarro, perfumes, aerossóis, poeira e produtos de limpeza voláteis.
- Reduzir situações de excitação, latidos intensos e exercícios extenuantes.
- Manter adequada higiene oral e tratar doença periodontal.
- Gravar as crises de tosse, se for possível sem estressar o animal, e anotar os horários e o que estava acontecendo antes da crise.
- Se o medicamento causar sonolência intensa, dificuldade para despertar ou respiração lenta, procurar atendimento imediatamente.
- Não aumentar, diminuir nem combinar remédios para tosse por conta própria; combinar a reavaliação em 48 a 72 horas após iniciar ou ajustar o tratamento.

SINAIS PARA RETORNO

Retornar diante de Língua ou mucosas azuladas, desmaio (desmaio), Respiração de boca aberta, Intenso esforço respiratório ou Crise de tosse que não se interrompe.