

TESTE TÉCNICO — NÃO UTILIZAR

PACIENTE: Paciente fictício

ESPÉCIE: gato

SEXO: fêmea

RESPONSÁVEL: Tutor fictício

RAÇA: SRD

IDADE / PESO: 5 anos • 4 kg

USO ORAL**1. ONDANSETRONA — VONAU VET — 4 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL**

Administrar 2,5 mL, por via oral, a cada 8 horas, durante 3 dias; reavaliar em 24 a 48 horas.

Pode ser oferecido com ou sem alimento. Anotar se há vômitos, salivação ou recusa da comida e informar à equipe.

Se o animal não consegue engolir ou vomita tudo o que recebe, procurar atendimento para mudar a forma de tratamento.

USO NA MUCOSA DA BOCA**2. BUPRENORFINA — BUPRENORFINA 0,3 MG/ML (TEMGESIC® / GENÉRICO) —... SOLUÇÃO INJETÁVEL**

Administrar 0,4 mL, por via mucosa oral, a cada 8 horas, durante 2 dias; reavaliar a dor em até 24 horas.

Com a seringa sem agulha fornecida pela equipe, colocar o volume prescrito entre a bochecha e a gengiva. Não jogar no fundo da garganta nem misturar à comida.

Guardar trancado, longe de crianças e animais. Se ficar muito sonolento, difícil de acordar ou com respiração lenta, procurar atendimento imediatamente.

RECOMENDAÇÕES DA DOENÇA

- O pâncreas está inflamado e isso pode causar dor, enjoo e falta de apetite. Mesmo que pare de vomitar, o animal ainda pode precisar de tratamento e acompanhamento.
- Oferecer pequenas porções do alimento indicado pela equipe várias vezes ao dia, respeitando a quantidade diária prescrita. Não deixar em jejum para “descansar o pâncreas”.
- Não trocar automaticamente por alimento com pouca gordura. O alimento deve ser escolhido para este gato, considerando também o intestino e o fígado.
- Manter água fresca disponível. Não forçar água, comida ou remédio com seringa se estiver vomitando, muito fraco ou com dificuldade para engolir.

TESTE TÉCNICO — NÃO UTILIZAR

- Anotar quanto comeu e bebeu, horários dos remédios, vômitos, fezes e mudanças de comportamento. Levar essas informações no retorno.
- Se recusar as refeições ou comer muito menos, avisar à equipe no mesmo dia. Não esperar vários dias: pode ser necessário oferecer alimento por uma sonda colocada pelo veterinário.
- Não dar remédios humanos para dor nem acrescentar antibióticos ou outros produtos por conta própria.
- Reavaliar em 24 a 48 horas após a alta ou antes se piorar. A equipe definirá quais remédios manter e quando repetir exames.

SINAIS PARA RETORNO

Retornar diante de Vômitos repetidos ou incapacidade de manter água, Dor, barriga tensa, postura encurvada ou dificuldade para descansar, Fraqueza intensa, desmaio ou dificuldade para respirar, Olhos ou gengivas amarelados ou Recusa de alimento ou piora importante do apetite.