RECEITUÁRIO

CLÍNICA VETERINÁRIA VETIUS

Dr. Silva - 12345

Data: 05/04/2026

• Paciente: Paciente E2E
Responsável: Tutor E2E

USO ORAL

1. **Bravecto Per Animal 1775437987277 112.5 mg/comprimido** — **Caixa**

Administrar 1 comprimido por animal, **por via oral**, em dose unica, até reavaliação clínica.

2. **Sache Per Animal 1775437987277 1 sache** — **Caixa**

Administrar 1 sache por animal, **por via oral**, em dose unica, até reavaliação clínica.

USO OTOLÓGICO

1. **Otologico 1775437987277 1 mg/aplicacao** — **Solucao Otologica**

Administrar 4 gota, **por via otologico**, **a cada 24 horas**, até reavaliacao clinica.

Manipulação: Favor manipular Solucao Otologica, contendo Ativo teste 1 mg, q.s.p. q.s.p. 30 aplicacoes, Uso conforme orientacao.

USO OFTÁLMICO

1. **Oftalmico 1775437987277 1 mg/aplicacao** — **Colirio**

Administrar 1 gota, **por via oftalmico**, **a cada 24 horas**, até reavaliacao clinica.

Manipulação: Favor manipular Colirio, contendo Ativo teste 1 mg, q.s.p. q.s.p. 30 aplicacoes, Uso conforme orientacao.

USO TÓPICO

1. **Pipeta Per Animal 1775437987277 1 pipeta** — **Caixa**

Aplicar **1 pipeta** por animal, **por via topico**, em dose unica, até reavaliação clínica.

USO INTRANASAL

INCOMPLETO

1. **Intranasal 1775437987277 1 mg/aplicacao** — **Solucao Intranasal**

Administrar 1 borrifada, **por via intranasal**, **a cada 24 horas**, até reavaliacao clinica.

Manipulação: Favor manipular Solucao Intranasal, contendo Ativo teste 1 mg, q.s.p. q.s.p. 30 aplicacoes, Uso conforme orientacao.

• **Incompatibilidade de unidade: borrifada vs apresentação.**

USO TRANSDÉRMICO

INCOMPLETO

1. **Transdermico Click 1775437987277 1 mg/aplicacao** — **Gel Transdermico**

Administrar 1 click, **por via transdermico**, **a cada 24 horas**, até reavaliacao clinica.

Manipulação: Favor manipular Gel Transdermico, contendo Ativo teste 1 mg, q.s.p. q.s.p. 30 aplicacoes, Uso conforme orientacao.

• **Incompatibilidade de unidade: click vs apresentação.**

INCOMPLETO

2. **Transdermico Pump 1775437987277 1 mg/aplicacao** — **Gel Transdermico**

Administrar 1 pump, **por via transdermico**, **a cada 24 horas**, até reavaliacao clinica.

Manipulação: Favor manipular Gel Transdermico, contendo Ativo teste 1 mg, q.s.p. q.s.p. 30 aplicacoes, Uso conforme orientacao.

• **Incompatibilidade de unidade: pump vs apresentação.**

Sem assinatura CRMV

Dr. Silva
Assinatura CRMV