

课程编号: A073003

北京理工大学 2007-2008 学年第一学期

2006 级线性代数试题 B 卷

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

一、(10 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & -10 \end{pmatrix}$, 求行列式 $\begin{vmatrix} 2A^T & 0 \\ 0 & A^{-1} \end{vmatrix}$ 。

二、(15 分) 已知矩阵 X 满足 $X \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & -1 \end{pmatrix} = 2X + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 X 。

三、(10 分) 求下列线性方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 2 \\ -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

(要求用导出组的基础解系表示通解)

四、(10 分) 已知 $\alpha_1 = (2, 1, 3), \alpha_2 = (3, -1, 2), \alpha_3 = (5, 0, 5), \alpha_4 = (-1, 2, 1), \alpha_5 = (1, 1, 1)$

(1) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩和一个极大无关组;

(2) 用所求极大无关组线性表出其它向量。

五、(10 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 是 4 维向量空间 V 的两个基, 从 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 。已知向量 γ 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的坐标

为 $(1, -1, 2, -2)$, 求 γ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的坐标。

六、(15 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵。

七、(10 分) 已知向量 $\alpha_1 = (2, 1, 3), \alpha_2 = (1, 1, -1)$, 求与向量 α_1, α_2 都正交的向量 α_3 , 并把 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 化为欧氏空间 R^3 的一个标准正交基。

八、(10 分) 求可逆线性替换, 把实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 - x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2$$

化为规范形。

九、(10 分) 设 A 是 n 阶方阵, 证明: 若存在 n 阶正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 是对角矩阵, 则 A 是对称矩阵。

十、(10 分) 举例说明, 若 A 是可相似对角化的矩阵, 则不一定存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 是对角矩阵。